

Table des Auteurs du Tome 41

— ATTARD (G.). — Sur la présence dans le Sud-Ouest de la France de deux Hémiptères du Platane	278
— BAMEUL (F.). — Les <i>Gyrinus</i> de la faune de France (<i>Col. Gyrinidae</i>). Première partie	191
— BAMEUL (F.). — <i>Id.</i> Seconde partie	209
— BERGER (P.). — Note sur le genre <i>Tetrops</i> (<i>Col. Cerambycidae</i>)	169
— BLANC (R.). — <i>Morimus asper</i> Sulzer en Bretagne (<i>Col. Cerambycidae</i>).	190
— BONADONA (P.). — Les <i>Bathysciola</i> Jeannel du Var et des Alpes-Mari- times (<i>Col. Bathysciinae</i>)	1
— BONNEAU (P.). — Quelques bonnes captures à Païolive (Ardèche)	88
— BOULARD (M.). — Signalisations nouvelles pour la faune des Cigales lusitaniennes (<i>Hom. Cicadoidea</i>)	33
— BOULARD (M.). — Les Odonates de Sérignan. II : l'étonnant compor- tement de ponte de l'Agrion de Linden (<i>Zygopt. Coenagriidae</i>)	269
— BOURNIER (A.). — Sur une espèce réputée rare : <i>Ankothrips</i> (<i>Prio- nothrips</i>) <i>mavromoustakisi</i> Priesner 1939	165
— BRUNEAU DE MIRÉ (PH.). — Un remarquable milieu-refuge : les cla- piers	85
— BURLE (F.). — Voir MENIER (J.-J.).	
— CANTOT (P.) et PHALIP (M.). — Nouvelles observations sur <i>Amorpho- cephala coronata</i> Germar (<i>Col. Brentidae</i>)	78
— CHALUMEAU (F.). — Quelques <i>Cerambycidae</i> (Coleoptera) mimétiques des Petites Antilles, et description d'une espèce nouvelle	147
— CHAMBON (J.-P.) et MARTINEZ (M.). — Un nouvel exemple peu com- mun de tératologie antennaire chez un Diptère, <i>Delia platura</i> (<i>Anthomyiidae</i>)	243
— CHAMINADE (A.). — Voir PAULIAN (A.).	
— CHAMPANHET (J.-M.). — <i>Purpuricenus globulicollis</i> Mulsant dans l'Ardèche (<i>Col. Cerambycidae</i>)	172
— CHASSAIN (J.). — Description d'une espèce nouvelle d' <i>Athous</i> du Sud-Ouest de la France (<i>Col. Elateridae</i>)	65
— CHEVIN (H.). — <i>Tristactoides lacourti</i> , n. gen., n. sp. d'Hyménoptère <i>Megalodontidae</i> d'Afrique du Nord	73
— COCQUEMPOT (CHR.). — <i>Phymatoderus pusillus</i> F., espèce nouvelle pour la faune d'Indre-et-Loire (<i>Col. Cerambycidae</i>)	132
— COCQUEMPOT (CHR.). — Voir MARTINEZ (M.).	
— DAJOZ (R.). — Répartition géographique et abondance des espèces du genre <i>Triplax</i> Herbst (<i>Col. Erotylidae</i>)	133
— DAJOZ (R.). — Les <i>Triplax</i> de la Faune de France	142
— DAJOZ (R.). — Note sur <i>Triplax emgei</i> Reitter	145
— DECHAMBRE (R.-P.). — La Vie des Collections	268
— DELAPORTE (Y.). — Quelques remarques sur la formation de la nomenclature	49
— DOMMANGET (J.-L.). — <i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842), espèce nouvelle pour la Corse (<i>Odon. Coenagriidae</i>)	100
— FRAGOSO (S. A.) et TAVAKILIAN (G. L.). — <i>Hirtobrasilianus</i> , nouveau sous-genre de <i>Brasilianus</i> Jakobson 1924 (<i>Col. Cerambycidae</i>)	229
— FRANCEZ (A.-J.). — Les Odonates d'Auvergne : répartition de quel- ques espèces rares ou peu connues — essai de zoogéographie régionale.	101
— GIORDAN (J.-CL.). — Sur le statut de <i>Duvalius sicardi</i> Fagniez et description d'une forme nouvelle concernant cette espèce (<i>Col. Trechinae</i>)	17

— GIORDAN (J.-CL.). — Sur <i>Duvalius raffaldii</i> Curti (Col. Trechinae)	123
— GOMY (Y.). — Chrysalide	16
— HONDT (J.-L. D'). — Note sur la présence en Dordogne de <i>Mantispa styriaca</i> (Poda), Neuroptera et d' <i>Arcyptera fusca</i> (Pallas), Orthoptera.	113
— LACOURT (J.). — Une nouvelle espèce de <i>Periclista</i> du Bassin Parisien (Hym. Tenthredinidae)	79
— LECLERCQ (J.-P.). — Sur quelques Coléoptères intéressants du Finistère	83
— LEDOUX (G.). — Contribution à la connaissance des <i>Nebria</i> de la région himalayenne (2 ^e note). (Col. Carabidae <i>Nebriini</i>)	279
— LE FRÈNE (A.). — <i>Morimus asper</i> Sulzer en Bretagne (Col. Cerambycidae)	190
— MACAIRE (DR P.). — <i>Eupotosia mirifica</i> (Mulsant) dans l'Hérault (Col. Cetoniidae)	122
— MACHARD (P.). — Faune carabologique de Turquie. — Description de quelques formes nouvelles. Précisions sur la répartition de quelques races d'Anatolie (Col. Carabidae)	27
— MARTINEZ (M.). — Voir CHAMBON (J.-P.).	
— MARTINEZ (M.) et COCQUEMPOT (CHR.). — Sur la présence en France de <i>Reesa vespulae</i> , espèce indésirable (Col. Dermestidae)	21
— MATOCQ (A.). — Progression de <i>Corythucha ciliata</i> Say (Het. Tingidae)	84
— MATOCQ (A.). — Un genre et une espèce de <i>Miridae</i> nouveaux pour la France (Heteroptera)	273
— MENIER (J.-J.) et BURLE (F.). — Première capture en France de <i>Paratillus carus</i> , Cleridae de la Région Australienne (Col.)	9
— MICHEL (B.). — Observation d'un cas de schistomélie antennaire chez <i>Tenthredopsis stigma</i> F. (Hym. Tenthredinidae)	241
— MORIN (D.). — Captures intéressantes d'Orthoptères dans les Alpes et la vallée du Rhône	184
— NEL (A.). — Sur la présence d'un Coléoptère <i>Mordellidae</i> fossile dans les calcaires stampiens de Cereste (Alpes-de-Haute-Provence)	119
— NEL (A.) et PAPAIZIAN (M.). — Une nouvelle espèce d'Odonate fossile du stampien d'Aix-en-Provence (B.-d.-R.) — (<i>Odonata Libellulidae</i>).	55
— OROUSSET (J.). — Coléoptères hypogés de Corse. IX. — Les <i>Leptotyphlus</i> (s. str.) du groupe <i>L. sublaevis</i> Fauvel (Col. Staphylinidae)	173
— OROUSSET (J.). — Coléoptères hypogés de Corse. X. — Nouvelle contribution à la connaissance du genre <i>Mayetia</i> Mulsant et Rey (Col. Pselaphidae)	297
— PAPAIZIAN (M.). — Voir NEL (A.).	
— PAULIAN (A.) et CHAMINADE (A.). — Répartition et considérations écologiques sur l' <i>Acmaeodera prunneri</i> Gené et sa variété <i>18-punctata</i> Gory en France continentale (Col. Buprestidae)	289
— PAULIAN (R.). — Un piège à Coléoptères Crépusculaires	35
— PAULIAN (R.). — Un nouvel <i>Aphodius</i> pour la faune de France (Col. Aphodiidae)	127
— PAULIAN (R.). — Espèces rares, espèces introduites, espèces mythiques.	161
— PAULIAN (R.). — Des figurines en terre cuite, du Minoen, représentant des Coléoptères	257
— PÉRICART (J.). — Gaston Tempère (1900-1985).	
— PERRAULT (G. G.). — Etude sur la faune des <i>Carabidae</i> de Guyane. — II : Une nouvelle espèce de <i>Perigona</i> microphthalmes (Col. Carabidae <i>Perigonini</i>)	61
— PERRIN (H.). — Pullulation inhabituelle de <i>Podisma alpina</i> (Kollar) dans un pâturage alpin (Orth. Catantopidae)	164

— PHALIP (M.). — <i>Tetrops praeusta</i> L. var. <i>inapicalis</i> Pic dans la Vienne (Col. <i>Cerambycidae</i>)	187
— PHALIP (M.). — Voir CANTOT (P.).	
— PRUNIER (D.). — Implantation d'insectes hors de leur aire de répartition	99
— QUÉAU (A.). — <i>Rosalia alpina</i> dans le nord de l'Hérault (Col. <i>Cerambycidae</i>)	199
— QUENTIN (R. M.). — La Vie de la Revue	97
— RABIL (J.). — Pouvoir attirant des fruits	227
— ROGÉ (J.). — Trois Coléoptères nouveaux pour la région toulousaine ..	77
— ROUGEOT (P.-C.). — <i>Aglia tau</i> L. dans le Vaucluse (Lep. <i>Saturniidae</i>). ..	132
— RYŪTARŌ IWATA. — Capture d' <i>Oplosia fennica</i> Paykull dans le Haut-Rhin, Alsace (Col. <i>Cerambycidae</i>)	146
— SECQ (M.). — A propos de la présence de <i>Gnathoncus schmidti</i> Reitter en Dordogne (Col. <i>Histeridae</i>)	69
— SPEIGHT (M. C. D.). — <i>Sargus rufipes</i> , espèce nouvelle pour la France (Dipt. <i>Stratiomyidae</i>)	185
— TAVAKILIAN (G. L.). — Voir FRAGOSO (S. A.).	
— TUSSAC (H.) et TUSSAC (M.). — Description du mâle de <i>Leptochilus</i> (<i>Neoleptochilus</i>) <i>beaumonti</i> Giordani Soika 1953 (Hym. <i>Eumenidae</i>) ..	129
— VOISIN (J.-F.). — <i>Meconema meridionale</i> à Brétigny, Essonne (Orth. <i>Meconemidae</i>)	117
— WEILL (P.). — A propos des envahisseurs (suite)	228

Formes nouvelles décrites dans le Tome 41

— <i>Acmaeodera prunneri</i> m. 18-punctata, var. <i>morettoii</i> nov., Paulian et Chaminade (Col. <i>Buprestidae</i>)	291
— <i>Ankothrips</i> (<i>Prionohipis</i>) <i>mavromoustakisi</i> Priesner 1939, allotype mâle , Bournier (<i>Thysanoptera</i>)	166
— <i>Athous</i> (<i>Exanathrotus</i>) <i>ruteri</i> n. sp., Chassain (Col. <i>Elateridae</i>)	65
— <i>Bathysciola aubéi</i> ssp. <i>degenerata</i> nov., Bonadona (Col. <i>Bathysciinae</i>). ..	3
— <i>Bathysciola aubéi</i> ssp. <i>digitata</i> nov., Bonadona (Col. <i>Bathysciinae</i>). ..	3
— <i>Bathysciola aubéi</i> ssp. <i>digna</i> nov., Bonadona (Col. <i>Bathysciinae</i>)	3
— <i>Bathysciola giordani</i> n. sp., Bonadona (Col. <i>Bathysciinae</i>)	5
— <i>Bathysciola giordania</i> n. sp., Bonadona (Col. <i>Bathysciinae</i>)	7
— <i>Bathysciola turcatiana</i> n. sp., Bonadona (Col. <i>Bathysciinae</i>)	4
— <i>Brasilianus</i> (<i>Hirtobrasilianus</i>) <i>seabrai</i> n. sp., Fragoso et Tavakilian (Col. <i>Cerambycidae</i>)	232
— <i>Brasilianus</i> (<i>Hirtobrasilianus</i>) <i>villiersi</i> n. sp., Fragoso et Tavakilian (Col. <i>Cerambycidae</i>)	235
— <i>Carabus</i> (<i>Cytilocarabus</i>) <i>cribratus</i> ssp. <i>arpaalaniensis</i> nov., Machard (Col. <i>Carabidae</i>)	27
— <i>Carabus</i> (<i>Lamprostus</i>) <i>calleyi</i> ssp. <i>catakensis</i> nov., Machard (Col. <i>Carabidae</i>)	28
— <i>Carabus</i> (<i>Procrustes</i>) <i>chevrolati</i> ssp. <i>vanensis</i> nov., Machard (Col. <i>Carabidae</i>)	30
— <i>Carabus</i> (<i>Sphodristocarabus</i>) <i>armeniacus</i> ssp., <i>arsiyandagensis</i> nov., Machard (Col. <i>Carabidae</i>)	30
— <i>Duvalius sicardi</i> ssp., <i>cayrosensis</i> nov., Giordan (Col. <i>Trechidae</i>)	20
— <i>Himalayonebria</i> , nov. subgen. de <i>Nebria</i> , Ledoux (Col. <i>Nebriinae</i>)	279
— <i>Hirtobrasilianus</i> , nov. subgen. de <i>Brasilianus</i> , Fragoso et Tavakilian (Col. <i>Cerambycidae</i>)	229
— <i>Leptochilus</i> (<i>Neoleptochilus</i>) <i>beaumonti</i> Giordani Soika 1953, allotype mâle , Tussac et Tussac (Hym. <i>Eumenidae</i>)	129

— <i>Leptotyphlus</i> (s. str.) <i>bicorniger</i> n. sp., Orousset (<i>Col. Staphylinidae</i>)	179
— <i>Leptotyphlus</i> (s. str.) <i>fallax</i> n. sp., Orousset (<i>Col. Staphylinidae</i>)	179
— <i>Mayetia echinata</i> n. sp., Orousset (<i>Col. Pselaphidae</i>)	300
— <i>Mayetia maremmana</i> n. sp., Orousset (<i>Col. Pselaphidae</i>)	300
— <i>Mayetia strigosa</i> n. sp., Orousset (<i>Col. Pselaphidae</i>)	298
— <i>Nebria</i> (<i>Himalayonebria</i>) <i>koutchii</i> n. sp., Ledoux (<i>Col. Nebriinae</i>)	283
— <i>Nebria</i> (<i>Himalayonebria</i>) <i>meurguesae</i> n. sp., Ledoux (<i>Col. Nebriinae</i>)	284
— <i>Nebria</i> (<i>Himalayonebria</i>) <i>nouristanensis</i> n. sp., Ledoux (<i>Col. Nebriinae</i>)	280
— <i>Nebria</i> (<i>Himalayonebria</i>) <i>praelonga</i> n. sp., Ledoux (<i>Col. Nebriinae</i>)	282
— <i>Palaeotramea</i> n. gen., <i>aquisextana</i> n. sp., Nel et Papazian (<i>Odonata</i>)	58
— <i>Periclista vernalis</i> n. sp., Lacourt (<i>Hym. Tenthredinidae</i>)	79
— <i>Perigona</i> (<i>Cryptoperigona</i>) <i>gerardi</i> n. sp., Perrault (<i>Col. Perigonini</i>)	61
— <i>Stenalia oligocenica</i> n. sp., Nel (<i>Col. Mordellidae</i>)	120
— <i>Strangalia benitoespinali</i> n. sp., Chalumeau (<i>Col. Cerambycidae</i>)	148
— <i>Tristactoides</i> n. gen., <i>lacourti</i> n. sp., Chevin (<i>Hym. Megalodontidae</i>)	73

Types désignés

— <i>Leptotyphlus</i> (s. str.) <i>sublaevis</i> Fauvel, Orousset (<i>Staphylinidae</i>), lecto- type mâle, paralectotypes	175
---	-----

Formes nouvelles pour la France et la Corse

— <i>Aphodius</i> (<i>Calamosternus</i>) <i>mayeri</i> Pilleri, Paulian (<i>Col. Aphodiidae</i>)	127
— <i>Brachyleptura trisignata</i> Fairmaire, forme typique, Bonneau (<i>Col. Cerambycidae</i>)	88
— <i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur), Dommanget (<i>Odonata</i>)	100
— <i>Opisthotaenia striata</i> (Wagner), Matocq (<i>Hem. Miridae</i>)	273
— <i>Paratillus carus</i> (Newman), Menier et Burle (<i>Col. Cleridae</i>)	9
— <i>Reesa vespulae</i> (Milliron), Martinez et Cocquempot (<i>Col. Dermestidae</i>)	21
— <i>Sargus rufipes</i> Wahlberg, Speight (<i>Dipt. Stratiomyiidae</i>)	185

La Rédaction souhaite que la nouvelle année toute proche vous apporte la santé, le calme et la sérénité, ainsi que de nombreuses joies entomologiques !

Elle souhaite aussi que vous ne tardiez pas trop dans l'envoi du montant de votre abonnement si vous voulez que votre journal paraisse toujours régulièrement et avec un nombre de pages accru. Merci pour votre confiance et votre compréhension.