Tome 1 - N° 3 1981 ISSN 0249-5384

BULLETIN

DU

GROUPE ENTOMOLOGIQUE AUBOIS



Publication trimestrielle

GROUPE ENTOMOLOGIQUE AUBOIS
Musée d'Histoire naturelle
21, rue Chrestien-de-Troyes
10000 TROYES

BULLETIN DU GROUPE ENTOMOLOGIQUE AUBOIS
Directeur : Roger MÉTAYE

SOMMAIRE

Sur la répartition de quelques familles de Coléoptères dans l'Aube (suite) 'DYTISCIDAE'
par Olivier PILLON 69

Sur quelques Scarabéides coprophages champenois 'COL. SCARABAEOIDEA'
par Charles DHEURLE 77

Sélection d'articles récents
par Roger MÉTAYE 80

Note d'élevage 'LEP. HETEROCERA'
par Gérard MÉTIVIER 80

Liste préliminaire des Geometridae de l'Aube 'LEP.'
par Roger MÉTAYE 81

À propos de Samia cynthia 'LEP. ATTACIDAE'
par Françoise CHAMPART 102

Sur Arctia caja L. 'LEP. ARCTIIDAE'
par Gérard MÉTIVIER 102

Compte rendu de la réunion du 21 mars 1981 103

La correspondance relative au Bulletin et les échanges doivent être adressés au Directeur de la publication :

Roger MÉTAYE - 307, rue du Fbg-Croncels - 10000 TROYES

BULLETIN
DU
GROUPE ENTOMOLOGIQUE AUBOIS

SUR LA RÉPARTITION DE QUELQUES FAMILLES DE COLÉOPTÈRES DANS L'AUBE (suite) (1)
'DYTISCIDAE'

par Olivier PILLON

Les coordonnées des lieux de récolte, indiquées entre parenthèses, correspondent au quadrillage kilométrique LAMBERT II étendu.
L'astérisque signale les espèces, ou les formes, nouvelles pour l'Aube.

3.2 Dytiscinae

3.2.1 - Hydaticini

Hydaticus (s. str.) transversalis Pontopp.
Eaux tranquilles à fond de vase, où il se trouve en compagnie du suivant.
Saint-Germain, dans les fossés entourant la propriété du château de Courcelle (726 2362). - Clérey, au lieu dit "les Entre Clos", dans le ruisseau (735 2358).
De mars à septembre. Assez commun.

Hydaticus (s. str.) seminiger De Geer
Mares calmes à fond de vase. Souvent avec H. transversalis Pontopp.
Viélaines, dans une mare temporaire, en face de la ferme Sainte Eulalie, de l'autre côté de la route (727 2362). - Clérey, au lieu dit "les Entre Clos", dans le ruisseau (735 2358).
De mars à septembre. Commun.

3.2.2 - Thermonectini

Graphoderus cinereus L.
Mares et ruisseaux à fond de feuilles mortes.
Roncenay, dans la mare à l'ouest de la D 109, avant le pont (727 2358); capture d'un seul exemplaire en avril 1979. - Mesnil-Saint-Père, dans la mare alimentée par la fontaine Colette, au nord de la route périphérique (750 2365); observation de notre premier spécimen aubois en juin 1974.

LE GRAND nous signalait cette espèce comme étant rare. De nos jours, elle semble de plus en plus difficile à observer dans le département.

---

1. Cf. Bull. du Gr. ent. aubois, 1 (2), 1981 : 33-37.

Graphoderus bilineatus De Geer
Nous n'avons pas observé cette espèce déjà décrite de l'Aube.

LE BRUN nous signale la capture de 3 exemplaires de G. bilineatus De Geer, par LE GRAND, à : "Villechétif, dans le petit ruisseau qui coule à l'entrée du marais, au bas du coteau de Saint-Parres, fin avril, mai".

Graphoderus zonatus Hop.
Nous n'avons pas observé cet insecte déjà décrit du département.

LE BRUN nous signale que LE GRAND a observé cette espèce à : "La Vacherie en mai, juin", et d'ANTESSANTY précise, par ailleurs, "capture de 2 exemplaires à la Vacherie".

Acilius (s. str.) sulcatus L.
Étangs et mares à fond de vase. Souvent avec le suivant.
Roncenay, dans une mare à l'ouest de la D 109, avant le pont (727 2358). - Isle-Aumont, dans la gravière (732 2358).
De mars à octobre. Très commun.

Acilius (s. str.) canaliculatus Nicol.
Mares froides à fond de vase. Cette espèce cohabite bien souvent avec A. sulcatus L., mais elle est un peu plus rare.
Viélaines, au lieu dit "la Folie", vers l'ancien lavoir (728 2362). - Ruvigny, dans une mare temporaire, près du canal de Baires, vers le pont de la D 161 (736 2364).
De mars à octobre. Assez commun.

LE BRUN nous disait : "Répandu dans les endroits où il se trouve. Rare.", et d'ANTESSANTY d'ajouter : "septembre, octobre. Très rare".

De nos jours, cet insecte semble s'être installé un peu partout dans le département. Cependant, il paraît se raréfier dans ses biotopes, en faveur d'A. sulcatus L.

*A. canaliculatus ab. kotulae Ulan. - Cette forme rarissime d'A. canaliculatus Nicol. est restée inconnue dans l'Aube jusqu'en août 1973, date à laquelle nous en avons observé quelques exemplaires à Viélaines (728 2362), en compagnie du type.
Toujours rare dans ses stations.

3.2.3 - Dytiscini

Dytiscus (Macrodytes) semiculcatus Müll.
Espèce préférante des eaux courantes et herbeuses.
Saint-Pouange, dans le ruisseau traversant l'exploitation du Lycée agricole (727 2360). - Viélaines, au lieu dit "la Folie", vers l'ancien lavoir (728 2362).
De mars à octobre. Commun.

Dytiscus (Macrodytes) dimidiatus Bergst.
Eaux stagnantes et encombrées de végétation.
Saint-Germain, dans les fossés entourant la propriété du château de Courcelle (726 2362). - Clérey, au lieu dit "les Entre Clos", dans le ruisseau (735 2358).
De février à octobre. Assez commun.

Dytiscus (Macrodytes) marginalis L.
Espèce ubiquiste (se trouvant dans tous les milieux).
Isle-Aumont, dans la gravière (732 2358). - Chaource, au lieu dit "les Bruyères" dans une mare utilisée comme abreuvoir, à l'est de la N 444 (734 2343).
De mars à octobre. Commun.

D. (M.) marginalis var. ♀ conformis Kunz. - Nous n'avons pas observé cette forme déjà décrite du département. "Avec le type, la Vacherie. Rare" (LE GRAND). "Gravières et flaques d'eau à la Vacherie" (LE BRUN).

Dytiscus (Macrodytes) circumcinctus Ahr.
Nous n'avons pas capturé cette espèce, signalée du département par LE GRAND (Villechétif. Assez rare) et LE BRUN (Forêt d'Orient. Assez rare).
Cet insecte semble de plus en plus se raréfier.

Dytiscus (Macrodytes) circumflexus F.
Eaux calmes avec de la végétation.
Viélaines, dans une mare temporaire sous bois, en face de la ferme Sainte Eulalie, de l'autre côté de la route (727 2362); capture d'un exemplaire. - Saint-Germain, dans les fossés entourant la propriété du château de Courcelle (726 2362); observation d'un autre exemplaire.
Avril et septembre. Très rare.

Comme pour l'espèce précédente, D. (M.) circumflexus F. semble devenir de plus en plus rare. LE BRUN et LE GRAND observaient communément cet insecte à Villechétif, Arcis, Villenauxe, la Vacherie et au pont Hubert.

3.2.4 - Cybisterini

Cybister lateralimarginalis De Geer
Eaux calmes, surtout sous les Potamogeton. Mares herbeuses.
Clérey, dans une mare intermittente, au sud des ballastières (736 2357). - Praslin, dans l'étang (738 2340).
Août et septembre. Assez rare.

3.3 - Hydroporinae

3.3.1 - Hyphydrini

Hyphydrus ovatus L.
Dans les mares à fond de feuilles mortes.
Roncenay, dans la mare à l'ouest de la D 109, avant le pont (727 2358). - Saint-Germain, dans les fossés entourant la propriété du château de Courcelle (726 2362).
De février à septembre. Très commun.

3.3.2 - Hydrovatini

Hydrovatus clypealis Sharp
Cette espèce reste inobservée dans le département. Cependant BEDEL en signale la capture en forêt de Fontainebleau (mares de Belle Croix) et à Beaune (Côte-d'Or).

Par ailleurs, nous avons capturé cet insecte aux environs de Nitry, dans le département de l'Yonne.
Sa présence dans l'Aube devient, de ce fait, fort probable.

Hydrovatus cuspidatus Latr.
Les limites de son extension géographique qui paraît considérable, sont actuellement mal déterminées (BEDEL). Même remarque que pour H. clypealis Sharp; sa présence départementale est très probable.

3.3.3 - Bidessini

Yola bicarinata Latr.
Espèce préférante des eaux courantes, mais aussi dans les eaux claires et découvertes.
Clérey, dans les flaques vers la grande ballastière (736 2357). - Roncenay, dans une mare à l'ouest de la D 109, avant le pont (727 2358).
Avril et septembre. Assez rare et très localisé.

*Bidessus minutissimus Germ.
Espèce préférante des eaux courantes et limpides. Entre les graviers.
Cette espèce est restée inobservée dans l'Aube jusqu'en avril 1975, date à laquelle nous l'avons trouvée à Clérey, dans des mares, vers la grande ballastière (736 2357).
Nous n'avons pas capturé cet insecte dans d'autres stations départementales, notre dernière observation étant de septembre 1976, à Clérey (736 2357).

Guignotus geminus F.
Espèce ubiquiste.
Saint-Léger-près-Troyes, au lieu dit "Cervet", à l'ouest de la D 85 (728 2361). - Roncenay, dans une mare à l'ouest de la D 109, avant le pont (727 2358).
De mars à novembre. Très commun.

*G. geminus ab. duftschmidi D. Torre. - Roncenay, avec le type (727 2358).
D'avril à novembre.

3.3.4 - Hydroporini

1 - Genre Coelambus

Coelambus impressopunctatus Schall.
Dans les mares à fond de vase.
La Loge-aux-Chèvres, dans l'étang du "Parc aux Pourceaux", vers la maison de chasse (754 2363). - Mesnil-Saint-Père, dans la mare alimentée par la "Fontaine Colette", au nord de la route périphérique (750 2365).
De mars à septembre. Commun.

*C. impressopunctatus var. ♀ lineelus Gyll. - Mesnil-Saint-Père (750 2365). Avec le type, mais bien plus rare.
De février à juin.

Coelambus confluens F.
Dans les mares à fond de vase. Se trouve par exemplaires isolés dans des eaux bourbeuses et ensoleillées.
Cette espèce figure dans le Catalogue LE BRUN, mais sans précision géographique : "Par places, dans les gravières et les mares limpides, souvent isolé au printemps".
Nous n'avons observé qu'un seul exemplaire de cette espèce, à Clérey, dans une mare intermittente, au sud des ballastières (736 2357), en septembre 1973.
Très rare.

2 - Genre Hygrotus

Hygrotus inaequalis F.
Dans les eaux stagnantes.
Saint-Germain, dans les fossés entourant la propriété du château de Courcelle (726 2362). - Clérey, dans une mare temporaire des pâtures (736 2358).
De mars à novembre. Très commun.

*H. inaequalis ab. fasciatus D. Torre. - Avec le type, à Saint-Germain (726 2362).
Juin. Assez rare.

*H. inaequalis ab. parvulus F. - Avec le type. Saint-Germain (726 6223). - Clérey (736 2358).
De mai à juillet. Assez rare.

Hygrotus versicolor Schall.
Nous n'avons pas observé cette espèce déjà signalée du département. "La Vacherie. Très rare" (LE GRAND). "Eaux stagnantes et gravières de la Vacherie, en mars et avril. Très commun" (LE BRUN).
Il est à remarquer une ambiguïté, à propos de la fréquence de cet insecte.
BEDEL précise : "Marais et fossés humides. Très rare".

3 - Genre Hydroporus

a - Groupe dorsalis

Hydroporus (Suphodytes) dorsalis F.
Dans les mares à fond de feuilles mortes.
Clérey, au lieu dit "la Vacherie" (736 2357). - Viélaines, dans une mare temporaire sous bois, en face de la ferme Sainte Eulalie, de l'autre côté de la route (727 2362).
De mars à novembre. Commun.

*H. (S.) dorsalis ab. marginalis Schils. - Viélaines (727 2362), avec le type.
De février à juin. Rare.

*H. (S.) dorsalis ab. transversalis D. Torre. - Viélaines (727 2362), avec le type.
De mars à août. Assez rare.

b - Groupe marginatus

Hydroporus (s. str.) marginatus Duft.
Dans les mares herbeuses et claires, ainsi que dans les parties

calmes des ruisseaux.
Ruvigny, dans une mare temporaire, près du canal de Baires, vers le pont sur la D 161 (736 2364). Capture d'un exemplaire en avril. - Clérey, dans une mare temporaire des pâtures (736 2358). Observation d'un second exemplaire en juillet.
Nous n'avons étudié que ces 2 spécimens rarissimes, dans le département.

"Longchamps. Très rare" (LE BRUN et LE GRAND). "Fossé à droite de la route de Sens. Mai. Très rare" (d'ANTESSANTY).

c - Groupe palustris

Hydroporus (s. str.) palustris L.
Espèce ubiquiste (se trouvant indifféremment dans tous les milieux).
Moussey, dans l'Ousse en crue (731 2357). - Viélaines, au lieu dit "la Folie", vers l'ancien lavoir (728 2362).
De février à novembre. Extrêmement commun.

*H. palustris ab. lituratus Panz. - Viélaines (728 2362), avec le type.
De mars à juillet. Assez commun.

*H. palustris ab. apicalis Schils. - Isle-Aumont, dans la gravière (732 2358).
D'avril à juillet. Assez commun.

Hydroporus (s. str.) striola Gyll.
Dans les mares herbeuses, sous bois.
Laubressel, au lieu dit "Bois des Gauyards", dans des ornières (740 2367). - Moussey, dans l'Ousse en crue (731 2357).
De février à juillet. Commun.

*Hydroporus (s. str.) incognitus Sharp
Cet insecte, inconnu du département jusqu'en mai 1980, fut observé par notre collègue et ami Charles DHEURLE, à la Villeneuve-au-Châtelot (693 2395)(capture d'un exemplaire qu'il nous a soumis pour identification). Le biotope probable d'H. incognitus Sharp étant une eau froide à fond de feuilles, sous bois.

d - Groupe tristis

*Hydroporus (s. str.) piceus Steph.
Dans les mares et fossés sous bois.
Nous avons capturé un exemplaire de cette espèce à Viélaines, au lieu dit "la Folie", vers l'ancien lavoir, dans un fossé temporaire (728 2362), en juin 1976. Cette observation reste sans précédent pour le département.

Hydroporus (s. str.) tristis Payk.
Dans les mares froides sous bois.
Saint-Pouange, capture de 2 exemplaires du tristis Payk., dans le ruisseau traversant l'exploitation du Lycée agricole (727 2360).
Nous ne disposons d'aucune observation départementale postérieure à cette date. Mais d'ANTESSANTY a remarqué H. tristis Payk. à "Fouchères, dans une petite source, au milieu d'une lande de bruyères. Mai. Très rare".

*Hydroporus (s. str.) umbrosus Gyll.
Dans les marécages à fond de mousse et d'humus tourbeux.
Nous avons observé cet insecte, jusqu'alors inconnu dans l'Aube, en mars 1974, à Saint-Germain, dans les fossés entourant la propriété du château de Courcelle (726 2362).
Depuis, nous ne possédons aucune information concernant cet insecte.

Hydroporus (s. str.) angustatus Sturm
Dans les mares sous bois.
Viélaines, dans une mare temporaire sous bois, en face de la ferme Sainte Eulalie, de l'autre côté de la route (727 2362). - Clérey, au lieu dit "la Vacherie" (736 2357).
D'avril à septembre. Rare.

e - Groupe melanocephalus

Hydroporus (s. str.) erythrocephalus L.
Dans les mares sous bois.
Saint-Germain, dans les fossés entourant la propriété du château de Courcelle (726 2362). - Clérey, dans une mare temporaire des pâtures (736 2358).
De mars à juillet. Assez commun.

*H. erythrocephalus var. ♀ deplanatus Gyll. - Capture de deux exemplaires à Isle-Aumont, dans la gravière, en mars et avril (732 2358).
BEDEL nous signale à propos de cette variété : "Paraît avoir la même extension (que le type), mais toujours plus rare".

f - Groupe nigrita

Hydroporus (s. str.) nigrita F.
Dans les mares et les sources froides, sous bois.
Cette espèce, considérée comme subalpine, semble en limite de répartition dans notre département. Cela en expliquerait aussi sa rareté.
Mesnil-Saint-Père, dans une mare alimentée par la "Fontaine Colette", au nord de la route périphérique (750 2365). - Viélaines, dans un fossé, au lieu dit "la Folie", vers l'ancien lavoir (728 2362).
De mars à juillet. Rare.

*Hydroporus (s. str.) rufifrons Duft.
Dans les mares froides et herbeuses.
Cet insecte est resté inconnu dans l'Aube jusqu'en avril 1974, date à laquelle nous l'avons trouvé à Saint-Léger-près-Troyes, au lieu dit "Cervet", à l'ouest de la D 85 (728 2361).
Nous avons observé, depuis, H. rufifrons Duft. à Ruvigny, dans une mare temporaire, près du canal de Baires, vers le pont sur la D 161 (736 2364).
De mars à novembre. Très rare.

g - Groupe memnomius

Hydroporus (s. str.) memnomius Nicol.
Mares et fossés sous bois.
Même remarque que pour H. nigrita F. Cet insecte appartenant à la faune subalpine semble en limite de répartition dans l'Aube.

Moussey, dans l'Ousse en crue (731 2357). - Saint-Pouange, dans le ruisseau traversant l'exploitation du Lycée agricole (727 2360).
De mars à septembre. Très rare.

*H. memnomius ab. incertus Aubé. - Viélaines, dans le ruisseau, en face de la ferme Sainte Eulalie, de l'autre côté de la route (727 2362). Capture de 2 exemplaires en juin 1976. Aucune observation depuis.

*H. memnomius var. ♀ castaneus Aubé. - Moussey, avec le type (731 2357), mais cette variété est un peu plus fréquente que celui-ci, dans l'Aube.
De mars à novembre. Assez rare.

h - Groupe planus

Hydroporus (s. str.) pubescens Gyll.
Espèce ubiquiste.
Ruvigny, dans une mare temporaire, près du canal de Baires, vers le pont sur la D 161 (736 2364). - Praslin, dans une mare servant d'abreuvoir (738 2340).
De mars à juin. Très rare.

Les aberrations suivantes sont bien plus communes :

*H. pubescens ab. scaphula Sturm. - Isle-Aumont, dans la gravière (732 2358).
De février à juillet. Assez commun.

*H. pubescens ab. aterrimus Porta. - Ruvigny, avec le type (736 2364). Capture de 3 exemplaires en avril 1980. Nous ne possédons aucune autre observation sur cette forme.

*H. pubescens ab. subhumeralis Reitt. - Chaource, au lieu dit "les Bruyères", dans une mare utilisée comme abreuvoir, à l'est de la N 444 (734 2343). C'est la forme la plus répandue d'H. pubescens Gyll.
De février à novembre. Très commun.

Hydroporus (s. str.) planus F.
Espèce ubiquiste.
Saint-Germain, dans les fossés entourant la propriété du château de Courcelle (726 2362). - Laubressel, au lieu dit "Bois des Gauyards", dans les ornières (740 2367).
De février à novembre. Très commun.

*Hydroporus (s. str.) discretus Fairm.
Cet insecte est resté inconnu dans l'Aube jusqu'en avril 1975, date à laquelle nous en avons observé quelques exemplaires à Viélaines, au lieu dit "la Folie", vers l'ancien lavoir (728 2362). Nous l'avons observé depuis à Clérey, au lieu dit "la Vacherie" (736 2357).
De mars à octobre. Assez rare.

Note : Pour la cartographie, se reporter aux bulletins précédents : 1 (1), 1980 : 8, fig. 1, et 1 (2), 1981 : 37, fig. 1.

28, rue Paul-Bert, 10300 Ste-Savine

SUR QUELQUES SCARABÉIDES COPROPHAGES CHAMPENOIS 'COL. SCARABAEOIDEA'

par Charles DHEURLE

I. Conditions de capture

1. Technique de chasse. - Elle est fondée sur la méthode qui consiste à jeter les bouses et crottins, avec le sol sous-jacent, dans un seau rempli d'eau. On remue avec un bâton et on récolte les Coléoptères qui surnagent.

Il existe une autre méthode telle que celle décrite par J.-P. LUMARET (1979) et qui semble être la plus productive : une boîte métallique est enfoncée dans le sol; au ras du sol se trouve une nacelle où est déposé l'excrément. L'odeur diffusant, les espèces coprophages et nécrophages sont attirées.

2. Période de chasse. - Toutes les espèces citées ci-après ont été capturées pendant les années 1976, 1979 et 1980, de février à novembre.

II. Les espèces capturées

Les coordonnées des lieux de récolte, indiquées entre parenthèses, correspondent au quadrillage kilométrique LAMBERT II étendu.
L'astérisque signale les espèces nouvelles pour la région.

1. COPRIDAE

Copris lunaris Linné
Aube : Mesgrigny, ferme de la Belle Étoile (713 2387), 14 juin 1979, 5 ♂♂, 10 ♀♀. Crottin de cheval.

Onthophagus joannae Goljan
Aube : Pars-lès-Romilly (702 2389), 30 sept. 1979. Crotte de mouton.
Marne : Nesle-la-Reposte (690 2404), 20 sept. 1979. Bouse de vache.

Onthophagus coenobita Herbst
Aube : Pars-lès-Romilly (702 2389), 30 sept. 1979, 8 ♂♂, 10 ♀♀. Crotte de mouton.

Onthophagus similis Scriba
Marne : Nanteuil-la-Forêt, lieu dit la Presle (717 2463), mai 1980, 1 ex. Crotte de mouton.

Onthophagus vacca Linné
Aube : Pont-sur-Seine (693 2393), juin 1979, 10 ♂♂, 10 ♀♀. Bouse de vache.

2. APHODIIDAE

Aphodius (Colobopterus) erraticus Linné
Aube : Pont-sur-Seine (693 2393), mai 1980, 10 ex. Bouse de vache.

Aphodius (Otophorus) fossor Linné
Aube : Pont-sur-Seine (692 2393), mai 1980, 10 ex. Bouse de vache.
L'aberration silvaticus est fréquente avec le type, 10 ex.

*Aphodius (Limarus) zenkeri Germar
Marne : Villers-Allerand, forêt du Chêne à la Vierge (Montagne de Reims) (722 2462), 13 sept. 1979, 1 ex. Fumées de cerf.
Espèce nouvelle pour la Marne. Non signalée dans le Catalogue LAJOYE (1878, 1896-99).

Aphodius (Acrossus) rufipes Linné
Aube : Ossey-les-Trois-Maisons, ferme de Vaudepuits (702 2384), août à septembre 1979, 10 ex. Crottin d'âne.
Marne : la Forestière, lieu dit la Chalmelle (691 2405), 30 août 1979. Crottin de cheval.

Aphodius (Acrossus) luridus Fabricius
Marne : Nanteuil-la-Forêt, lieu dit la Presle (717 2463), mai 1980, 5 ex. Bouse de vache.
L'aberration gagates est commune avec le type, 6 ex.

Aphodius (Orodalus) pusillus Herbst
Marne : La Forestière (692 2407), 11 mai 1976, 2 ex. Crottin de cheval.

Aphodius (Nimbus) contaminatus Herbst
Aube : Ossey-les-Trois-Maisons, ferme de Vaudepuits (702 2384). Espèce automnale, 10 ex. Crottin d'âne.

Aphodius (Volinus) equestris Panzer
Marne : Nesle-la-Reposte (690 2404), 20 sept. 1979, 4 ex. Bouse de vache.

Aphodius (Volinus) distinctus Müller
Aube : Ossey-les-Trois-Maisons, ferme de Vaudepuits (702 2384), février 1980, 10 ex. Crottin d'âne.

Aphodius (Volinus) melanostictus Schmidt
Aube : Mesnil-St-Père (749 2362), 11 avril 1976, 2 ex. Bouse de vache.

*Aphodius (Melinopterus) sphacelatus Panzer
Aube : Ossey-les-Trois-Maisons, ferme de Vaudepuits (702 2384), février 1980, 2 ex. Crottin d'âne.
Cette espèce n'est pas mentionnée dans le Catalogue LE GRAND (1861), ni dans le supplément (ANTESSANTY, 1911).

Aphodius (Melinopterus) prodromus Brahm
Aube : Mesnil-St-Père (749 2362), 11 avril 1976, 5 ex. Bouse de vache.

Aphodius (Melinopterus) consputus Creutzer
Aube : Ossey-les-Trois-Maisons, ferme de Vaudepuits (702 2384), février 1980, 5 ex. Crottin d'âne.

Aphodius (s. str.) fimetarius Linné
Aube : Ossey-les-Trois-Maisons, ferme de Vaudepuits (702 2384), 10 ex. Toute l'année. Crottin d'âne.

Aphodius (Bodilus) rufus Moll.
Marne : Sermiers, lieu dit Courtaumont (720 2462), août 1980, 10 ex. Bouse de vache.

Aphodius (Calamosternus) granarius Linné
Aube : Pars-lès-Romilly (702 2389), 10 ex. Toute l'année. Crotte de mouton.

3. GEOTRUPIDAE

Typhoeus typhoeus Linné
Marne : Sept-Saulx (740 2464), 17 nov. 1979, 10 ♂♂, 10 ♀♀. Crotte de lapin.

Geotrupes spiniger Marsham
Aube : Ossey-les-Trois-Maisons, ferme de Vaudepuits (702 2384), 31 août 1979, 10 ♂♂, 10 ♀♀. Crottin d'âne.

Geotrupes stercorosus Scriba
Marne : la Forestière, forêt de la Traconne (695 2408), août 1979, 10 ♂♂, 10 ♀♀. Excrément humain.

4. TROGIDAE

Trox perlatus Geoffroy
Marne : St-Martin-l'Heureux, camp de Moronvilliers (747 2473), 15 mars 1981, 3 ex. Pelotte de rapace.

Remarque. - Cette liste ne donne pas du tout la totalité des espèces coprophages capturées dans l'Aube et dans la Marne depuis 1861. Cela tient à deux raisons :
- le peu de chasses effectuées (6 sorties),
- une prospection dans des zones où l'élevage et l'étendue des prairies à bétail sont pratiquement inexistants.

Conclusion. - De nombreuses espèces, même communes, restent encore à capturer. Il serait bon, pour l'année 1981, de faire des recherches plus systématiques dans des parties du département aubois où l'élevage est pratiqué plus intensivement : régions de Lusigny-sur-Barse et de Mesnil-St-Père.

Remerciements. - Il m'est agréable de remercier ici M. J.-P. LUMARET (Laboratoire de Zoogéographie de Montpellier) qui a bien voulu se charger d'identifier mes captures.

RÉFÉRENCES

ANTESSANTY (G. d'), 1911. - Supplément à la liste des Coléoptères du département de l'Aube, publiée par G. Le Grand. - Mém. de la Soc. acad. de l'Aube, 75, 1911 : 7-63.

LAJOYE (A.), 1878. - Catalogue des Coléoptères des environs de Reims. - Bull. de la Soc. d'Hist. nat. de Reims, 2, 1878 : 72-83, 136-144 et 153-176.

LAJOYE (A.), 1896. - Catalogue des Coléoptères des environs de Reims. 2e édition, 231 p. - Reims.

LE GRAND (G.), 1861. - Liste des Coléoptères du département de l'Aube. - Mém. de la Soc. acad. de l'Aube, 25, 1861 : 181-274.

LUMARET (J.-P.), 1979. - Note technique. Un piège attractif pour la capture des Insectes coprophages et nécrophages. - L'Entomologiste, 35 (2), 1979 : 63-66.

LUMARET (J.-P.), 1980. - Contribution à l'étude de la distribution des Scarabéides en France. - L'Entomologiste, 36 (1), 1980 : 38-39, 4 réf.

5, allée Yves-Gandon, 51100 Reims

SÉLECTION D'ARTICLES RÉCENTS

par Roger MÉTAYE

Techniques

Les nids artificiels pour l'observation et l'élevage des Fourmis, par B.E. LORBER. - L'Entomologiste, 37 (2), 1981 : 83-88, 3 fig., 11 réf.

Généralités

Les pièces génitales et leur utilisation en entomologie, par M. MARTINEZ. - Cah. de Liais. OPIE, n° 31-35, 1978-79 : 72-78, 1 fig.

Coleoptera

Les Baudia (Col. Carab. Licinidae) de France et d'Europe occidentale, par J. BALAZUC. - L'Entomologiste, 37 (2), 1981 : 89-94, 1 fig. - Hte-Marne ...

Hymenoptera

Cartographie des Athalia de France (Hyménoptères Tenthredinidae), par H. CHEVIN. - Cah. de Liais. OPIE, n° 31-35, 1978-79 : 27-48, 17 fig. dont 14 cartes, 3 réf. - Aube, Marne, Hte-Marne ...

Lepidoptera

Contribution lépidoptérique française à la Cartographie des Invertébrés européens (C.I.E.). XI. Appel en faveur de la cartographie des Satyrides de France, par R. ESSAYAN. - Alexanor, 11 (8), 1980 : 356-363, 6 cartes. - Aube, Marne, Hte-Marne ...

Planipennia

Liste des Planipennes de France (Neuroptera), par P. LERAUT. - Bull. de la Soc. ent. de France, 85 (9-10), 1980 : 237-253, réf. (2 p.).

NOTE D'ÉLEVAGE
'LEP. HETEROCERA'

par Gérard MÉTIVIER

Au cours de l'année 1980, j'ai récolté sur Cerisier cultivé, dans mon jardin de Nogent-sur-Seine (686 2389), plusieurs chenilles que j'ai élevées et dont voici la liste :

Lasiocampidae	: Malacosoma neustria, 8 exemplaires
Geometridae	: Ourapteryx sambucaria, 2 ex.
Sphingidae	: Mimas tiliae, 4 ex.
Lymantriidae	: Euproctis chrysorrhoea, 2 ex.
	Lymantria dispar, 2 ex.
Noctuidae	: Amphipyra pyramidea, 2 ex.

6, rue Anatole-France, 10400 Nogent-sur-Seine

LISTE PRÉLIMINAIRE DES GEOMETRIDAE DE L'AUBE 'LEP.'

par Roger MÉTAYE

Depuis la publication du Catalogue JOURDHEUILLE (1883) et de son supplément (1889), il semble bien que rien n'ait été publié sur les Géométrides de l'Aube; aussi, une actualisation et une mise à jour s'imposaient-elles donc.
La Liste systématique et synonymique de LERAUT (1980) a permis d'établir cette liste préliminaire des Geometridae de l'Aube.

JOURDHEUILLE (1883) a signalé 208 espèces de "Geometrae" (et non 207 comme indiqué à la p. 229) auxquelles il faut ajouter les 2 espèces de "Brephides", soit un total de 210 espèces.
Dans son supplément de 1889, il cite 40 espèces dont 33 nouvelles pour le département (et non 29 comme indiqué p. 164), portant ainsi le total à 243.

Cet inventaire est à modifier par suppression ou addition.

À supprimer : 3 espèces.
- Acidalia holosericeata Dup. (JOURDHEUILLE, 1889 : 140) qui n'est qu'une forme d'Idaea dilutaria Hbn.
- Pseudoterpna coronillaria Hn. - JOURDHEUILLE (1883 : 94) écrit : "Ervy ? d'après M. Dupin; mais le renseignement me paraît douteux, et je crains qu'il n'ait pris pour cette espèce des individus défréchis (sic) de pruinata".
Effectivement, cette espèce, signalée de France méridionale et occidentale (LHOMME, 1923 : 609), ne figure pas dans la collection Dupin (Musée d'Histoire naturelle de Troyes).
- Abraxas pantaria L. - JOURDHEUILLE (1883 : 100) indique : "R. - Ervy, d'après M. Dupin".
LHOMME (1923 : 380) la donne comme étant méridionale et reprend la mention de Dupin. Or, cette espèce ne figure pas non plus dans la dite collection.

À ajouter : 5 espèces.
- la var. obeliscata de Cidaria variata est élevée au rang d'espèce;
- la var. automnata de C. dilutata, de même.
- Siona lineata, Hydriomena furcata et Isturgia limbaria (R. Métaye leg.), espèces nouvelles pour le département.

Le nouveau total est ainsi porté à 245 espèces, soit 41 % de la faune française.

Parmi les espèces confondues, il faut citer : Chlorissa viridata et cloraria, Theria rupicapraria et primaria (DUFAY, 1979), Thera variata et albonigrata (DUFAY, 1978). Dans la collection Dupin, l'espèce séparée n'étant pas représentée, le total ne change donc pas.

Ces 245 espèces, dont 142 sont figurées dans HERBULOT (1978), sont énumérées ci-après suivant l'ordre systématique adopté par LERAUT, chaque espèce étant précédée de son numéro d'ordre.
Les références indiquées se rapportent à trois ouvrages de base :
- Catalogue JOURDHEUILLE (1883) et son supplément (1889);
- Catalogue LHOMME, vol. I (1923-1935);
- Atlas des Lépidoptères de France, vol. III, par C. HERBULOT (1978).

Bull. du Gr. ent. aubois, 1 (3), 1981 : 81-101.

ARCHIEARINAE

3196 Archiearis parthenias Linnaeus. - Jourdheuille, p. 93, n° 2046. - Lhomme, p. 620, n° 1551. - Herbulot, p. 80, pl. VI, fig. 167, ♂.

3197 Archiearis notha Hübner. - Jourdheuille, p. 93, n° 2048 (nothum). - Lhomme, p. 621, n° 1552 et p. 622, n° 1553 (puella). - Herbulot, p. 80.

OENOCHROMINAE

3198 Alsophila aescularia Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 106, n° 2319. - Lhomme, p. 617, n° 1545. - Herbulot, p. 39, pl. VI, fig. 164, ♂.

3199 Alsophila quadripunctaria Esper. - Jourdheuille, p. 106, n° 2318 (aceraria). - Lhomme, p. 617, n° 1546 (quadripunctata).

GEOMETRINAE

Pseudoterpnini

3200 Aplasta ononaria Fuessly. - Jourdheuille, p. 112, n° 2501 et suppl., p. 143 (19). - Lhomme, p. 618, n° 1548. - Herbulot, p. 77, pl. VI, fig. 165, ♀.

3201 Pseudoterpna pruinata Hufnagel. - Jourdheuille, p. 94, n° 2051. - Lhomme, p. 609, n° 1528. - Herbulot, p. 76, pl. VI, fig. 156, ♂.

Geometrini

3204 Geometra papilionaria Linnaeus. - Jourdheuille, p. 94, n° 2054. - Lhomme, p. 610, n° 1530. - Herbulot, p. 77, pl. VI, fig. 157, ♂.

Comibaenini

3205 Comibaena bajularia Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 94, n° 2061 (pustulata). - Lhomme, p. 611, n° 1531 (pustulata). - Herbulot, p. 77 (pustulata), pl. VI, fig. 163, ♂.

Thalerini

3208 Hemithea aestivaria Hübner. - Jourdheuille, p. 95, n° 2077 (strigata). - Lhomme, p. 611, n° 1532. - Herbulot, p. 78, pl. VI, fig. 159, ♀.

3209 Chlorissa viridata Linnaeus. - Jourdheuille, p. 95, n° 2072. - Lhomme, p. 611, n° 1533. - Herbulot, p. 78.

3214 Thalera fimbrialis Scopoli. - Jourdheuille, p. 95, n° 2078. - Lhomme, p. 614, n° 1539. - Herbulot, p. 78, pl. VI, fig. 160, ♂.

3215 Hemistola chrysoprasaria Esper. - Jourdheuille, p. 94, n° 2059 (vernaria). - Lhomme, p. 615, n° 1540. - Herbulot, p. 79, pl. VI, fig. 162, ♂.

3216 Jodis lactearia Linnaeus. - Jourdheuille, p. 95, n° 2080. - Lhomme, p. 615, n° 1541. - Herbulot, p. 79, pl. VI, fig. 158, ♂.

STERRHINAE

Cyclophorini

3220 Cyclophora pendularia Clerck. - Jourdheuille, p. 99, n° 2217 (orbicularia). - Lhomme, p. 603, n° 1519 (orbicularia).

3222 Cyclophora annulata Schulze. - Jourdheuille, p. 99, n° 2218. - Lhomme, p. 604, n° 1521. - Herbulot, p. 70, pl. VI, fig. 154, ♀.

3223 Cyclophora albipunctata Hufnagel. - Jourdheuille, p. 99, n° 2216 (pendularia). - Lhomme, p. 602, n° 1518 (pendularia). - Herbulot, p. 70, pl. VI, fig. 150, ♂.

3226 Cyclophora porata Linnaeus. - Jourdheuille suppl., p. 140 (16), n° 2221. - Lhomme, p. 605, n° 1523.

3228 Cyclophora punctaria Linnaeus. - Jourdheuille, p. 99, n° 2222. - Lhomme, p. 607, n° 1526 (part.). - Herbulot, p. 72, pl. VI, fig. 151, ♀.

3230 Cyclophora linearia Hübner. - Jourdheuille, p. 99, n° 2223. - Lhomme, p. 608, n° 1527. - Herbulot, p. 72, pl. VI, fig. 155, ♂.

Calothysanini

3231 Timandra griseata W. Petersen. - Jourdheuille, p. 100, n° 2224 (amata). - Lhomme, p. 561, n° 1429 (amata). - Herbulot, p. 72, pl. V, fig. 134, ♀.

Scopulini

3234 Scopula tessellaria Boisduval. - Jourdheuille, p. 98, n° 2175. - Lhomme, p. 562, n° 1432. - Herbulot, p. 73.

3235 Scopula caricaria Reutti. - Jourdheuille, p. 98, n° 2197. - Lhomme, p. 567, n° 1442.

3237 Scopula umbelaria Hübner. - Jourdheuille, p. 98, n° 2201. - Lhomme, p. 568, n° 1446. - Herbulot, p. 75.

3238 Scopula nigropunctata Hufnagel. - Jourdheuille, p. 99, n° 2202 (strigilaria). - Lhomme, p. 569, n° 1447. - Herbulot, p. 75, pl. VI, fig. 139, ♂.

3239 Scopula virgulata Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 98, n° 2200 (strigaria). - Lhomme, p. 568, n° 1445.

3240 Scopula ornata Scopoli. - Jourdheuille, p. 99, n° 2210. - Lhomme, p. 570, n° 1450. - Herbulot, p. 75, pl. VI, fig. 140, ♂.

3242 Scopula decorata Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 99, n° 2212. - Lhomme, p. 570, n° 1451. - Herbulot, p. 75.

3243 Scopula rubiginata Hufnagel. - Jourdheuille, p. 98, n° 2178. - Lhomme, p. 563, n° 1433. - Herbulot, p. 73, pl. VI, fig. 137, ♂.

3246 Scopula marginepunctata Goeze. - Jourdheuille, p. 98, n° 2186. - Lhomme, p. 564, n° 1436.

3247 Scopula incanata Linnaeus. - Jourdheuille, p. 98, n° 2191. - Lhomme, p. 565, n° 1438. - Herbulot, p. 73.

3250 Scopula immutata Linnaeus. - Jourdheuille, p. 98, n° 2198. - Lhomme, p. 567, n° 1443.

3252 Scopula floslactata Haworth. - Jourdheuille, p. 98, n° 2194 (remutaria). - Lhomme, p. 565, n° 1439. - Herbulot, p. 74, pl. V, fig. 136, ♂.

3263 Idaea rufaria Hübner. - Jourdheuille, p. 96, n° 2097. - Lhomme, p. 575, n° 1462.

3265 Idaea macilentaria Herrich-Schäffer. - Jourdheuille, p. 96, n° 2096. - Lhomme, p. 576, n° 1463.

3266 Idaea ochrata Scopoli. - Jourdheuille suppl., p. 140 (16), n° 2094. - Lhomme, p. 575, n° 1461. - Herbulot, p. 67, pl. VI, fig. 141, ♂.

3267 Idaea serpentata Hufnagel. - Jourdheuille, p. 95, n° 2093 (perochraria). - Lhomme, p. 579, n° 1470.

3269 Idaea aureolaria Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 95, n° 2089 (trilineata). - Lhomme, p. 574, n° 1459.

3271 Idaea muricata Hufnagel. - Jourdheuille, p. 96, n° 2106. - Lhomme, p. 580, n° 1472. - Herbulot, p. 67, pl. VI, fig. 142, ♂.

3272 Idaea vulpinaria Herrich-Schäffer. - Jourdheuille, p. 97, n° 2160 (rusticata). - Lhomme, p. 596, n° 1506 (rusticata). - Herbulot, p. 69.

3281 Idaea moniliata Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille suppl., p. 140 (16), n° 2105. - Lhomme, p. 578, n° 1469.

3283 Idaea sylvestraria Hübner. - Jourdheuille, p. 96, n° 2129 (straminata). - Lhomme, p. 588, n° 1486.

3292 Idaea inquinata Scopoli. - Jourdheuille, p. 96, n° 2148 (herbariata). - Lhomme, p. 593, n° 1499 (herbariata). - Herbulot, p. 68, pl. VI, fig. 145, ♀.

3293 Idaea dilutaria Hübner. - Jourdheuille, p. 97, n° 2163 et suppl., p. 140 (16), n° 2164 (holosericeata). - Lhomme, p. 597, n° 1507.

3295 Idaea humiliata Hufnagel. - Jourdheuille, p. 97, n° 2162. - Lhomme, p. 598, n° 1509. - Herbulot, p. 69, pl. VI, fig. 147, ♂.

3300 Idaea seriata Schrank. - Jourdheuille, p. 96, n° 2125 (virgularia). - Lhomme, p. 585, n° 1482. - Herbulot, p. 67, pl. VI, fig. 143, ♂.

3303 Idaea dimidiata Hufnagel. - Jourdheuille, p. 96, n° 2107. - Lhomme, p. 580, n° 1473.

3305 Idaea pallidata Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 96, n° 2131. - Lhomme, p. 586, n° 1483.

3310 Idaea trigeminata Haworth. - Jourdheuille, p. 97, n° 2155 (bisetata). - Lhomme, p. 595, n° 1503. - Herbulot, p. 68.

3316 Idaea emarginata Linnaeus. - Jourdheuille, p. 97, n° 2173. - Lhomme, p. 601, n° 1515. - Herbulot, p. 69, pl. VI, fig. 149, ♂.

3317 Idaea aversata Linnaeus. - Jourdheuille, p. 97, n° 2172. - Lhomme, p. 601, n° 1514. - Herbulot, p. 69, pl. VI, fig. 148, ♂.

3319 Idaea degeneraria Hübner. - Jourdheuille, p. 97, n° 2170. - Lhomme, p. 598, n° 1510.

3320 Idaea straminata Borkhausen. - Jourdheuille, p. 97, n° 2171 (inornata). - Lhomme, p. 599, n° 1512.

Rhodostrophiini

3326 Rhodostrophia vibicaria Clerck. - Jourdheuille, p. 100, n° 2227. - Lhomme, p. 560, n° 1428. - Herbulot, p. 76, pl. V, fig. 133, ♂.

3327 Rhodostrophia calabra Petagna. - Jourdheuille suppl., p. 141 (17), n° 2229 (calabraria). - Lhomme, p. 560, n° 1428. - Herbulot, p. 76, pl. V, fig. 132, ♂.

LARENTIINAE

Lythriini

3332 Lythria purpuraria Linnaeus. - Jourdheuille, p. 112, n° 2507. - Lhomme, p. 454, n° 1180. - Herbulot, p. 65, fig. 8 a.

3334 Cataclysme riguata Hübner. - Jourdheuille, p. 118, n° 2667. - Lhomme, p. 521, n° 1328.

3336 Phibalapteryx virgata Hufnagel. - Jourdheuille, p. 113, n° 2522. - Lhomme, p. 460, n° 1192.

Xanthorhoini

3337 Scotopteryx moeniata Scopoli. - Jourdheuille, p. 112, n° 2514. - Lhomme, p. 458, n° 1186 (part.).

3343 Scotopteryx bipunctaria Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 112, n° 2521. - Lhomme, p. 459, n° 1190. - Herbulot, p. 60, pl. III, fig. 73, ♂.

3345 Scotopteryx chenopodiata Linnaeus. - Jourdheuille, p. 112, n° 2513 (limitata). - Lhomme, p. 457, n° 1185. - Herbulot, p. 60, pl. III, fig. 72, ♂.

3347 Scotopteryx luridata Hufnagel. - Jourdheuille, p. 112, n° 2511 (plumbaria). - Lhomme, p. 457, n° 1184 (mucronata part.).

3349 Orthonama vittata Borkhausen. - Jourdheuille suppl., p. 144 (20), n° 2641. - Lhomme, p. 488, n° 1255 (lignata).

3350 Orthonama obstipata Fabricius. - Jourdheuille, p. 118, n° 2640 (fluviata). - Lhomme, p. 488, n° 1254.

3352 Xanthorhoe designata Hufnagel. - Jourdheuille, p. 117, n° 2637. - Lhomme, p. 487, n° 1253. - Herbulot, p. 59, pl. IV, fig. 94, ♀.

3355 Xanthorhoe ferrugata Clerck. - Jourdheuille, p. 117, n° 2632. - Lhomme, p. 486, n° 1251. - Herbulot, p. 59.

3356 Xanthorhoe quadrifasiata Clerck. - Jourdheuille, p. 117, n° 2631 (quadrifasciaria). - Lhomme, p. 485, n° 1249 (quadrifasciata).

3357 Xanthorhoe montanata Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 117, n° 2629. - Lhomme, p. 485, n° 1248. - Herbulot, p. 59, pl. IV, fig. 99, ♂.

3358 Xanthorhoe fluctuata Linnaeus. - Jourdheuille, p. 117, n° 2627. - Lhomme, p. 483, n° 1245. - Herbulot, p. 58, pl. IV, fig. 90, ♀.

3363 Catarhoe rubidata Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 120, n° 2726. - Lhomme, p. 503, n° 1289. - Herbulot, p. 60, pl. IV, fig. 98, ♂.

3367 Epirrhoe tristata Linnaeus. - Jourdheuille, p. 119, n° 2689. - Lhomme, p. 512, n° 1307. - Herbulot, p. 62, pl. IV, fig. 105, ♀.

3368 Epirrhoe alternata O.F. Müller. - Jourdheuille, p. 119, n° 2679 (sociata). - Lhomme, p. 514, n° 1312. - Herbulot, p. 62, pl. IV, fig. 104, ♀.

3369 Epirrhoe rivata Hübner. - Jourdheuille, p. 118, n° 2678. - Lhomme, p. 513, n° 1311. - Herbulot, p. 62, pl. IV, fig. 103, ♀.

3371 Epirrhoe galiata Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 118, n° 2677. - Lhomme, p. 513, n° 1310. - Herbulot, p. 62, pl. IV, fig. 101, ♂.

3373 Protorhoe corollaria Herrich-Schäffer. - Jourdheuille, p. 118, n° 2674.

3375 Camptogramma bilineata Linnaeus. - Jourdheuille, p. 120, n° 2714. - Lhomme, p. 508, n° 1299. - Herbulot, p. 62, pl. V, fig. 113, ♀.

Larentiini

3385 Anticlea badiata Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 115, n° 2577. - Lhomme, p. 520, n° 1326. - Herbulot, p. 42, pl. V, fig. 117, ♂.

3386 Anticlea derivata Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 120, n° 2724 (nigrofasciaria). - Lhomme, p. 502, n° 1285. - Herbulot, p. 43, pl. IV, fig. 97, ♂.

3387 Mesoleuca albicillata Linnaeus. - Jourdheuille, p. 119, n° 2683. - Lhomme, p. 510, n° 1304. - Herbulot, p. 43, pl. V, fig. 110, ♂.

3388 Pelurga comitata Linnaeus. - Jourdheuille suppl., p. 144 (20), n° 2728. - Lhomme, p. 521, n° 1327.

Cidariini

3390 Cosmorhoe ocellata Linnaeus. - Jourdheuille, p. 116, n° 2591. - Lhomme, p. 477, n° 1232. - Herbulot, p. 43, pl. IV, fig. 87. ♀.

3391 Nebula salicata Hübner. - Jourdheuille suppl., p. 144 (20), n° 2616. - Lhomme, p. 493, n° 1265.

3396 Eulithis prunata Linnaeus. - Jourdheuille, p. 115, n° 2579. - Lhomme, p. 474, n° 1226. - Herbulot, p. 44, pl. IV, fig. 85, ♂.

3397 Eulithis testata Linnaeus. - Jourdheuille, p. 115, n° 2584. - Lhomme, p. 474, n° 1227. - Herbulot, p. 44.

3398 Eulithis populata Linnaeus. - Jourdheuille, p. 115, n° 2585. - Lhomme, p. 475, n° 1228. - Herbulot, p. 44.

3400 Eulithis pyraliata Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 115, n° 2588 (dotata). - Lhomme, p. 476, n° 1230.

3403 Chloroclysta siterata Hufnagel. - Jourdheuille, p. 116, n° 2597. - Lhomme, p. 480, n° 1240. - Herbulot, p. 45, pl. IV, fig. 88, ♂.

3404 Chloroclysta miata Linnaeus. - Jourdheuille, p. 116, n° 2598. - Lhomme, p. 480, n° 1241.

3406 Chloroclysta truncata Hufnagel. - Jourdheuille, p. 116, n° 2601. - Lhomme, p. 481, n° 1242. - Herbulot, p. 45, pl. IV, fig. 89, ♀.

3407 Cidaria fulvata Forster. - Jourdheuille, p. 115, n° 2590. - Lhomme, p. 476, n° 1231. - Herbulot, p. 45, pl. IV, fig. 86, ♂.

3408 Plemyria rubiginata Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 116, n° 2592 (bicolorata). - Lhomme, p. 477, n° 1233 (bicolorata). - Herbulot, p. 45, pl. IV, fig. 92, ♂.

3409 Thera firmata Hübner. - Jourdheuille, p. 117, n° 2603. - Lhomme, p. 480, n° 1239.

3410 Thera obeliscata Hübner. - Jourdheuille, p. 116, n° 2593 (variata v. obeliscata). - Lhomme, p. 478, n° 1235. - Herbulot, p. 46, pl. IV, fig. 91, ♂.

3411 Thera variata Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 116, n° 2593 (part.). - Lhomme, p. 477, n° 1234 (part.).

3415 Thera juniperata Linnaeus. - Jourdheuille, p. 116, n° 2595. - Lhomme, p. 479, n° 1237. - Herbulot, p. 46.

3418 Electrophaes corylata Thunberg. - Jourdheuille, p. 120, n° 2722. - Lhomme, p. 509, n° 1302. - Herbulot, p. 46, pl. V, fig. 109, ♀.

3420 Colostygia olivata Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 117, n° 2608. - Lhomme, p. 490, n° 1257.

3427 Colostygia pectinataria Knoch. - Jourdheuille, p. 117, n° 2609 (viridaria). - Lhomme, p. 490, n° 1258. - Herbulot, p. 43, pl. IV, fig. 95, ♀.

Hydriomenini

3429 Hydriomena furcata Thunberg. - Lhomme, p. 519, n° 1323. - Herbulot, p. 46, pl. V, fig. 116, ♂.

3430 Hydriomena impluviata Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 120, n° 2717 (trifasciata). - Lhomme, p. 519, n° 1324 (coerulata).

Rheumapterini

3435 Horisme vitalbata Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 121, n° 2732. - Lhomme, p. 559, n° 1423. - Herbulot, p. 47, pl. V, fig. 130, ♀.

3436 Horisme tersata Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 121, n° 2734. - Lhomme, p. 559, n° 1424. - Herbulot, p. 47, pl. V, fig. 131, ♂.

3440 Horisme aquata Hübner. - Jourdheuille, p. 121, n° 2731. - Lhomme, p. 558, n° 1422.

3441 Melanthia procellata Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 119, n° 2684. - Lhomme, p. 511, n° 1305. - Herbulot, p. 47, pl. V, fig. 111, ♀.

3444 Pareulype berberata Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 120, n° 2723. - Lhomme, p. 502, n° 1284. - Herbulot, p. 47, pl. IV, fig. 96, ♂.

3446 Rheumaptera hastata Linnaeus. - Jourdheuille, p. 119, n° 2688. - Lhomme, p. 512, n° 1306 (part.). - Herbulot, p. 48, pl. V, fig. 112, ♀.

3448 Rheumaptera cervinalis Scopoli. - Jourdheuille, p. 114, n° 2572 (certata). - Lhomme, p. 472, n° 1220.

3450 Rheumaptera undulata Linnaeus. - Jourdheuille, p. 114, n° 2574. - Lhomme, p. 472, n° 1222.

3452 Triphosa dubitata Linnaeus. - Jourdheuille, p. 114, n° 2570. - Lhomme, p. 471, n° 1219. - Herbulot, p. 48, pl. IV, fig. 83, ♂.

3454 Philereme vetulata Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 115, n° 2575. - Lhomme, p. 473, n° 1223.

3455 Philereme transversata Hufnagel. - Jourdheuille, p. 115, n° 2576 (rhamnata). - Lhomme, p. 473, n° 1224. - Herbulot, p. 49, pl. IV, fig. 84, ♂.

Operophterini

3460 Epirrita dilutata Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 118, n° 2642. - Lhomme, p. 470, n° 1215. - Herbulot, p. 41, pl. IV, fig. 81, ♂.

3462 Epirrita autumnata Borkhausen. - Jourdheuille suppl., p. 144 (20), n° 2642 (dilutata v. automnata). - Lhomme, p. 470, n° 1217.

3463 Operophtera brumata Linnaeus. - Jourdheuille, p. 114, n° 2566. - Lhomme, p. 470, n° 1214. - Herbulot, p. 41, pl. IV, fig. 80, ♂, ♀.

Perizomini

3468 Perizoma alchemillata Linnaeus. - Jourdheuille, p. 119, n° 2694. - Lhomme, p. 515, n° 1315. - Herbulot, p. 57, pl. V, fig. 114, ♂.

3471 Perizoma bifaciata Haworth. - Jourdheuille suppl., p. 144 (20), n° 2697 (unifasciata). - Lhomme, p. 516, n° 1318 (bifasciata).

3474 Perizoma albulata Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 119, n° 2700. - Lhomme, p. 518, n° 1321. - Herbulot, p. 57, pl. V, fig. 115, ♀.

Eupitheciini

3484 Eupithecia tenuiata Hübner. - Jourdheuille suppl., p. 146 (22) n° 2797. - Lhomme, p. 525, n° 1337. - Herbulot, p. 51.

3486 Eupithecia haworthiata Doubleday. - Jourdheuille suppl., p. 146 (22), n° 2796 (isogrammaria). - Lhomme, p. 526, n° 1338. - Herbulot, p. 51.

3488 Eupithecia plumbeolata Haworth. - Jourdheuille suppl., p. 147 (23), n° 2799. - Lhomme, p. 526, n° 1340. - Herbulot, p. 51.

3491 Eupithecia linariata Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille suppl., p. 145 (21), n° 2756. - Lhomme, p. 528, n° 1343. - Herbulot, p. 52, pl. V, fig. 121, ♀.

3493 Eupithecia pyreneata Mabille. - Jourdheuille suppl., p. 145 (21), n° 2756 bis (digitaliata). - Lhomme, p. 528, n° 1344 (pulchellata part.).

3494 Eupithecia laquaearia Herrich-Schäffer. - Jourdheuille suppl., p. 146 (22), n° 2757. - Lhomme, p. 529, n° 1345.

3496 Eupithecia irriguata Hübner. - Jourdheuille, p. 121, n° 2747. - Lhomme, p. 529, n° 1347.

3497 Eupithecia exiguata Hübner. - Jourdheuille, p. 123, n° 2838. - Lhomme, p. 530, n° 1348.

3500 Eupithecia valerianata Hübner. - Jourdheuille suppl., p. 147 (23), n° 2800. - Lhomme, p. 531, n° 1350.

3507 Eupithecia venosata Fabricius. - Jourdheuille, p. 121, n° 2751. - Lhomme, p. 533, n° 1356. - Herbulot, p. 52, pl. V, fig. 126, ♂.

3513 Eupithecia centaureata Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 121, n° 2742 (oblongata). - Lhomme, p. 534, n° 1361. - Herbulot, p. 52 (centaurearia), pl. V, fig. 127, ♂.

3519 Eupithecia trisignaria Herrich-Schäffer. - Jourdheuille suppl., p. 147 (23), n° 2811. - Lhomme, p. 536, n° 1366.

3524 Eupithecia satyrata Hübner. - Jourdheuille, p. 122, n° 2805. - Lhomme, p. 538, n° 1372. - Herbulot, p. 52.

3525 Eupithecia absinthiata Clerck. - Jourdheuille, p. 123, n° 2820. - Lhomme, p. 539, n° 1374 et p. 540, n° 1376 (expallidata). - Herbulot, p. 53.

3526 Eupithecia goossensiata Mabille. - Jourdheuille, p. 123, n° 2818 (minutata). - Lhomme, p. 540, n° 1375.

3527 Eupithecia assimilata Doubleday. - Jourdheuille, p. 123, n° 2817. - Lhomme, p. 540, n° 1377. - Herbulot, p. 53.

3528 Eupithecia vulgata Haworth. - Jourdheuille, p. 123, n° 2813. - Lhomme, p. 540, n° 1378. - Herbulot, p. 53, pl. V, fig. 125, ♂.

3529 Eupithecia tripunctaria Herrich-Schäffer. - Jourdheuille, p. 123, n° 2815 (albipunctata). - Lhomme, p. 539, n° 1373. - Herbulot, p. 52.

3530 Eupithecia denotata Hübner. - Jourdheuille suppl., p. 147 (23), n° 2814 (campanulata). - Lhomme, p. 541, n° 1379. - Herbulot, p. 53.

3531 Eupithecia subfuscata Haworth. - Jourdheuille, p. 122, n° 2810 (castigata). - Lhomme, p. 541, n° 1380 (castigata). - Herbulot, p. 54.

3532 Eupithecia icterata de Villers. - Jourdheuille suppl., p. 146 (22), n° 2770 (subfulvata). - Lhomme, p. 542, n° 1381. - Herbulot, p. 54, pl. V, fig. 124, ♀.

3533 Eupithecia succenturiata Linnaeus. - Jourdheuille, p. 122, n° 2769. - Lhomme, p. 543, n° 1382.

3537 Eupithecia subumbrata Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 122, n° 2765 (scabiosata). - Lhomme, p. 544, n° 1386. - Herbulot, p. 54.

3541 Eupithecia millefoliata Rössler. - Jourdheuille, p. 122, n° 2767 et suppl., p. 146 (22). - Lhomme, p. 545, n° 1388.

3542 Eupithecia simpliciata Haworth. - Jourdheuille suppl., p. 145 (21), n° 2754 (subnotata). - Lhomme, p. 545, n° 1389. - Herbulot, p. 54.

3552 Eupithecia pimpinellata Hübner. - Jourdheuille, p. 123, n° 2822. - Lhomme, p. 548, n° 1396. - Herbulot, p. 55.

3554 Eupithecia nanata Hübner. - Jourdheuille, p. 122, n° 2773. - Lhomme, p. 549, n° 1398. - Herbulot, p. 55.

3557 Eupithecia virgaureata Doubleday. - Jourdheuille suppl., p. 147 (23), n° 2812. - Lhomme, p. 550, n° 1401. - Herbulot, p. 55.

3558 Eupithecia abbreviata Stephens. - Jourdheuille, p. 123, n° 2836. - Lhomme, p. 551, n° 1402. - Herbulot, p. 56, pl. V, fig. 122, ♂.

3559 Eupithecia dodoneata Guenée. - Jourdheuille, p. 123, n° 2837. - Lhomme, p. 551, n° 1403.

3562 Eupithecia pusillata Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 124, n° 2845 (sobrinata). - Lhomme, p. 552, n° 1407 (sobrinata). - Herbulot, p. 56, pl. V, fig. 123, ♂.

3571 Eupithecia tantillaria Boisduval. - Jourdheuille, p. 121, n° 2758 (pusillata). - Lhomme, p. 554, n° 1413. - Herbulot, p. 56.

3572 Gymnoscelis rufifasciata Haworth. - Jourdheuille, p. 124, n° 2849 (pumilata). - Lhomme, p. 555, n° 1415 (pumilata). - Herbulot, p. 56, pl. V, fig. 129, ♀.

3573 Chloroclystis v-ata Haworth. - Jourdheuille suppl., p. 146 (22), n° 2762 (coronata). - Lhomme, p. 556, n° 1416 (coronata).

3575 Chloroclystis rectangulata Linnaeus. - Jourdheuille, p. 122, n° 2763. - Lhomme, p. 556, n° 1418. - Herbulot, p. 57, pl. V, fig. 128, ♀.

3577 Anticollix sparsata Treitschke. - Jourdheuille suppl., p. 145 (21), n° 2740. - Lhomme, p. 557, n° 1420.

Chesiadini

3578 Chesias legatella Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 113, n° 2553 (spartiata). - Lhomme, p. 465, n° 1203. - Herbulot, p. 63, pl. III, fig. 75, ♂.

3579 Chesias rufata Fabricius. - Jourdheuille, p. 113, n° 2554. - Lhomme, p. 465, n° 1204. - Herbulot, p. 63, pl. III, fig. 76, ♂.

3582 Aplocera plagiata Linnaeus. - Jourdheuille, p. 113, n° 2543. - Lhomme, p. 463, n° 1199. - Herbulot, p. 63, pl. III, fig. 74, ♀.

3588 Odezia atrata Linnaeus. - Jourdheuille, p. 113, n° 2529. - Lhomme, p. 618, n° 1549. - Herbulot, p. 64, pl. VI, fig. 166, ♂.

Asthenini

3595 Euchoeca nebulata Scopoli. - Jourdheuille, p. 120, n° 2710 (obliterata). - Lhomme, p. 523, n° 1333. - Herbulot, p. 40, pl. V, fig. 118, ♂.

3596 Asthena albulata Hufnagel. - Jourdheuille, p. 119, n° 2702 (candidata). - Lhomme, p. 524, n° 1335. - Herbulot, p. 40, pl. V, fig. 120, ♂.

3598 Hydrelia flammeolaria Hufnagel. - Jourdheuille, p. 120, n° 2709 (luteata). - Lhomme, p. 523, n° 1332. - Herbulot, p. 40, pl. V, fig. 119, ♂.

3600 Minoa murinata Scopoli. - Jourdheuille, p. 113, n° 2523. - Lhomme, p. 461, n° 1193. - Herbulot, p. 41, pl. IV, fig. 77, ♂.

Lobophorini

3601 Lobophora halterata Hufnagel. - Jourdheuille, p. 114, n° 2560. - Lhomme, p. 468, n° 1211. - Herbulot, p. 65, pl. IV, fig. 79, ♂.

3603 Trichopteryx carpinata Borkhausen. - Jourdheuille, p. 114, n° 2559. - Lhomme, p. 468, n° 1210.

3605 Pterapherapteryx sexalata Retzius. - Jourdheuille, p. 114, n° 2561 (sexalisata). - Lhomme, p. 469, n° 1212.

3607 Acasis viretata Hübner. - Jourdheuille suppl., p. 143 (19), n° 2563. - Lhomme, p. 466, n° 1206.

BOARMIINAE

Abraxini

3609 Abraxas grossulariata Linnaeus. - Jourdheuille, p. 100, n° 2232. - Lhomme, p. 379, n° 1011. - Herbulot, p. 14, pl. I, fig. 1, ♀.

3612 Lomaspilis marginata Linnaeus. - Jourdheuille, p. 100, n° 2237. - Lhomme, p. 380, n° 1014. - Herbulot, p. 15, fig. 5 et pl. I, fig. 3, ♂.

3613 Ligdia adustata Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 100, n° 2236. - Lhomme, p. 381, n° 1015. - Herbulot, p. 15, pl. I, fig. 4, ♀.

3614 Stegania cararia Hübner. - Jourdheuille, p. 101, n° 2247. - Lhomme, p. 383, n° 1019.

3615 Stegania trimaculata de Villers. - Jourdheuille suppl., p. 141 (17), n° 2245. - Lhomme, p. 383, n° 1020.

Semiothisini

3617 Semiothisa notata Linnaeus. - Jourdheuille, p. 105, n° 2297. - Lhomme, p. 399, n° 1052. - Herbulot, p. 16, pl. II, fig. 29, ♂.

3618 Semiothisa alternaria Hübner. - Jourdheuille, p. 105, n° 2298. - Lhomme, p. 399, n° 1053. - Herbulot, p. 16, pl. II, fig. 30, ♂.

3620 Semiothisa liturata Clerck. - Jourdheuille, p. 105, n° 2304. - Lhomme, p. 399, n° 1055. - Herbulot, p. 16, pl. II, fig. 31, ♂.

3621 Semiothisa clathrata Linnaeus. - Jourdheuille, p. 111, n° 2460. - Lhomme, p. 444, n° 1158. - Herbulot, p. 17, pl. III, fig. 63, ♀.

3622 Semiothisa glarearia Brahm. - Jourdheuille, p. 111, n° 2458. - Lhomme, p. 445, n° 1159.

3623 Semiothisa artesiaria Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille suppl., p. 143 (19), n° 2452. - Lhomme, p. 442, n° 1153.

3627 Isturgia limbaria Fabricius. - Lhomme, p. 435, n° 1138. - Herbulot, p. 17 (roraria), pl. III, fig. 57, ♂.

3629 Itame wauaria Linnaeus. - Jourdheuille, p. 110, n° 2447. - Lhomme, p. 440, n° 1149. - Herbulot, p. 17, pl. III, fig. 61, ♂.

3631 Tephrina murinaria Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 111, n° 2462. - Lhomme, p. 445, n° 1160. - Herbulot, p. 18, pl. III, fig. 64, ♂.

Ennomini

3638 Cepphis advenaria Hübner. - Jourdheuille, p. 104, n° 2286. - Lhomme, p. 397, n° 1049. - Herbulot, p. 18, pl. II, fig. 27, ♀.

3639 Petrophora chlorosata Scopoli. - Jourdheuille, p. 110, n° 2453 (petraria). - Lhomme, p. 442, n° 1154. - Herbulot, p. 18, pl. III, fig. 69, ♂.

3644 Plagodis pulveraria Linnaeus. - Jourdheuille, p. 101, n° 2252. - Lhomme, p. 384, n° 1023. - Herbulot, p. 19, pl. I, fig. 5, ♂.

3645 Plagodis dolabraria Linnaeus. - Jourdheuille, p. 103, n° 2276. - Lhomme, p. 395, n° 1045. - Herbulot, p. 18, pl. I, fig. 23, ♂.

3646 Pachycnemia hippocastanaria Hübner. - Jourdheuille, p. 109, n° 2381. - Lhomme, p. 421, n° 1107. - Herbulot, p. 19, pl. III, fig. 52, ♀.

3649 Opisthograptis luteolata Linnaeus. - Jourdheuille, p. 104, n° 2280. - Lhomme, p. 396, n° 1046. - Herbulot, p. 19, pl. II, fig. 25, ♀.

3650 Epione repandaria Hufnagel. - Jourdheuille, p. 104, n° 2284 (apiciaria). - Lhomme, p. 396, n° 1047. - Herbulot, p. 19, pl. II, fig. 26, ♀.

3651 Epione parallelaria Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille suppl., p. 142 (18), n° 2285 (vespertaria). - Lhomme, p. 397, n° 1048 (vespertaria). - Herbulot, p. 20.

3652 Pseudopanthera macularia Linnaeus. - Jourdheuille, p. 105, n° 2291. - Lhomme, p. 398, n° 1051. - Herbulot, p. 20, pl. II, fig. 28, ♀.

3654 Apeira syringaria Linnaeus. - Jourdheuille, p. 103, n° 2268. - Lhomme, p. 392, n° 1037. - Herbulot, p. 20, pl. I, fig. 19, ♂.

3656 Ennomos autumnaria Werneburg. - Jourdheuille, p. 102, n° 2259. - Lhomme, p. 388, n° 1028.

3657 Ennomos quercinaria Hufnagel. - Jourdheuille, p. 102, n° 2258. - Lhomme, p. 388, n° 1029. - Herbulot, p. 21, pl. I, fig. 13, ♂.

3659 Ennomos fuscantaria Stephens. - Jourdheuille suppl., p. 141 (17), n° 2261. - Lhomme, p. 389, n° 1031. - Herbulot, p. 22, pl. I, fig. 14, ♂.

3660 Ennomos erosaria Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 102, n° 2263. - Lhomme, p. 390, n° 1032. - Herbulot, p. 22.

3662 Selenia dentaria Fabricius. - Jourdheuille, p. 102, n° 2265 (bilunaria). - Lhomme, p. 391, n° 1034. - Herbulot, p. 22, pl. I, fig. 16 a, ♂, 16 b, ♀.

3663 Selenia lunularia Hübner. - Jourdheuille, p. 103, n° 2266 (lunaria). - Lhomme, p. 391, n° 1035 (lunaria). - Herbulot, p. 23, pl. I, fig. 17, ♀.

3664 Selenia tetralunaria Hufnagel. - Jourdheuille, p. 103, n° 2267. - Lhomme, p. 391, n° 1036. - Herbulot, p. 23, pl. I, fig. 18, ♂.

3665 Odontopera bidentata Clerck. - Jourdheuille suppl., p. 142 (18), n° 2270. - Lhomme, p. 392, n° 1038. - Herbulot, p. 23, pl. I, fig. 12, ♂.

3667 Crocallis elinguaria Linnaeus. - Jourdheuille, p. 103, n° 2274. - Lhomme, p. 394, n° 1041. - Herbulot, p. 24, pl. I, fig. 20, ♂.

Ourapterygini

3669 Ourapteryx sambucaria Linnaeus. - Jourdheuille, p. 104, n° 2279. - Lhomme, p. 395, n° 1044. - Herbulot, p. 24 (sambuscaria), pl. I, fig. 22, ♂.

Colotoini

3670 Colotois pennaria Linnaeus. - Jourdheuille, p. 103, n° 2272. - Lhomme, p. 393, n° 1039. - Herbulot, p. 24, pl. I, fig. 24, ♂.

Angeronini

3671 Angerona prunaria Linnaeus. - Jourdheuille, p. 104, n° 2277 et suppl., p. 142 (18). - Lhomme, p. 394, n° 1043. - Herbulot, p. 25, pl. I, fig. 21 a, ♂, 21 b, ♀.

Bistonini

3672 Apocheima hispidaria Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 107, n° 2322 (hispidarius). - Lhomme, p. 403, n° 1064. - Herbulot, p. 25.

3673 Apocheima pilosaria Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 106, n° 2320 (pedaria). - Lhomme, p. 403, n° 1063 (pedaria). - Herbulot, p. 25, pl. II, fig. 37, ♂.

3674 Lycia hirtaria Clerck. - Jourdheuille, p. 107, n° 2332 (hirtarius). - Lhomme, p. 405, n° 1068. - Herbulot, p. 26, pl. II, fig. 38, ♂.

3677 Lycia zonaria Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 107, n° 2328 (zonarius). - Lhomme, p. 404, n° 1066.

3678 Lycia pomonaria Hübner. - Jourdheuille, p. 107, n° 2324 (pomonarius). - Lhomme, p. 404, n° 1065.

3679 Biston strataria Hufnagel. - Jourdheuille, p. 107, n° 2333 (stratarius). - Lhomme, p. 405, n° 1069. - Herbulot, p. 26, pl. II, fig. 39, ♂.

3680 Biston betularia Linnaeus. - Jourdheuille, p. 107, n° 2334 (betularius). - Lhomme, p. 406, n° 1070. - Herbulot, p. 26, pl. II, fig. 40, ♂.

3682 Agriopis leucophaearia Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 105, n° 2313. - Lhomme, p. 401, n° 1059. - Herbulot, p. 27, pl. II, fig. 33, ♂.

3683 Agriopis bajaria Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 105, n° 2312. - Lhomme, p. 400, n° 1058.

3684 Agriopis aurantiaria Hübner. - Jourdheuille, p. 106, n° 2314. - Lhomme, p. 401, n° 1060. - Herbulot, p. 27, pl. II, fig. 34, ♂.

3685 Agriopis marginaria Fabricius. - Jourdheuille, p. 106, n° 2315. - Lhomme, p. 402, n° 1061. - Herbulot, p. 27, pl. II, fig. 36, ♂, ♀.

3686 Erannis defoliaria Clerck. - Jourdheuille, p. 106, n° 2317. - Lhomme, p. 402, n° 1062. - Herbulot, p. 28, pl. II, fig. 35, ♂, ♀.

Boarmiini

3700 Peribatodes rhomboidaria Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 108, n° 2357 (gemmaria). - Lhomme, p. 411, n° 1083. - Herbulot, p. 29, pl. II, fig. 44, ♂.

3708 Peribatodes manuelaria Herrich-Schäffer. - Jourdheuille suppl., p. 142 (18), n° 2358 (ilicaria). - Lhomme, p. 412, n° 1085. - Herbulot, p. 30.

3711 Cleora cinctaria Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 108, n° 2356. - Lhomme, p. 410, n° 1082. - Herbulot, p. 30, pl. II, fig. 43, ♂.

3712 Deileptenia ribeata Clerck. - Jourdheuille suppl., p. 142 (18), n° 2359 (abietaria). - Lhomme, p. 413, n° 1087.

3713 Alcis repandata Linnaeus. - Jourdheuille, p. 108, n° 2364. - Lhomme, p. 413, n° 1089. - Herbulot, p. 30, pl. II, fig. 45, ♂.

3717 Boarmia roboraria Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 108, n° 2366. - Lhomme, p. 415, n° 1094. - Herbulot, p. 31, pl. II, fig. 47, ♂.

3719 Serraca punctinalis Scopoli. - Jourdheuille, p. 108, n° 2368 (consortaria). - Lhomme, p. 416, n° 1095. - Herbulot, p. 31, pl. II, fig. 48, ♂.

3720 Cleorodes lichenaria Hufnagel. - Jourdheuille, p. 108, n° 2370. - Lhomme, p. 414, n° 1092. - Herbulot, p. 31, pl. II, fig. 46, ♂.

3721 Fagivorina arenaria Hufnagel. - Jourdheuille, p. 108, n° 2369 (angularia). - Lhomme, p. 414, n° 1091.

3724 Ectropis crepuscularia Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 109, n° 2374. - Lhomme, p. 416, n° 1097. - Herbulot, p. 31 (bistortata), pl. III, fig. 49, ♂.

3725 Ectropis consonaria Hübner. - Jourdheuille, p. 109, n° 2375. - Lhomme, p. 417, n° 1099. - Herbulot, p. 32.

3726 Ectropis extersaria Hübner. - Jourdheuille, p. 109, n° 2376 (luridata). - Lhomme, p. 418, n° 1100. - Herbulot, p. 32.

3727 Aethalura punctulata Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 109, n° 2377 (punctularia). - Lhomme, p. 418, n° 1101. - Herbulot, p. 32, pl. III, fig. 51, ♂.

3728 Ematurga atomaria Linnaeus. - Jourdheuille, p. 110, n° 2435. - Lhomme, p. 437, n° 1143. - Herbulot, p. 32, pl. III, fig. 59, ♂.

3730 Adactylotis contaminaria Hübner. - Jourdheuille suppl., p. 143 (19), n° 2445. - Lhomme, p. 441, n° 1151.

3731 Tephronia sepiaria Hufnagel. - Jourdheuille, p. 109, n° 2379. - Lhomme, p. 419, n° 1102. - Herbulot, p. 33.

Bupalini

3735 Bupalus piniaria Linnaeus. - Jourdheuille, p. 110, n° 2436 (piniarius). - Lhomme, p. 438, n° 1144. - Herbulot, p. 33, pl. III, fig. 60, ♂.

Caberini

3736 Cabera pusaria Linnaeus. - Jourdheuille, p. 101, n° 2249. - Lhomme, p. 384, n° 1021. - Herbulot, p. 34, pl. I, fig. 7, ♂.

3737 Cabera exanthemata Scopoli. - Jourdheuille, p. 101, n° 2250. - Lhomme, p. 384, n° 1022. - Herbulot, p. 34, pl. I, fig. 8, ♂.

3738 Lomographa bimaculata Fabricius. - Jourdheuille, p. 100, n° 2243. - Lhomme, p. 382, n° 1017. - Herbulot, p. 34, pl. I, fig. 9, ♂.

3739 Lomographa temerata Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 101, n° 2244. - Lhomme, p. 382, n° 1018. - Herbulot, p. 34, pl. I, fig. 10, ♂.

3740 Aleucis distinctata Herrich-Schäffer. - Jourdheuille suppl., p. 141 (17), n° 2242 (pictaria). - Lhomme, p. 381, n° 1016. - Herbulot, p. 35.

Theriini

3741 Theria rupicapraria Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 105, n° 2311 (part.). - Lhomme, p. 400, n° 1057 (part.). - Herbulot, p. 35, pl. II, fig. 32, ♂.

Campaeini

3743 Campaea margaritata Linnaeus. - Jourdheuille, p. 102, n° 2256 (margaritaria). - Lhomme, p. 387, n° 1026. - Herbulot, p. 36, pl. I, fig. 11, ♀.

3744 Campaea honoraria Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 102, n° 2257. - Lhomme, p. 387, n° 1027. - Herbulot, p. 36.

3745 Hylaea fasciaria Linnaeus. - Jourdheuille, p. 101, n° 2254 (prosapiaria). - Lhomme, p. 385, n° 1025. - Herbulot, p. 35, pl. I, fig. 6 a, ♀, 6 b, ♂.

Gnophini

3750 Gnophos furvatus Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 109, n° 2384 (furvata) et suppl., p. 142 (18) (furvata). - Lhomme, p. 422, n° 1111. - Herbulot, p. 37, pl. III, fig. 54, ♂.

3753 Gnophos obscuratus Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 110, n° 2387 (obscuraria) et suppl., p. 143 (19) (obscuraria). - Lhomme, p. 423, n° 1112 (obscurata). - Herbulot, p. 37, pl. III, fig. 53, ♂.

3760 Gnophos variegatus Duponchel. - Jourdheuille, p. 110, n° 2395 (variegata). - Lhomme, p. 426, n° 1117 (variegata).

3778 Siona lineata Scopoli. - Lhomme, p. 449, n° 1170. - Herbulot, p. 38, pl. III, fig. 66, ♀.

3780 Aspitates gilvaria Denis & Schiffermüller. - Jourdheuille, p. 111, n° 2487. - Lhomme, p. 450, n° 1172. - Herbulot, p. 39, pl. III, fig. 67, ♂.

3781 Aspitates ochrearia Rossi. - Jourdheuille, p. 111, n° 2488. - Lhomme, p. 450, n° 1173. - Herbulot, p. 39, pl. III, fig. 68, ♀.

3787 Perconia strigillaria Hübner. - Jourdheuille, p. 111, n° 2489. - Lhomme, p. 451, n° 1174. - Herbulot, p. 39, pl. III, fig. 62, ♂.

Note. - La réimpression du supplément au Catalogue JOURDHEUILLE ayant été paginée de 1 à 64, il a paru utile d'indiquer, entre parenthèses, à la suite de la pagination d'origine, celle du supplément. Ex. : Jourdheuille, p. 140 (16), ...

RÉFÉRENCES

DECARY (R.), 1911. - Lépidoptères rares ou nouveaux du département de l'Aube. - La Feuille des Jeunes Natur., 5e sér., 41 (485), 1911 : 90.

DUFAY (C.), 1978. - Thera albonigrata (Gornik), espèce française méconnue (Lep. Geometridae Larentiinae). - Entomops, n° 46 : 185-196, 11 fig., 13 réf.

DUFAY (C.), 1979. - Un Géométride nouveau pour la France : Theria primaria (Haworth, 1809) (= ibicaria Herrich-Schäffer, 1852, nova syn.) (Lep. Geometridae Ennominae). - Alexanor, 11 (1) : 12-18, 5 fig. dont 1 carte, 6 réf.

HERBULOT (C.), 1978. - Atlas des Lépidoptères de France. Vol. III. Hétérocères (fin). Nouvelle édition. - Société nouvelle des Editions Boubée, Paris.

JOURDHEUILLE (C.), 1883. - Catalogue des Lépidoptères du département de l'Aube. - Mém. de la Soc. acad. de l'Aube, 47, 1883 : 1-229.

JOURDHEUILLE (C.), 1889. - Supplément au Catalogue des Lépidoptères de l'Aube. - Mém. de la Soc. acad. de l'Aube, 53, 1889 : 127-188. - Réimpression de 1890, 64 p.

LERAUT (P.), 1980. - Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse. - Alexanor et Société entomologique de France, Paris.

LHOMME (L.), 1923-1935. - Catalogue des Lépidoptères de France et de Belgique, vol. I. Macrolépidoptères. - Lhomme, Douelle.

STAUDINGER (O.) & WOCKE (M.), 1871. - Catalogue ou énumération méthodique des Lépidoptères qui habitent le territoire de la faune européenne. - Dresde.

307, rue du Fbg-Croncels, 10000 Troyes

INDEX DES NOMS CITÉS

Les nombres correspondent aux numéros de la Liste LERAUT.

A

abbreviata 3558
abietaria 3712
Abraxas 3609
Abraxini 3609
absinthiata 3525
Acasis 3607
aceraria 3199
Adactylotis 3730
adustata 3613
advenaria 3638
aescularia 3198
aestivaria 3208
Aethalura 3727
Agriopis 3682
albicillata 3387
albipunctata 3223
- 3529
albulata 3474
- 3596
alchemillata 3468
Alcis 3713
Aleucis 3740
Alsophila 3198
alternaria 3618
alternata 3368
amata 3231
Angerona 3671
Angeronini 3671
angularia 3721
annulata 3222
Anticlea 3385
Anticollix 3577
Apeira 3654
apiciaria 3650
Aplasta 3200
Aplocera 3582
Apocheima 3672
aquata 3440
Archiearinae 3196
Archiearis 3196
arenaria 3721
artesiaria 3623
Aspitates 3780
assimilata 3527
Asthena 3596
Asthenini 3595
atomaria 3728
atrata 3588
aurantiaria 3684
aureolaria 3269
autumnaria 3656
autumnata 3462
aversata 3317

B

badiata 3385
bajaria 3683
bajularia 3205
berberata 3444
betularia 3680
betularius 3680
bicolorata 3408
bidentata 3665
bifaciata 3471
bilineata 3375
bilunaria 3662
bimaculata 3738
bipunctaria 3343
bisetata 3310
Biston 3679
Bistonini 3672
bistortata 3724
Boarmia 3717
Boarmiinae 3609
Boarmiini 3700
brumata 3463
Bupalini 3735
Bupalus 3735

C

Cabera 3736
Caberini 3736
calabra 3327
calabraria 3327
Calothysanini 3231
Campaea 3743
Campaeini 3743
campanulata 3530
Camptogramma 3375
candidata 3596
cararia 3614
caricaria 3235
carpinata 3603
castigata 3531
Cataclysme 3334
Catarhoe 3363
centaurearia 3513
centaureata 3513
Cepphis 3638
certata 3448
cervinalis 3448
chenopodiata 3345
Chesiadini 3578
Chesias 3578
Chlorissa 3209
Chloroclysta 3403
Chloroclystis 3573
chlorosata 3639
chrysoprasaria 3215
Cidaria 3407
Cidariini 3390
cinctaria 3711
clathrata 3621
Cleora 3711
Cleorodes 3720
cloraria 3210
Colostygia 3420
Colotoini 3670
Comibaeini 3205
Comibaena 3205
comitata 3388
consonaria 3725
consortaria 3719
contaminaria 3730
corollaria 3373
coronata 3573
corylata 3418
Cosmorhoe 3390
crepuscularia 3724
Crocallis 3667
Cyclophora 3220
Cyclophorini 3220

D

decorata 3242
defoliaria 3686
degeneraria 3319
Deileptenia 3712
denotata 3530
dentaria 3662
derivata 3386
designata 3352
digitaliata 3493
dilutaria 3293
dilutata 3460
- v. automnata 3462
dimidiata 3303
distinctata 3740
dodoneata 3559

dolabraria 3645
dotata 3400
dubitata 3452

E

Ectropis 3724
Electrophaes 3418
elinguaria 3667
emarginata 3316
Ematurga 3728
Ennomini 3638
Ennomos 3656
Epione 3650
Epirrhoe 3367
Epirrita 3460
Erannis 3686
erosaria 3660
Euchoeca 3595
Eulithis 3396
Eupithecia 3484
Eupitheciini 3484
exanthemata 3737
exiguata 3497
extersaria 3726

F

Fagivorina 3721
fasciaria 3745
ferrugata 3355
fimbrialis 3214
firmata 3409
flammeolaria 3598
floslactata 3252
fluctuata 3358
fluviata 3350
fulvata 3407
furcata 3429
furvata 3750
furvatus 3750
fuscantaria 3659

G

galiata 3371
gemmaria 3700
Geometra 3204
Geometrinae 3200
Geometrini 3204
gilvaria 3780
glarearia 3622
Gnophini 3750
Gnophos 3750
goossensiata 3526
griseata 3231
grossulariata 3609
Gymnoscelis 3572

H

halterata 3601
hastata 3446
haworthiata 3486
Hemistola 3215
Hemithea 3208
herbariata 3292
hippocastanaria 3646
hirtaria 3674
hirtarius 3674
hispidaria 3672
hispidarius 3672
holosericeata 3293
honoraria 3744
Horisme 3435
humiliata 3295
Hydrelia 3598
Hydriomena 3430
Hydriomenini 3430
Hylaea 3745

I

icterata 3532
Idaea 3263
ilicaria 3708
immutata 3250
impluviata 3430
incanata 3247
inornata 3320
inquinata 3292
irriguata 3496
isogrammaria 3486
Isturgia 3627
Itame 3629

J

Jodis 3216
juniperata 3415

L

lactearia 3216
laquaearia 3494
Larentiinae 3332
Larentiini 3385
legatella 3578
leucophaearia 3682
lichenaria 3720
Ligdia 3613
limbaria 3627
limitata 3345
linariata 3491
linearia 3230
lineata 3778
liturata 3620
Lobophora 3601
Lobophorini 3601
Lomaspilis 3612
Lomographa 3738
lunaria 3663
lunularia 3663
luridata 3347
- 3726
luteata 3598
luteolata 3649
Lycia 3674
Lythria 3332
Lythriini 3332

M

macilentaria 3265
macularia 3652
manuelaria 3708
margaritaria 3743
margaritata 3743
marginaria 3685
marginata 3612
marginepunctata 3246
Melanthia 3441
Mesoleuca 3387
miata 3404
millefoliata 3541
Minoa 3600
minutata 3526
moeniata 3337
moniliata 3281
montanata 3357
muricata 3271
murinaria 3631
murinata 3600

N

nanata 3554
Nebula 3391
nebulata 3595
nigrofasciaria 3386
nigropunctata 3238
notata 3617
notha 3197
nothum 3197

O

obeliscata 3410
obliterata 3595
oblongata 3513
obscuraria 3753
obscuratus 3753
obstipata 3350
ocellata 3390
ochrata 3266
ochrearia 3781
Odezia 3588
Odontopera 3665
olivata 3420
ononaria 3200
Operophtera 3463
Operophterini 3460
Opisthograptis 3649
orbicularia 3220
ornata 3240
Orthonama 3349
Ourapterygini 3669
Ourapteryx 3669

P

Pachycnemia 3646
pallidata 3305
papilionaria 3204
parallelaria 3651
Pareulype 3444
parthenias 3196
pectinataria 3427
pedaria 3673
Pelurga 3388
pendularia 3220
- 3223
pennaria 3670
Perconia 3787
Peribatodes 3700
Perizoma 3468
Perizomini 3468
perochraria 3267
petraria 3639
Petrophora 3639
Phibalapteryx 3336
Philereme 3454
pictaria 3740
pilosaria 3673
pimpinellata 3552
piniaria 3735
piniarius 3735
plagiata 3582
Plagodis 3644
Plemyria 3408
plumbaria 3347
plumbeolata 3488
pomonaria 3678
pomonarius 3678
populata 3398
porata 3226
procellata 3441
prosapiaria 3745
Protorhoe 3373
pruinata 3201
prunaria 3671
prunata 3396
Pseudopanthera 3652
Pseudoterpnini 3200
Pseudoterpna 3201
Pterapherapteryx 3605
puella 3197
pulveraria 3644
pumilata 3572
punctaria 3228
punctinalis 3719
punctularia 3727
punctulata 3727
purpuraria 3332
pusaria 3736
pusillata 3562
- 3571
pustulata 3205
pyraliata 3400
pyreneata 3493

Q

quadrifasciaria 3356
quadrifasiata 3356
quadripunctaria 3199
quadripunctata 3199
quercinaria 3657

R

rectangulata 3575
remutaria 3252
repandaria 3650
repandata 3713
rhamnata 3455
Rheumaptera 3446
Rheumapterini 3435
Rhodostrophia 3326
Rhodostrophiini 3326
rhomboidaria 3700
ribeata 3712
riguata 3334
rivata 3369
roboraria 3717
rubidata 3363
rubiginata 3243
- 3408
rufaria 3263
rufata 3579
rufifasciata 3572
rupicapraria 3741
rusticata 3272

S

salicata 3391
sambucaria 3669
satyrata 3524
scabiosata 3537
Scopula 3234
Scopulini 3234
Scotopteryx 3337
Selenia 3662
Semiothisa 3617
Semiothisini 3617
sepiaria 3731
seriata 3300
serpentata 3267
Serraca 3719
sexalata 3605
sexalisata 3605
simpliciata 3542
Siona 3778
siterata 3403
sobrinata 3562
sparsata 3577
spartiata 3578
Stegania 3614
Sterrhinae 3220
straminata 3283
- 3320
strataria 3679
Stratarius 3679
strigaria 3239
strigata 3208
strigilaria 3238
strigillaria 3787
subfulvata 3532
subfuscata 3531
subnotata 3542
subumbrata 3537
succenturiata 3533
sylvestraria 3283
syringaria 3654

T

tantillaria 3571
temerata 3739

tenuiata 3484
Tephrina 3631
Tephronia 3731
tersata 3436
tessellaria 3234
testata 3397
tetralunaria 3664
Thalera 3214
Thalerini 3208
Thera 3409
Theria 3741
Theriini 3741
Timandra 3231
transversata 3455
Trichopteryx 3603
trifasciata 3430
trigeminata 3310
trilineata 3269
trimaculata 3615
Triphosa 3452
tripunctaria 3529
trisignaria 3519
tristata 3367

truncata 3406

U

umbelaria 3237
undulata 3450
unifasciata 3471

V

v-ata 3573
valerianata 3500
variata 3410
- 3411
variegata 3760
variegatus 3760
venosata 3507
vernaria 3215
vespertaria 3651
vetulata 3454
vibicaria 3326
viretata 3607
virgata 3336
virgaureata 3557
virgularia 3300
virgulata 3239
viridaria 3427
viridata 3209
vitalbata 3435
vittata 3349
vulgata 3528
vulpinaria 3272

W

wauaria 3629

X

Xanthorhoe 3352
Xanthorhoini 3337

Z

zonaria 3677
zonarius 3677

"La Science entomologique française a besoin de travailleurs, d'observateurs et c'est en multipliant les catalogues locaux que nous arriverons à mieux connaître, dans ses moindres détails, notre faune lépidoptérique, la plus riche d'Europe."

L. LHOMME

À PROPOS DE SAMIA CYNTHIA
'LEP. ATTACIDAE'

par Françoise CHAMPART

Lors d'une réunion du Groupe entomologique aubois, en mars 1981, j'ai eu l'occasion de remettre à quelques collègues des cocons de Samia cynthia récoltés à Paris. Je sais que l'on éprouve toujours un certain plaisir à être en possession de quelques beaux exemplaires de cette espèce. Aussi, je ne puis m'empêcher de relater les circonstances dans lesquelles mon frère fut amené à faire sa première capture. Cela se passait il y a environ 25 ans.

Depuis longtemps, mon frère de Paris savait par les livres que le "Samia cynthia" pouvait se trouver dans la capitale, mais il n'avait jamais eu l'occasion de pouvoir l'attraper. Or, un certain jour, il reçoit un coup de téléphone de ses enfants : "Papa, viens vite, il y a un Samia cynthia dans la cour du collège". Le Directeur du Collège Massillon, compréhensif, avait permis à mes neveux de téléphoner. Aussitôt, mon frère s'en fut à Massillon, avec le nécessaire. Là, un surveillant l'accueillit et le mena dans la cour où se trouvaient 200 élèves. Sous leurs yeux, notre chasseur, armé de son bocal, monte sur une échelle. Puis, marchant précautionneusement sur une verrière : "Pourvu que je ne le rate pas, se disait-il. Tous ces jeunes qui me regardent !"
Mes neveux étaient anxieux car l'honneur de leur père était en jeu. Mais ce fut un cri de triomphe qui accueillit sa victoire.
Résultat : un collectionneur heureux d'avoir le papillon tant envié. Deux des élèves, constatant de quoi était capable un collectionneur passionné, le devinrent également.

J'ajouterai seulement que l'année 1980 fut une année exceptionnelle par l'abondance des chenilles de ce fameux papillon. Jamais auparavant l'attention n'avait été attirée à ce point.

19, rue du Premier-Mai, 10100 Romilly-sur-Seine

SUR ARCTIA CAJA L.
'LEP. ARCTIIDAE'

par Gérard MÉTIVIER

Suite à l'article de notre collègue Pierre PORCHERET (Bull. du Gr. ent. aubois, 1 (2), 1981 : 46), article qui m'a vivement intéressé, je me permets, ayant moi-même élevé 3 chenilles d'A. caja en 1980, de préciser que, si l'on place 4 à 5 cm de terre au fond du bocal, les chenilles s'enfoncent dans celle-ci pour se nymphoser, délaissant les feuilles restant dans le bocal. À noter que le cocon tissé en terre reste très souple.

6, rue Anatole-France, 10400 Nogent-sur-Seine

RÉUNION DU 21 MARS 1981

COMPTE RENDU

Le 21 mars 1981, les Entomologistes aubois se sont réunis à l'Hôtel de Ville de Troyes (Salle A. MICHEL).

Présents : Mme Colette PROMPT, Mlle Françoise CHAMPART, MM. Jean CHAMPART, Charles DHEURLE, Gilbert GUESNEY, Roger MÉTAYE, Gérard MÉTIVIER, Félicien MIZELLE, Pierre MORAND, Olivier PILLON, Laurent SCHOTT et Pierre VIETTE.

Excusés : MM. Jacques COGNON, Jacques NEID, Pierre PORCHERET et René PRIN.
En outre, M. Pascal LEBLANC (en service au Niger).

La séance commence à 15 heures précises.
Aucune remarque n'est faite au sujet du compte rendu de la réunion du 20 décembre 1980.

ADMISSION. - M. Jacques NEID, présenté par M. MÉTAYE. Coléoptères et Lépidoptères. M. NEID, également membre de l'ALAST, est auteur de plusieurs articles dont :
- Première esquisse d'un Catalogue des Coléoptères Carabidae de Lorraine;
- Silphes et Nécrophores de la Faune de France.

Le G.E.A. est tout disposé à accueillir de nouveaux membres. Toutefois, après débat et à l'unanimité, il est décidé que seuls les Aubois pourraient être admis.

COURRIER. - Nous avons reçu divers documents, notes et renseignements de Mlle CHAMPART, M. PORCHERET et Dr THIAUCOURT. Par ailleurs, M. SCHOTT nous fait part de ses activités personnelles.
Nous sont également parvenues des lettres de MM. DUTREIX, ESSAYAN et VAUCEL qui sont intéressés par notre Bulletin.

BULLETIN. - Le Bulletin n° 1 n'appelle pas de remarques particulières. Le n° 2 est alors remis aux membres présents qui en prennent connaissance. Puis, la composition du fascicule n° 3 est abordée : il y est prévu la suite du travail de M. PILLON sur les Dytiscides, et, de M. MÉTAYE, une Liste préliminaire des Geometridae de l'Aube. M. DHEURLE nous adressera un article sur les Scarabéides champenois. À ce propos, tous les membres sont d'accord pour que nos études s'étendent désormais à l'ensemble des départements de la Champagne : Aube, Marne et Haute-Marne.
Le n° 3 comprendra aussi quelques notes de M. MÉTIVIER sur les Géométrides, et de M. PORCHERET sur une chasse en forêt de la Perthe.

Ensuite, M. MÉTAYE fait quelques recommandations aux auteurs, à savoir :
- Pour les Lépidoptères : suivre l'ordre des listes qui ont été remises ou qui seront publiées;

- Bien indiquer la commune, le lieu de récolte (et les coordonnées), la date, le nombre de ♂, de ♀ (ou le nombre d'exemplaires).
  Par exemple :
  Laines-aux-Bois, les Grandes Vallées (718 2354), 25 juin 1979, 3 ♂♂, 1 ♀.
- Quant aux dates, écrire de préférence le nom du mois (en entier ou en abrégé) : juillet ou juill. plutôt que : VII, 7 ou 07.

COMMUNICATIONS. - Ont été abordés divers sujets se rapportant :
- aux observations de ce début d'année. Pour sa part, M. MÉTAYE a capturé, en mars, Agriopis leucophaearia en forêt d'Aumont, et A. marginaria en forêt d'Orient;
- à la chasse aux Hétérocères : chacun expose sa méthode et le type de lumière utilisée. La miellée est peu pratiquée. Cependant, M. CHAMPART, qui l'a expérimentée, en a été satisfait;
- à la destruction des biotopes par fauchage, arasement ou brûlage des talus et par le débroussaillement des sous-bois (affouage) que nous déplorons tous;
- à certaines signalisations telles que : "Danger/Tir à balle", "Rage/Poison" et "Tularémie". Le sens en est expliqué et notre inquiétude dissipée.

Plusieurs boîtes d'insectes nous ont été présentées :
M. DHEURLE avait apporté un carton de Cerambycidae champenois et divers autres Coléoptères.
M. MÉTAYE a présenté un carton de Geometridae récoltés dans l'Aube.
M. MÉTIVIER nous a montré une boîte d'Hétérocères tous capturés dans son jardin de Nogent-sur-Seine.
M. MORAND avait un bel exemplaire de Catocala fraxini pris à Estissac le 28 août 1957.
Enfin, M. PILLON nous a fait admirer quelques exemplaires de Carabidae aubois et de Cetoniidae de France.

DOCUMENTATION. - Quelques ouvrages ont été présentés :
- La Vie des Insectes de V.B. WIGGLESWORTH, apporté par M. SCHOTT;
- Mariposas de la Peninsula ibérica - Heterocero II de M.R. GOMEZ BUSTILLO, apporté par M. MÉTIVIER. Cet ouvrage peut être utilisé pour identifier certains Hétérocères français.

PUBLICATIONS. - Périodiques reçus au cours du 1er trimestre :
- Bull. de l'Assoc. des Natur. de la Vallée du Loing, 57 (2), 1981
- Bull. de l'ALAST - Ent., n° 12, 1980
- Alexanor, 10 (7) et (8), 1980

DIVERS. - M. MÉTIVIER nous informe qu'il exposera sa collection de Lépidoptères exotiques, à Romilly-sur-Seine, le 17 mai.
Enfin, M. PILLON propose des Catocala sp. qu'il a récoltés à Vouvray (Indre-et-Loire), en 1974.

La séance se termine à 17 heures.

P. le Secrétaire du G.E.A.

R. MÉTAYE

Imprimé par Roger MÉTAYE à Troyes
Date de publication : 19 septembre 1981
Dépôt légal : 3e trimestre 1981

GROUPE ENTOMOLOGIQUE AUBOIS

(G.E.A.)

Le Groupe entomologique aubois a pour but l'étude de la faune entomologique champenoise : inventaires, répartition, biologie et écologie. De plus, il contribue à l'étude et à l'enrichissement des collections du Musée d'Histoire naturelle de Troyes.

Les membres du G.E.A. se livrent à des recherches individuelles ou collectives portant essentiellement sur la faune entomologique des départements champenois : Aube, Marne et Haute-Marne. Les résultats de leurs travaux sont publiés dans un Bulletin trimestriel dont les dates de publication correspondent à celles des réunions.

Les réunions ont lieu le 3e samedi des mois de mars, juin, septembre et décembre, à partir de 15 heures, dans l'une des salles de réunions de l'Hôtel de Ville de Troyes (escalier F).

Pour être membre du G.E.A., il est indispensable d'être domicilié dans l'un des trois départements de la Champagne. Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétaire du G.E.A. :

Pascal LEBLANC - Musée d'Histoire naturelle de Troyes - 21, rue Chrestien-de-Troyes - 10000 Troyes. Téléphone : 43.49.49 (poste 382)

Le Bulletin est servi aux membres du G.E.A. Il est également adressé aux diverses sociétés et organismes suivants :

Aube
- Association des Amis du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient
- Bibliothèque municipale de Troyes
- Club alpin français - Gentiana
- Musée d'Histoire naturelle de Troyes
- Société académique de l'Aube

Côte-d'Or
- Société entomologique de Dijon

Eure
- Association entomologique d'Évreux

Haute-Marne
- Société de Sciences naturelles et d'Archéologie de la Haute-Marne

Meurthe-et-Moselle
- Association lorraine des Amis des Sciences de la Terre (ALAST)

Paris
- Bibliothèque centrale du Muséum national d'Histoire naturelle
- Bibliothèque du Laboratoire d'Entomologie du Muséum
- Société de Biogéographie
- Société entomologique de France

Haut-Rhin
- Société entomologique de Mulhouse

Saône-et-Loire
- Société d'Histoire naturelle et des Amis du Muséum d'Autun

Yonne
- Association des Naturalistes de la Vallée du Loing

Les demandes d'échange sont acceptées. Pour tout renseignement se rapportant au Bulletin, s'adresser au Directeur de la publication :

Roger MÉTAYE - 307, rue du Fbg-Croncels - 10000 TROYES