


BULLETIN D'ENTOMOLOGIE CHAMPENOISE

Publication trimestrielle

INVENTAIRES
CARTOGRAPHIE
BIOLOGIE - ÉCOLOGIE



GRUPE ENTOMOLOGIQUE CHAMPENOIS
Musée d'Histoire naturelle
21, rue Chrestien-de-Troyes
10000 TROYES

BULLETIN D'ENTOMOLOGIE CHAMPENOISE

Directeur : Roger MÉTAYE

SOMMAIRE

Contribution à la connaissance des Coléoptères Carabiques de l'Aube et de la Marne (suite). 3. <u>Conchifera</u> Jeannel (4e partie) ' <u>Col. Caraboidea</u> ' par Pascal LEBLANC, Henri MENU et Charles DHEURLE	253
Sur quelques Cérambycides de l'Aube (3e note) ' <u>Col. Cerambycidae</u> ' par Pascal LEBLANC	261
Erratum	262
Coléoptères capturés de nuit dans l'Aube (2e note) par Roger MÉTAYE	263
Iconographie d' <u>Hydrocanthares champenois</u> (suite) ' <u>Col. Dytiscidae</u> ' par Pascal LEBLANC	264
Répartition géographique de quelques Satyrines dans le département de l'Aube ' <u>Lep. Nymphalidae Satyrinae</u> ' par Roger MÉTAYE	267
Observations sur <u>Cynthia cardui</u> Linné et <u>Lycaena dispar</u> Haworth ' <u>Lep. Nymphalidae</u> et <u>Lycaenidae</u> ' par Pierre PORCHERET	270
Lépidoptères <u>Noctuidae</u> du département de la Marne. Les données du Fichier Caruel et observations complémentaires (suite et fin) par Michel DEMANGE, Guy DENIZE et Claude LAMBERT	271
Information	278
Note sur <u>Lasiocampa quercus</u> Linné ' <u>Lep. Lasiocampidae</u> ' par Pierre PORCHERET	279
Extrait d'article 'Claude SCHOTT'	279
Les heures de chasses nocturnes de janvier à mars 1986 par Roger MÉTAYE	280
Pour une utilisation pratique des cartes topographiques de l'IGN. - l. Aube. par Roger MÉTAYE	281
Martinia - Bulletin de liaison des Odonatologues de France ..	284
Table des matières du Tome 3	285
Index systématique	287

Couverture : Aglais urticae Linné, Laines-aux-Bois : les Grandes Vallées (Aube), sept. 1985. - R. MÉTAYE phot.

BULLETIN D'ENTOMOLOGIE CHAMPENOISE

CONTRIBUTION À LA CONNAISSANCE DES COLÉOPTÈRES CARABIQUES DE L'AUBE ET DE LA MARNE (suite)*

3. CONCHIFERA Jeannel (4e partie)

'COL. CARABOIDEA'

par Pascal LEBLANC, Henri MENU et Charles DHEURLE

Liste systématique et synonymique des espèces
existant ou ayant existé dans l'Aube ou la Marne

CONCHIFERA Jeannel (4e partie)

Famille PTEROSTICHIDAE Jeannel (2e partie)

Tribu Sphodrini Castelnau

Genre Synuchus Gyllenhal

S. nivalis Panzer (LE GRAND : vivalis Illiger)

Genre Calathus Bonelli

C. (Calathus) mollis Marsham

C. (Calathus) melanocephalus Linné

C. (Calathus) ambiguus Paykull (LE GRAND, LE BRUN : fuscus Fal.)

C. (Calathus) erratus Sahlberg (LE GRAND, LE BRUN : fulvipes Gyll.)

C. (Calathus) piceus Marsham (LE BRUN : rotundicollis Dej.)

C. (Calathus) luctuosus Latreille

C. (Calathus) fuscipes Goeze (LE GRAND : latus Linné, LE BRUN : cistelloides Illig.)

Genre Sphodrus Clairville

S. leucophthalmus Linné

Genre Pristonychus Dejean

P. (Pristonychus) terricola Herbst

Tribu Anchomenini Bonelli

Genre Odontonyx Stephens

O. rotundatus Paykull

Genre Anchus Le Conte

A. ruficornis Goeze (LE GRAND : pallipes Fab., LE BRUN : albipes Fab., BETTINGER, CARUEL : ruficorne Goeze)

A. obscurus Herbst (LE GRAND, LE BRUN : oblongus Fab., BETTINGER, CARUEL : obscurum Herbst)

Genre Platynus Bonelli (1)

P. assimile Paykull (LE GRAND, LE BRUN : junceus Scopoli)

Genre Batenus Motschoulsky (1)

B. livens Gyllenhal

* Cf. Bull. d'Ent. champen., 3 (6), 1985 : 181-187.

1. Mise en sous-genre de Agonum, par JEANNEL.

Genre Agonum Bonelli

- A. sexpunctatum Linné
- A. marginatum Linné
- A. mulleri Herbst (LE GRAND : parumpunctatum Fab.)
- A. viridicupreum Goeze (LE GRAND, LE BRUN : moestum Sturm)
- A. lugens Duftschmid
- A. versutum Gyllenhal (LE BRUN : versutus Gyll.)
- A. viduum Panzer (LE BRUN : viduus Panz.)
- A. moestum Duftschmid (LE BRUN : moestus Duft.)
- A. atratum Duftschmid (LE BRUN : atratus Duft.)
- A. nigrum Dejean

Genre Europhilus Chaudoir

- E. thoreyi Dejean
- E. piceus Linné (LE GRAND, BETTINGER, CARUEL : piceum Linné)
- E. gracilis Gyllenhal (LE GRAND : gracile Sturm, BETTINGER, CARUEL : gracile Gyllenhal)
- E. fuliginosus Panzer (LE GRAND, BETTINGER, CARUEL : fuliginosum Panzer)
- E. scitulus Dejean (CARUEL : scitulum Dejean)
- E. micans Nicolaï

Genre Anchomenus Bonelli

- A. dorsalis Pontopiddan (LE GRAND : prasinus Fabricius, CARUEL : dorsale Pontopiddan)

Commentaire sur ces espèces

CONCHIFERA Jeannel

Famille PTEROSTICHIDAE Jeannel (2e partie)

Tribu Sphodrini Castelnau

Synuchus nivalis Panzer. - Espèce peu fréquente dans l'Aube, au siècle dernier : LE GRAND indique plusieurs stations, LE BRUN en signale deux nouvelles. Dernièrement, elle fut recherchée dans les endroits mentionnés, mais ceux-ci n'existent plus ou ont été modifiés et, seul, le massif forestier de Clairvaux abrite encore cette espèce (un exemplaire observé en mars 1983).

Dans la Marne, elle a été trouvée, il y a une trentaine d'années, dans le Parc de la Montagne de Reims : Verzy, le 15-VI-1955 (MENU leg.), et Germaine (BETTINGER). Plus près de nous, elle fut reprise à Cormicy, le 23-VII-1983 (MENU leg.), et à Hermonville, le 17-VIII-1984 (MENU leg.). Ces deux observations récentes confirment la présence de cette espèce dans notre région, mais elle y reste cependant rare.

Calathus mollis Marsham. - Espèce non observée, autrefois, dans l'Aube. Pour la Marne, BETTINGER, dans son Catalogue, signale une variété erythroderus G. qu'il attribue à C. melanocephalus au lieu de C. mollis, et écrit : " V. erythrocephalus G. plus rare [que le type], Cormontreuil ! en septembre, Châlons-sur-Vesle ! ", mais ne la mentionne pas de l'espèce mollis.

Dernièrement, l'un de nous (DHEURLE) a retrouvé cette espèce aux environs de Reims, le 20-VII-1981, et l'a aussi capturée dans l'Aube, à Ossey-les-Trois-Maisons, le 21-X-1979.

Calathus melanocephalus Linné. - Ce Carabique se rencontre surtout dans les lieux rudéraux. Il est fréquent dans les friches, les terrains vagues, les cultures, au printemps. En été et en automne, il fréquente les champs de blé ou de luzerne, où il est facile de l'observer sous les balles de paille. Il nous semble inutile de mentionner ici toutes les captures; signalons seulement les plus récentes : Bouilly (Aube), 6 juillet 1985, dans une luzernière (LEBLANC leg.) et Sept-Saulx (Marne), le 14 juillet 1983 (DHEURLE leg.).

Calathus ambiguus Paykull. - Comme l'espèce précédente, cette espèce a subi une raréfaction, mais ce phénomène est plus sensible chez elle du fait de sa plus grande sporadicité. Nous ne connaissons pas de captures récentes dans l'Aube, ni dans la Marne, où les derniers exemplaires ont été pris entre 1950 et 1959.

Calathus erraticus Sahlberg. - Espèce rare également, mais l'un de nous l'a reprise à Châlons-sur-Vesle (DHEURLE leg.) où elle semble plus commune qu'ailleurs.

Calathus piceus Marsham. - Espèce de répartition atlantique, la Champagne constitue sa limite extrême Est. Quelques exemplaires ont été signalés dans l'Aube et la Marne, mais ce sont certainement des individus isolés, car jamais l'espèce n'a pu être reprise. En ce qui concerne ses stations anciennes, nous connaissons un exemplaire aubois, signalé dans le Catalogue Le Brun sous le nom d'Amphigynus rotundicollis Dejean, trouvé entre Chavanges et Soullaines, en avril (ANTESSANTY leg.).

Deux captures marnaises, effectuées par BETTINGER à Châlons-sur-Vesle et à Pargny. Aucune autre capture, à notre connaissance, n'a été signalée en Champagne.

Calathus luctuosus Latreille. - LAJOYE a donné des indications sur la biologie de cette espèce, mais n'a pas cité de stations précises, ni même indiqué si l'espèce avait été prise dans la Marne. BETTINGER reprend les indications de LAJOYE sans ajouter de capture nouvelle; il en est de même pour CARUEL. Aucune capture ancienne ou récente dans l'Aube. Les observations les plus proches s'effectuent en forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne) et il convient de retirer cette espèce de nos catalogues tant que d'autres éléments ne seront pas venus compléter notre documentation.

Calathus fuscipes Goeze. - Espèce connue sous différentes appellations : latus (LE GRAND), var. frigidus (LE GRAND) ou cistelloides (LE BRUN), ce qui est le fait de beaucoup d'espèces communes et quelque peu polymorphes.

Elle était mentionnée comme très commune autrefois, bien qu'elle ait subi le même phénomène de raréfaction que les autres espèces de ce genre. Elle reste cependant fréquente en Champagne. On la rencontre aussi souvent que melanocephalus et, en général, dans les mêmes lieux : cultures, friches, taillis. Nous ne signalerons que la capture la plus récente : Cormicy (Marne), le 18-VIII-1984 (MENU leg.). BETTINGER a mentionné une variété flavipes Paykull qui se rencontrerait sur les terrains sablonneux et serait assez rare.

Sphodrus leucophthalmus Linné. - Espèce facilement identifiable,

qui rivalise de taille avec les Carabus. Elle vit dans les lieux sombres, au voisinage de l'homme (caves, celliers) où elle ferait la chasse aux Cloportes (LE BRUN). Elle devait se rencontrer, autrefois, dans les caves de nombreuses villes : Troyes, Bar-sur-Seine, Reims, Châlons-sur-Marne, Épernay; mais, du fait de l'aménagement des dépendances, il semble que l'espèce soit en forte régression.

Il est maintenant difficile de visiter de tels biotopes, et la rareté constatée n'est peut-être qu'apparente. La dernière capture au-bois provient de Souigny, en mai 1972. L'insecte m'a été donné avec un lot de Blaps que le propriétaire, Monsieur PATROIS, avait collecté à mon attention. Dans la Marne, l'un de nous (MENU) en possède un exemplaire pris à Reims, le 13-VIII-1949.

Pristonychus terricola Herbst. - Comme la précédente, cette espèce a des mœurs liées au milieu souterrain, mais on la rencontre aussi quelquefois sous des pierres. Elle était peut-être moins rare autrefois que la précédente, mais elle l'est devenue. Dans l'Aube, nous ne l'avons pas rencontrée récemment. Ses dernières captures proviennent de la Marne : Reims, 1957 (MENU leg.) et Écueil, 19-III-1983 (DHEURLE leg.).

Odontonyx rotundatus Paykull. - Espèce peu fréquente en Champagne bien qu'elle ait été rencontrée dans diverses localités. On la trouve sous les pierres, les détritiques, et le plus souvent dans les lieux secs. Elle n'a pas été reprise récemment dans l'Aube, mais elle a été capturée à Châlons-sur-Vesle (Marne), le 24-VI-1984 (MENU leg.).

Anchus ruficornis Goeze. - Les anciens auteurs signalent cette espèce comme très commune et se rencontrant partout. Elle a en effet une vaste répartition, mais ne fréquente pas tous les biotopes : une présence d'humidité régulière est nécessaire. On la trouve principalement l'hiver sous les écorces et le bois pourri, à la lisière des bois humides où elle cohabite avec l'espèce suivante et certains Agonum et Europhilus. Au printemps et en été, on l'observe sous les pierres et les détritiques, dans les lieux frais et humides, souvent avec Anchomenus dorsalis. Dans les biotopes plus secs, elle est remplacée par les Brachynus. Les individus isolés sont rares, et c'est bien souvent une dizaine de spécimens, voire plus, que l'on dérange en soulevant une pierre. Dans l'Aube, elle est répandue dans les marais autour de Troyes et le long de la Seine (Clérey, Verrières, etc.). Dans la Marne, elle semble légèrement plus rare, mais existe cependant dans les marais, notamment ceux de Châlons-sur-Vesle (DHEURLE leg.) et de Serriers (MENU leg.).

Anchus obscurus Herbst. - Ce Carabique est surtout abondant, du moins plus facile à rencontrer, l'hiver, sous les écorces ou dans le bois vermoulu des Populus. Il hiberne en groupe, et quelquefois plusieurs espèces sont trouvées ensemble. L'été, il vit, comme le précédent, sous les pierres et surtout sous les végétaux d'où on le déloge en piétinant. Il est commun, encore de nos jours, dans nos deux départements.

Platynus assimile Paykull. - Cette espèce est certainement une des plus communes parmi les sylvoicoles. Nous ne connaissons pas une fo-

rêt d'où elle soit absente. Tous les biotopes boisés lui sont favorables, de la futaie sèche au marais inondé plusieurs mois par an. Elle hiberne en compagnie des Carabus, Agonum et Europhilus, mais surtout avec Argutor oblongopunctatus et Silpha sinuata. L'été, il suffit de soulever les bûches, les branches, les feuilles ou tout autre abri, pour la trouver. Elle tombe aussi, facilement, dans les pièges à Carabes. Espèce très commune et très répandue en Champagne.

Batenus livens Gyllenhal. - Agonum facilement reconnaissable à sa forme gracile qui le fait ressembler un peu à un gros Europhilus. Cette espèce se rencontre dans les lieux humides, principalement dans les marais. Elle est commune dans l'Aube : Rosières, Saint-Germain, Saint-Pouange, etc. (LEBLANC leg.) et existe dans les zones marécageuses, aux environs de Reims où elle a été reprise dernièrement : Sept-Saulx (DHEURLE leg.) et Serriers (MENU leg.).

Agonum sexpunctatum Linné. - Cette jolie espèce est facilement identifiable et ne passe pas inaperçue; sa coloration rivalise avec celle de certains Chrysocarabus. Comme autrefois, elle est encore assez commune dans les forêts claires, les coupes de bois, les clairières ou les larges allées forestières. Elle court en plein jour, le long des ornières, et dans les zones où l'eau subsiste assez longtemps. Elle cohabite, dans ces biotopes, avec les Elaphrus, Agonum mulleri et marginatum. La plupart du temps, elle se présente sous la forme typique, bien qu'il arrive de rencontrer des exemplaires mélanisants, mais toujours dans de faibles proportions. Dans l'Aube, l'espèce est surtout abondante dans les massifs forestiers d'Aumont-Rumilly et d'Orient; elle est un peu plus rare en forêt d'Othe. Dans la Marne, elle est surtout connue de Châlons-sur-Vesle et de Reims, mais certainement parce que ce sont les localités les plus explorées. Elle a été reprise dernièrement aux Loges-Margueron (Aube) et dans la Marne, à Val-de-Vesle, Muizon et Serriers, les 10 et 25-VI-1985.

Agonum marginatum Linné. - Cet Agonum est surtout abondant dans les zones découvertes, mais il s'avance quelquefois dans les allées forestières. On le trouve, l'été, en soulevant les pierres et les détritiques. En piétinant les végétaux au bord des eaux, des dizaines d'individus peuvent sortir et courir en tous sens. Dans ces stations, il cohabite avec le cortège habituel des ripicoles, et en particulier avec Elaphrus riparius.

Dans l'Aube, où il est commun, il est capturé régulièrement au bord du lac de la Forêt d'Orient et des gravières de la vallée de la Seine, au sud de Troyes. Un peu plus rare dans la Marne, il se rencontre aux alentours de Reims et de Châlons-sur-Vesle : Serriers, le 25-VI-1985 (MENU leg.).

Agonum mulleri Herbst. - Carabique commun dans les lieux humides et boisés. Il ne cohabite que très rarement avec le précédent, et seulement en milieu découvert. Il est fréquent dans les marais : l'hiver, dans les souches; l'été, sur la vase et dans les amas de feuilles. Dans l'Aube, il existe à Rosières, Verrières, en forêt d'Orient (Étang de la Pierre) (LEBLANC leg.). Dans la Marne, il est capturé régulièrement chaque année à Lavannes, Cauroy, Cormicy et Hermonville (MENU leg.) et à Pourcy (DHEURLE leg.).

Agonum viridicupreum Goeze. - Espèce signalée, autrefois, uniquement du département de l'Aube. Tout d'abord, LE GRAND la mentionne sous le nom d'A. austriacum Fabricius, ajoutant : " Saint-André... R. ". Quelques lignes plus loin, dans son Catalogue, il signale A. moestum Sturm : " avec le précédent... A.R. ". Vingt ans plus tard, LE BRUN reprend A. moestum Sturm : Bar-sur-Seine, forêt d'Orient, et lui associe une variété austriacum Fabr. : Terres de la Royale (?). Cette dernière variété nous est inconnue. D'après les trois exemplaires de la collection Le Grand, ne provenant pas de la région, elle qualifierait des individus plus petits, plus brillants, avec les élytres bronzés.

Malgré toutes les recherches auboises, cette espèce n'a pu être retrouvée. En revanche, elle existe dans la Marne, comme en témoignent les captures récentes : Conflans-sur-Seine, le 22-XI-1981 (DHEURLE leg.), Serriers, le 10-VI-1985 (MENU leg.).

Agonum lugens Duftschmid. - Espèce très rare chez nous. LE GRAND signale l'avoir prise une fois à Villechétif et la détenir du Labourat (ancien canal) qui est encore en eau, mais est situé maintenant en ville. LE BRUN reprend ces deux indications, sans rien y ajouter. Dans la Marne, LAJOYE (1878) indique Muizon et Thuisy, puis HAREZ ajoute Ay. Depuis ces indications, une seule capture a été faite : Châlons-sur-Vesle, lieu dit Compensé, le 30-VI-1961 (MENU leg.).

Agonum versutum Gyllenhal. - Carabique également très rare. Seul, LE GRAND l'a vu à Villechétif, LE BRUN se contentant de reprendre cette indication. Dans la Marne, une seule localité : Ay (HAREZ), reprise par BETTINGER puis CARUEL, l'exemplaire étant actuellement dans la collection Menu. Ces deux exemplaires s'avèrent correctement identifiés. De plus, il en existe deux autres spécimens, dans la collection Le Grand, étiquetés viduus. Nous ne connaissons pas de captures récentes dans l'Aube. En revanche, quatre exemplaires ont été pris à Germaine (Marne), le 30-IV-1985 (DHEURLE leg.), en compagnie d'Europhilus gracilis et de Notaphus obliquus.

Agonum viduum Panzer. - Espèce assez commune et largement répandue. Elle est souvent mélangée avec la suivante, et la distinction, sur le terrain, est délicate. Dans l'Aube, on la trouve à Villechétif, Saint-Parres-aux-Tertres (Baires), Saint-Germain, Rosières (Viélaines), etc. On la capture facilement, l'hiver, dans les souches, et l'été en piétinant les végétaux dans les marais. Pour la Marne, elle est commune dans les marais de la Vesle : Val-de-Vesle, le 14-I-1983 (DHEURLE leg.) et en Montagne de Reims : marais de Serriers, le 10 et le 25-VI-1985 (MENU leg.).

Agonum moestum Duftschmid. - LE BRUN considère cette espèce comme variété de la précédente, ce qui prouve son affinité. Il ajoute aussi une variété cyanescens Puller = certainement ab. cyanescens Prell. qui caractérise des individus à reflets bleus (marais de Chenegy, Aube, octobre, LE BRUN leg.).

Espèce certainement plus rare que la précédente. Dans l'Aube, elle ne se capture régulièrement qu'à Rosières (Viélaines) dans les marais, mais d'autres stations existent probablement. Dans la Marne, elle a été rencontrée à Val-de-Vesle, le 14-I-1983, et à Germaine, le 30-IV-1984 (DHEURLE leg.).

Agonum atratum Duftschmid. - Espèce méridionale qui, normalement, ne remonte pas jusqu'à notre région. Elle est mentionnée de Villechétif (LE GRAND). LE BRUN ajoute Vermoise (ANTESSANTY leg.) et renvoie aussi à une note en bas de page : " improprement nommé micans, par Le Grand, voir Bedel, page 206, Faune des Coléoptères des environs de Paris ". Il y a, en effet, dans le Catalogue Le Grand, après l'espèce atratum Duftschmid, un A. micans Nicolai " avec le précédent, mars, avril et mai. A.R. ".

LE BRUN a donc condensé les indications de ces deux espèces. De plus, LE GRAND signale, avec le type, une variété lucidus : terrains marécageux, sous les pierres. Mais, dans sa collection, tous les exemplaires d'A. atratum v. lucidus ont été pris hors de nos limites.

Toujours dans sa collection, figurent deux exemplaires avec une étiquette ronde, bleue, non annotée, qui signifie " Environs de Troyes ". Il s'avère qu'il s'agit plutôt d'Agonum nigrum Dejean.

Agonum nigrum Dejean. - Espèce non signalée de Champagne; elle est normalement plus méridionale. Néanmoins, deux exemplaires de la collection Le Grand, étiquetés atratum, semblent lui appartenir. Une confusion d'étiquette étant toujours possible, il vaut mieux, dans l'état actuel de nos connaissances, attendre de nouvelles captures d'A. atratum et A. nigrum pour les inclure dans nos catalogues.

Europhilus thoreyi Dejean. - Ce Carabique est plus fréquent chez nous, sous sa variété puellus Dejean, variété que LE GRAND élevait au rang d'espèce. La variété était en général commune, le type étant l'exception. Vingt ans plus tard, LE BRUN mentionne bien une variété puellus Dejean, mais il l'attribue à A. fuliginosus, et ajoute que les deux formes existent à Villechétif, mais sont rares. Dans la Marne, il a été récolté à Val-de-Vesle, le 30-I-1983 (DHEURLE leg.). BETTINGER lui attribue une variété pusillum Dejean (Taisy, Thuisy, Ay) qui doit correspondre à puellus Dej.

Europhilus piceus Linné. - Carabique signalé comme A.R. à Villechétif, par LE GRAND; LE BRUN ajoute : marais de Chennegy. L'exemplaire de la collection Le Grand, portant l'indication : environs de Troyes, est correctement identifié. La dernière capture auboise semble être celle de Saint-Léger, en juin 1975 (LEBLANC leg.). Dans la Marne, l'espèce a été prise, autrefois, par LAJOYE, puis par HAREZ : Ay (Exemplaire en collection, MENU) et, à notre connaissance, n'a plus été reprise depuis.

Europhilus gracilis Gyllenhal. - Espèce signalée comme très rare dans nos deux départements. Toutefois, dans l'Aube, sa présence reste à confirmer car il était mentionné par LE GRAND : " A. gracile Sturm - Villechétif, au pied des roseaux, sous les feuilles et les gazons, parfois sous les écorces. Mars, avril et mai. C. ", mais LE BRUN, dans son Catalogue, fait référence à BEDEL et indique que LE GRAND a confondu cette espèce avec fuliginosus. Aucune autre capture récente d'E. gracilis Gyll. dans l'Aube nous fait donner provisoirement raison à LE BRUN. Il n'existe pas d'exemplaires de gracilis auboises dans la collection Le Grand. Sa présence est donc à confirmer.

Dans la Marne, il en est autrement : l'espèce n'est signalée que

par un exemplaire : vivier de Chenay, 18-V-1930 (BETTINGER leg.). Dernièrement, l'un de nous vient d'en retrouver une petite série entre Saint-Imoges et Germaine, le 30-IV-1984 (DHEURLE leg.), ce qui confirme sa présence marnaise.

Europhilus fuliginosus Panzer. - Cette espèce est la plus commune du genre, et le fait que LE GRAND la signale comme R., en 1862, nous fait envisager des confusions dans l'identification de ces spécimens. E. fuliginosus se rencontre, comme toutes les autres espèces de ce genre, dans les lieux humides (bords de mares, de rivières, marais, etc.) où, l'hiver, il se tient sous les écorces, les mousses ou dans le bois pourri, et, l'été, non loin de l'eau sous des détritus divers. Il serait fastidieux d'énumérer toutes les localités auboises et marnaises, car il a été observé dans toutes les vallées et presque tous les marais.

Europhilus scitulus Dejean. - Espèce rare, signalée de l'Aube par LE BRUN : Bar-sur-Aube, au lieu dit les Rigoles, le 24 avril 1882 (ANTESSANTY leg.) et, plus récemment, des bords du lac de la Forêt d'Orient, le 10-VIII-1982 (DHEURLE leg.).

Dans la Marne, SAINTE-CLAIRE DEVILLE l'a trouvée à Fismes, en 1957, puis BETTINGER a ajouté les stations suivantes : Avize, Méry, Premecy, Taissy, qui laissent présager une relative abondance. Elle existe encore à Écueil et dans les marais de Châlons-sur-Vesle, 4 décembre 1982 (DHEURLE leg.).

Europhilus micans Nicolaï. - Espèce signalée uniquement de l'Aube (LE GRAND). Cette indication est contestée par LE BRUN (voir le paragraphe sur Agonum atratum). Sur les 5 exemplaires d'E. micans de la collection Le Grand, quatre appartiennent à E. fuliginosus, et un seul est correctement nommé. Depuis, l'espèce a été reprise à Clérey, à Saint-Germain et à l'étang de Maurepaire, en mai 1975 (LE-BLANC leg.).

Elle est présente aussi dans la Marne : marais de Châlons-sur-Vesle, le 4-XII-1982 (DHEURLE leg.).

Anchomenus dorsalis Pontopiddan. - Espèce facile à reconnaître. Elle était très commune, autrefois, notamment dans les chemins et en bordure des cultures. Les progrès de l'agriculture l'ont fait régresser, mais on la trouve encore. Elle reste cependant abondante dans les zones calcaires (Barrois) où les refuges sont nombreux. Elle cohabite dans les talus bien exposés avec les Brachymus explodens, crepitans et sclopeta. Dans les champs, on la capture en compagnie des Harpalus ou Amara, et dans les lieux humides, il arrive de la voir avec Anchus ruficornis Goeze. Répandue dans nos deux départements, il semble inutile d'énumérer toutes les stations connues.

(À suivre)

P. L., 9, place de Montréal, 10000 Troyes
H. M., rue des Grands-Clos, Cauroy-lès-Hermonville
51220 Hermonville
C. D., 7, rue Faidherbe, 89000 Auxerre

SUR QUELQUES CÉRAMBYCIDES DE L'AUBE (3e note)*

'COL. CERAMBYCIDAE'

par Pascal LEBLANC

Prioninae Latreille

Prionini Fairmaire

Prionus coriarius Linné. - Dans des séries de Coléoptères, confiés pour détermination par deux collègues, j'ai découvert cette espèce, rare en Champagne. M. Jean-Maurice CHESNAIS en a capturé un exemplaire dans le bois de Macey, le 30-VIII-1984, ce qui confirme la présence actuelle de cette espèce dans cette station déjà mentionnée en 1911 par G. d'ANTESSANTY. L'autre exemplaire a été récolté par un élève de M. Jean-Pierre BOUET, dans le bois de Villemaur, en juillet 1982.

Lepturinae Latreille

Rhagiini Kirby

Dinoptera collaris Linné. - Très abondant, en mai et juin 1985, sur les Ombellifères, dans le massif Aumont-Rumilly (Commune des Loges-Margueron). Alors que les années passées, l'insecte n'était pas très fréquent, il n'était pas rare de voir cinq à dix exemplaires par fleur. Parmi ces centaines d'exemplaires observés, un appartenait à la variété marginicollis Tippmann, à pronotum presque entièrement noir (10 juin 1985).

Lepturini Kirby

Anoplodera sexguttata Fabricius. - Signalée de l'Aube par un seul exemplaire (LEBLANC, 1982 : 118), cette espèce a été reprise en mai-juin 1985. Elle n'était pas rare sur les Ombellifères, dans la commune des Loges-Margueron, ce qui confirme son implantation auboise. Avec le type, se trouvait dans une proportion de 1/3 l'aberration exclamationis Fabricius qui est, à ce jour, la seule variation rencontrée.

Anoplodera rufipes Schaller. - VILLIERS (1978 : 151) indique que cette espèce se rencontre souvent avec la précédente; c'est ce qui s'est produit en mai et juin de cette année. Bien que les deux espèces fréquentent les mêmes espèces de fleurs, elles ne s'observaient pas dans les mêmes zones de la forêt. A. rufipes n'était pas signalé, à ma connaissance, de notre département, mais la découverte d'une dizaine d'individus confirme bien son implantation dans la commune des Loges-Margueron. Tous mes exemplaires appartiennent à la forme typique.

Spondylinae Serville

Spondylis buprestoides Linné. - Espèce non signalée de l'Aube dans les anciens catalogues; elle existe pourtant depuis plusieurs dizaines d'années si l'on en croit les captures de M. Robert DELVINCOURT : Troyes, juin 1943, juin 1944, 6 août 1962; Montgueux, 4 juillet

* Cf. Bull. d'Ent. champen., 3 (3), 1984 : 87-89.

1965; Bourguignons, 2 juillet 1954. Cependant, aucune capture récente ne confirmait sa présence actuelle. Cela fut fait, le 18 juillet 1985, à Marolles-sous-Lignièrès, par M. Roger MÉTAYE (MÉTAYE, 1985 : 235). L'exemplaire volait au crépuscule.

Cerambycinae Latreille
Molorchini Mulsant

Molorchus minor Linné. - Espèce signalée par G. d'ANTESSANTY : 1 exemplaire, en juin 1911, à Vulaines. Depuis cette capture, que j'attribuais à une importation accidentelle, je ne disposais d'aucun autre élément. En juin 1985, j'ai pu observer une dizaine d'exemplaires sur des Ombellifères, dans la commune des Loges-Margueron. Leur taille varie de 6 à 12 mm, et les petits exemplaires passent facilement inaperçus.

Cerambycini Mulsant

Cerambyx scopoli Fuesslins. - Malgré les grands froids de l'hiver dernier, qui auraient dû retarder sensiblement la sortie des imagos, une observation de cette espèce a été faite par une parente de M. René PRIN, début avril 1985, à Laines-aux-Bois, sur Ombellifères. Deux autres individus ont également été capturés aux Loges-Margueron, en mai 1985, sur les mêmes plantes que les autres Cérambycides.

RÉFÉRENCES

- ANTESSANTY (G. d'), 1911. - Supplément au Catalogue des Coléoptères du département de l'Aube, par G. Le Grand. - Mém. de la Soc. acad. de l'Aube, 75, 1911 : 7-63.
LEBLANC (P.), 1982. - Note sur quelques Cérambycides de l'Aube 'Col. Cerambycidae'. - Bull. d'Ent. champen., 2 (4), 1982 : 118-120.
MÉTAYE (R.), 1985. - Résultat d'une chasse nocturne effectuée dans la commune de Marolles-sous-Lignièrès (Aube) 'Lep. Heterocera'. - Bull. d'Ent. champen., 3 (7), 1985 : 235-237.
VILLIERS (A.), 1978. - Faune des Coléoptères de France. I. Cerambycidae (Encyclopédie entomologique, 43). - Lechevalier, Paris.

9, place de Montréal, 10000 Troyes

ERRATUM

Bulletin d'Entomologie champenoise,
3 (7), 1985 : 235, dernière ligne,
au lieu de : Spondilys, lire : Spondylis.

COLÉOPTÈRES CAPTURÉS DE NUIT DANS L'AUBE (2e note)

par Roger MÉTAYE

Au cours de mes chasses nocturnes, effectuées de mars à novembre 1985, j'ai capturé quelques Coléoptères qui sont venus à la lumière du tube actinique de 20 W que j'utilise pour attirer les Lépidoptères Hétérocères. L'identification en a été assurée par P. LEBLANC que je remercie vivement.

Les heures extrêmes des périodes, indiquées entre parenthèses, correspondent aux heures solaires corrigées pour la localité.

CARABIDAE

Orinocarabus nemoralis Illiger. - Les Loges-Margueron, forêt de Crognay (732 2347), 160 m, 18-IV-1985, 1 ♂, 1 ♀. - Pér. 4 (21 30-22 10), NL, ciel clair, 6 °C.

DYTISCIDAE

Dytiscus dimidiatus Bergsträsser. - Trainel, la Madeleine (682 2379), 75 m, 15-VIII-1985, 1 ♀. - Pér. 1 (20 00-20 35), NL, ciel clair, 13 °C. - À 150 m du ruisseau de la Madeleine, en lisière sud de la forêt qui s'étend de part et d'autre de l'Orvin.

Dytiscus marginalis Linné. - Marolles-sous-Lignières, les Avinières (718 2332), 155 m, 18-VII-1985, 2 ♂♂. - Pér. 1 (20 35-21 10), ciel très nuageux, vent OSO faible, 20 °C. - À environ 200 m d'un ru.

Dytiscus marginalis var. ♀ conformis Kunze. - Vanlay, bois de la Vacherie (722 2337), 150 m, 29-VIII-1985, 1 ex. - Pér. 3 (20 45-21 30), PL, ciel clair, 12 °C. - À un peu plus de 300 m au NNO de l'étang de Vanlay.

Ilybius fuliginosus Fabricius. - Trainel, la Madeleine (682 2379), 75 m, 15-VIII-1985, 2 ex. - Pér. 1 (20 00-20 35), NL, ciel clair, 13 °C. - Voir ci-dessus D. dimidiatus.

SILPHIDAE

Necrophorus humator Goeze. - Rouilly-Sacey, bois du Chardonneret (745 2373), 115 m, 4-IV-1985, 1 ex. - Pér. 1 (19 15-20 00), PL, ciel clair, 16 °C.

APHODIIDAE

Aphodius rufipes Linné. - Vanlay, bois de la Vacherie (722 2337), 150 m, 29-VIII-1985, 1 ex. - Pér. 1 (19 30-20 10), PL, ciel nuageux, 14 °C.

MELOLONTIIDAE

Melolontha melolontha Linné. - Prugny, bois de Prugny (718 2360), 250 m, 23-V-1985, 1 ♂. - Pér. 2 (20 55-21 30), NL, ciel clair, 11 °C. - En deux heures de chasse, sept exemplaires sont venus : deux en période 1, et trois en période 2. Il est à remarquer que, normalement, 1985 est une année à Hannetons.

307, rue du Fbg-Croncels, 10000 Troyes

ICONOGRAPHIE D'HYDROCANTHARES CHAMPENOIS (suite)

'COL. DYTISCIDAE'

par Pascal LEBLANC

B) Hydroporinae Regimbart (suite)

3) Hydroporini Sharp : grande tribu comprenant 15 genres (11 seulement existent en Champagne).

Le genre Hygrotus Stephens comprend trois espèces françaises, toutes trois présentes chez nous.

Hygrotus versicolor Schaller (Pl. 23, fig. 1)

Description. - Lg. 3,2-3,4 mm. Ovale, peu allongé, mais étiré vers l'arrière, très convexe, entièrement glabre. Coloration jaune testacé ou rougeâtre avec le pronotum rembruni sur ses bords antérieur et postérieur, et des lignes noires sur les élytres. Ponctuation double et forte, les deux sexes brillants.

Variations. - Il n'a pas été décrit de femelle mate. La coloration peut varier, notamment dans l'étendue des taches élytrales; une seule ab. est signalée de France, elle se rencontre quelquefois avec le type : ab. collaris Panzer (fig. 1a). Elle est caractérisée par l'interruption des lignes élytrales 1 et 3.

Observations. - Espèce assez caractéristique par son corps convexe, ovale, et ses lignes noires; elle se rapproche de Coelambus confluens (fig. 5), mais en diffère par son dessous entièrement testacé et non noir partiellement.

Répartition. - Dans les lacs, les étangs jeunes; aussi dans les ruisseaux. Rare. Aube, Marne et Haute-Marne, mais présence actuelle à confirmer dans nos trois départements.

Hygrotus inaequalis Fabricius (Pl. 23, fig. 2)

Description. - Lg. 2,7-3,5 mm. Ovale, convexe; très voisin comme forme des précédents. Il en diffère par la coloration des élytres qui se composent d'une tache commune sur le disque, digitée sur les bords.

Variations. - La taille varie légèrement, la coloration bien plus : Il existe une forme à tache réduite et séparée en deux bandes : ab. parvulus Fabricius (fig. 2a) et une autre à élytres presque entièrement noirs : ab. fasciatus D. Torre (fig. 2b).

Observations. - Cette espèce ne peut être confondue avec aucune autre. Il a été décrit une forme femelle à ponctuation élytrale plus forte, mais celle-ci est étrangère à notre faune.

Répartition. - Espèce très commune dans les eaux stagnantes. Aube, Marne et Haute-Marne.

Hygrotus decoratus Gyllenhal (Pl. 24, fig. 3)

Description. - Lg. 2-2,4 mm. Même forme que les précédentes, mais taille plus faible. La coloration est caractéristique : une large tache noire commune en forme de croix de Lorraine renversée. Mâles et femelles brillants.

Variations. - Comme pour H. versicolor, il n'existe pas de femelle mate. La tache élytrale peut s'étendre beaucoup : ab. unicolor Schilsky (fig. 3a) ou disparaître presque totalement (fig. 3b), cette dernière forme n'ayant pas reçu de nom.

Observations. - Espèce facile à reconnaître à son corps globuleux et sa coloration. Certains exemplaires peuvent cependant être confondus, sur le terrain, avec Graptodytes pictus Fabricius ab. cruciatus Schilsky, mais ils ne vivent généralement pas dans les mêmes biotopes en Champagne.

Répartition. - Espèce caractéristique, dans le Nord-Est, des mares à Sphaignes où elle cohabite avec Agabus affinis Paykull et Ilybius guttiger Gyllenhal.

Le genre Coelambus Thomson comprend 5 espèces* en France : impresso-punctatus Schaller, parallelogrammus Ahrens, marklini Gyllenhal, confluens Fabricius et pallidulus Aubé. Deux seulement existent en Champagne.

Coelambus impressopunctatus Schaller (Pl. 24, fig. 4)

Description. - Lg. 4-5 mm. Grande espèce ovale allongé, le corps bien arrondi, convexe surtout sur sa face ventrale, entièrement glabre. Coloration jaune, testacée ou ferrugineuse avec des lignes noires sur les élytres, et un obscurcissement partiel de la tête et du pronotum. Ponctuation forte, mais laissant le corps brillant chez les deux sexes.

Variations. - Il existe une femelle dimorphe : var. ♀ lineellus Gyllenhal. Sa ponctuation est plus fine et plus dense, ce qui lui confère un aspect mat caractéristique; les lignes élytrales de points deviennent invisibles; en revanche, les lignes noires sont plus nettes. Elle se rencontre avec le type, en Champagne où elle est presque aussi abondante que la forme nominale brillante.

Observations. - Espèce facilement identifiable; il n'est possible de la confondre qu'avec C. parallelogrammus Ahrens, mais cette dernière n'a pas été signalée chez nous.

Répartition. - Espèce ubiquiste et commune. Aube, Marne et Haute-Marne.

Coelambus confluens Fabricius (Pl. 24, fig. 5)

Description. - Lg. 3-3,4 mm. Ovale, beaucoup plus court que le précédent, convexe comme les Hygrotus avec lesquels il a beaucoup de ressemblance, glabre. Coloration, en général, jaune testacé, pâle, quelquefois un peu ferrugineuse. Tête avec une tache noire, et élytres avec la suture et quatre lignes noires. Ponctuation forte et double, les deux sexes brillants.

Variations. - À ce jour, il n'a pas été décrit de femelle mate, comme pour l'espèce précédente, ni de variation notable de la coloration.

Observations. - Cette espèce ressemble un peu à Hygrotus versicolor Schaller mais en diffère par son dessous partiellement noir. Son habitus la rapproche également un peu de Oreodytes rivalis ab. sanki Sahlberg, mais elle s'en sépare par son pronotum concolore, la forme moins arrondie du corps avec l'apex légèrement acuminé. Le corps est également moins convexe.

Répartition. - Espèce pionnière des gravières jeunes où elle cohabite souvent avec Potamonectes canaliculatus Lacordaire et Yola bicarinata Latreille. Rare. Aube, Marne et Haute-Marne.

* GUIGNOT (1947 : 73) en donne une sixième, en précisant que celle-ci n'atteint pas notre pays.

Pour les trois autres espèces de Coelambus, l'une est montagnarde et limitée aux Pyrénées et aux Alpes : C. markilini Gyllenhal, les deux autres sont plutôt littorales.

Le genre Hydroporus est le plus grand genre de Dytiscidae en France. Il comprend quatre sous-genres et 40 espèces dont seulement 16 sont étrangères à la Champagne.

Hydroporus (Suphrodytes) dorsalis Fabricius (Pl. 25, fig. 6)

Description. - Lg. 5-5,5 mm. Grande espèce, ovale allongé, avec un angle pronoto-élytral prononcé (caractère du sous-genre), pubescent. Coloration brun foncé, avec la tête, le disque du pronotum et le bord huméral des élytres ferrugineux. Le type comporte en plus une tache ronde post-basale et deux autres plus petites sur la moitié postérieure de chaque élytre.

Variations. - La taille varie légèrement, mais c'est la coloration qui est la plus changeante. La tache basale peut être plus ou moins développée. Si elle disparaît, on est en présence de l'ab. marginalis Schilsky (fig. 6a); en revanche, si elle s'étend jusqu'à former une bande transversale, c'est l'ab. transversalis D. Torre (fig. 6b). La coloration ferrugineuse peut aussi s'étendre à presque tout l'élytre. Si le pronotum est en majeure partie ferrugineux, c'est l'ab. figuratus Gyllenhal (fig. 6c); s'il est presque noir, l'ab. markilini Zaitzev (fig. 6d). Ces aberrations se rencontrent avec le type.

Observations. - La taille de cette espèce, sa coloration et son angle pronoto-élytral ne permettent pas de la confondre.

Répartition. - Dans les eaux stagnantes, notamment où poussent des Juncus et des Scirpus. Aube, Marne et Haute-Marne.

Hydroporus (s. str.) marginatus Duftschmid (Pl. 25, fig. 7)

Description. - Lg. 3,5-4 mm. Ovale allongé, assez large, plat, entièrement pubescent et recouvert d'une ponctuation fine et dense* qui n'existe que chez cette espèce en France. La tête et le pronotum sont ferrugineux avec le centre noir; les élytres sont noirs avec leur pourtour testacé, notamment à la base.


Variations. - Une variété de couleur a été décrite : ab. pallens Zimmerman; elle caractérise des exemplaires à corps presque entièrement testacé. Décrite d'Afrique, elle n'existe peut-être pas chez nous.

Observations. - Espèce que l'on peut confondre, sur le terrain, avec Hydroporus planus, mais l'examen de la microsculpture les sépare rapidement.


Répartition. - Espèce commune dans les eaux courantes ou les fossés herbeux alimentés. Plus rare dans les autres biotopes. Aube et Haute-Marne. Se rencontrera vraisemblablement dans la Marne.

9, place de Montréal, 10000 Troyes


* Il ne faut pas la confondre avec l'alutacé que présente la majorité des autres espèces d'Hydroporus.




1. *Hygrotus versicolor* (x20)





2. *Hygrotus inaequalis* (x20)






3. *Hygrotus decoratus* (x25)



4. *Coelambus impressopunctatus* (x15) 5. *Coelambus confluens* (x20)



6. *Hydroporus dorsalis* (x15)



7. *Hydroporus marginatus* (x20)

P. LEBLANC del.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE QUELQUES SATYRINES
DANS LE DÉPARTEMENT DE L'AUBE
'LEP. NYMPHALIDAE SATYRINAE'

par Roger MÉTAYE

JOURDHEUILLE (1883 : 24-27) a cité 22 espèces de Satyrinae pour le département de l'Aube. Mis à part deux espèces : H. statilius et B. circe qui n'ont été trouvées que par DUPIN, à Ervy-le-Châtel, il y a plus d'un siècle, les vingt autres ne représentent donc pas même le tiers de la faune française.

Cette faible proportion risque de baisser encore du fait de la quasi disparition de cinq espèces, et ce, depuis fort longtemps déjà pour certaines : H. alcyone (P. THIAUCOURT leg., 1965), C. briseis (P. VIETTE leg., 1941), M. dryas (G. DENIZE leg., 1974), C. hero (P. THIAUCOURT leg., 1961) et L. achine (G. DENIZE leg., 1974).


La présence des diverses espèces auboises, pour la période 1978-1985, et en prenant la tétrade pour unité de situation des stations, s'établit comme suit :



3005. <i>Melanargia galathea</i>	241	3035. <i>Erebia aethiops</i>	33
3009. <i>Hipparchia fagi</i>	8	3037. <i>Erebia medusa</i>	18
3012. <i>Hipparchia semele</i>	4	3057. <i>Maniola jurtina</i>	232
3023. <i>Brintesia circe</i> ?	2	3060. <i>Aphantopus hyperantus</i>	93
3024. <i>Arethusana arethusa</i>	2	3061. <i>Pyronia tithonus</i>	181



(À suivre)

307, rue du Fbg-Croncels, 10000 Troyes

o litt. (lieu de récolte); ⊕ id. (localité); ● mph. leucomelas







OBSERVATIONS SUR CYNTHIA CARDUI Linné
ET LYCAENA DISPAR Haworth
'LEP. NYMPHALIDAE et LYCAENIDAE'

par Pierre PORCHERET

Au cours d'une visite à la forêt de la Perthe (commune de Plancy-l'Abbaye), dans l'après-midi du 28 juillet 1985, par un temps nuageux mais ensoleillé, après un orage qui avait éclaté dans la matinée, je me suis arrêté au bord de la route de Champfleury à Courcemain (720 2403). Non loin de là, il y avait un champ de maïs - non traité - destiné au gibier et bordé de grands Chardons. J'ai remarqué la présence de nombreux spécimens de Cynthia cardui, très colorés et de grande taille, ce qui m'a permis de penser qu'il s'agissait d'éclosions récentes. Je n'avais encore jamais remarqué une telle abondance de Belle-Dame. La plupart étaient posés au sol ou sur les Chardons, une des plantes-hôtes de la chenille.

Poursuivant mon chemin, je rencontrai encore cette espèce en assez grand nombre, sans qu'elle atteignît toutefois la densité observée près du champ de maïs.

En avril, Cynthia cardui était déjà exceptionnellement fréquent, ce qui laissait présager de telles éclosions en juillet.

En revanche, 1985 n'aura pas été une année faste pour Lycaena dispar. J'ai visité à plusieurs reprises, au cours de la deuxième quinzaine d'août, les biotopes où il était relativement abondant en 1983 (Cf. Bull. d'Ent. champen., 3 (1), 1984 : 17) à Méry-sur-Seine et à Droupt-Sainte-Marie, sans en observer aucun exemplaire. Il est vrai que l'une de ces localités, près de la rivière de Beauregard (716 2389) est maintenant - comme je le craignais - occupée en grande partie par un champ de maïs.

Dans la vallée de l'Aube, à Boulages, où je n'avais constaté aucune présence de Lycaena dispar en 1983, j'ai visité plusieurs champs restés en friche par suite des débordements tardifs de la rivière, où fleurissaient de grandes étendues de Pulicaire dysentérique, plante très fréquentée par ce Lycénide. Or, j'ai vu en tout et pour tout une ♀, le 22 août 1985, non loin de la rivière, route de Granges (715 2398). Cette espèce - même faiblement représentée - n'est donc pas absente de la vallée de l'Aube.

9, rue Maurice-Parez, 10170 Méry-sur-Seine

LÉPIDOPTÈRES NOCTUIDAE DU DÉPARTEMENT DE LA MARNE
Les données du Fichier Caruel
et observations complémentaires (suite et fin)
par Michel DEMANGE, Guy DENIZE et Claude LAMBERT

NOCTUIDAE
Acontiinae

4551. Lithacodia pygarga Hufnagel (805)

CARUEL : Chenay et partout. - V-VI.

Nouvelles observations :

Beaumont-sur-Vesle (735 2465), 26-VI-1973, 11-VIII-1983 (LAMBERT);

Saint-Léonard (728 2471), 12-VII-1984 (LAMBERT);

Sainte-Menehould (786 2458), 30-V-1981 (LAMBERT).

4552. Lithacodia deceptor Scopoli (804)

CARUEL : Brimont (DEMAISON, Reims, 1907 : 144), Chenay, Rilly et partout. - V-VI.

Nouvelles observations :

Bouy : camp militaire de Mourmelon (750 2459), 28-V-1985 (LAMBERT);

Fresne (Le) (772 2434), 1-VI-1985 (LAMBERT);

Pompelle (La) (730 2469), 27-V-1964 (DEMANGE).

4554. Eutrostia uncula Clerck (806)

CARUEL : Berru (DEMAISON, Reims, 1907 : 144), Mâco, Muizon (B.S., 1933 : 34), Châlons-sur-Vesle, Villers-Allerand. - VII, VIII, IX.

4555. Deltotes bankiana Fabricius (807)

CARUEL : Germaine, Rilly et partout dans les bois humides. - V-VI.

Nouvelles observations :

Beaumont-sur-Vesle (735 2465), 6-VI-1980, 4-VII-1980, 25-VII-1980,
11-VIII-1983 (LAMBERT);

Épernay (718 2450), 17-V-1964 (DENIZE);

Sermiers (719 2461), 4-VII-1985 (LAMBERT);

Suippes (Camp de) (766 2471), 27-VII-1984 (LAMBERT).

4557. Emmelia trabealis Scopoli (810)

CARUEL : Sermiers, Trigny et partout. - IV, V, VI, VII, VIII.

Nouvelle observation :

Compertrix (747 2439), 19-V-1964 (DENIZE).

4559. Acontia lucida Hufnagel (811)

CARUEL : Châlons-sur-Vesle (TUNIOT, B.S., 1878 : 68).

Sarrothripinae

4562. Nycteola revayana Scopoli (814 partim)

CARUEL : Écueil, Montchenot, Villers-Allerand, Montbré. - VI, IX-X.
Publié Bulletin n° 7, 1950.

Chloephorinae

4567. Earias chlorana Linnaeus (816)

CARUEL : Chenay, Rilly (TUNIoT, B.S., 1878 : 69), Chenay, Mâco, Villers-Allerand. - V-VI, VIII.

4570. Bena prasinana Linnaeus (817)

CARUEL : Germaine, Rilly (TUNIoT, B.S., 1878 : 126), Châlons-sur-Vesle, Villers-Allerand. - VI-VII.

Nouvelles observations :

Beaumont-sur-Vesle (735 2465), 26-VI-1979 (LAMBERT);

Châlons-sur-Marne (748 2442), 7-VII-1961 (DENIZE);

Courtagnon (719 2461), 17-VII-1962 (DEMANGE);

Villers-Allerand : Montchenot (721 2463), 27-VI-1976 (LAMBERT).

4571. Pseudoips fagana Fabricius (818)

CARUEL : Cernay, Rilly (TUNIoT, B.S., 1878 : 64), Châlons-sur-Vesle, Germaine, Villers-Allerand. - V, VI, VII.

La variété millieri Capronnier aussi commune que le type.

Nouvelles observations :

Germaine (723 2458), 18-VI-1964 (DENIZE);

Sept-Saulx (740 2465), 9-VI-1973 (DEMANGE);

Verzy (733 2461), 6-VI-1970, 11-VII-1970, 15-VII-1972 (DEMANGE).

Plusiinae

4574. Abrostola triplasia Linnaeus (871)

CARUEL : Courcelles, Saint-Brice (TUNIoT, B.S., 1878 : 131), Mâco, Villers-Allerand, Reims. - V-VI, VIII.

Nouvelles observations :

Muizon (713 2477), 29-VIII-1974 (DEMANGE);

Reims (724 2474), 19-IV-1961, 31-VII-1963, 5-VI-1964 (DEMANGE).

4576. Abrostola trigemina Werneburg (873)

CARUEL : Reims, Villers-Allerand et partout. - VI.

Nouvelles observations :

Reims (72 247), 11-VII-1982 (LAMBERT);

- (724 2474), VIII-1969 (DEMANGE).

4581. Polychrysia moneta Fabricius (852)

CARUEL : Villers-Allerand. - VI.

4585. Diachrysia chrysitis Linnaeus (870)

CARUEL : Reims et partout ainsi que sa variété juncta Tutt qui est plus commune que le type. - V, VI, VII, VIII.

Nouvelles observations :

Beaumont-sur-Vesle (735 2465), 28-VI-1979, 4-VII-1980, 25-VII-1980, 19-IX-1980, 11-VIII-1983 (LAMBERT);

Sept-Saulx (740 2465), 18-VIII-1973 (DEMANGE);

Sermiers (Forêt de) (719 2461), 4-VII-1985 (LAMBERT);

Ville-en-Selve (727 2459), 11-VI-1983 (LAMBERT);
Villers-Allerand (723 2464), 17-VIII-1961 (DEMANGE).

4586. Diachrysia chryson Esper (869)

CARUEL : Mâco, Villers-Allerand. - VII, VIII.

Nouvelles observations :

Beaumont-sur-Vesle (735 2465), 25-VII-1980 (LAMBERT);
Chenay (Le vivier de) (714 2479), 29-VII-1982 (LAMBERT);
Muizon (713 2477), 13-VII-1973 (DEMANGE).

4587. Macdunnoughia confusa Stephens (858)

CARUEL : Reims (PIERRA), Villers-Allerand. - VII, IX-X.

Nouvelles observations :

Beaumont-sur-Vesle (735 2465), 21-IX-1979, 6-VI-1980 (LAMBERT);
Châlons-sur-Marne (748 2442), 12-VII-1965 (DENIZE);
Ludes (Craon de) (727 2463), 28-IX-1979 (LAMBERT);
Reims (724 2474), 11-VII-1961 (DEMANGE).

4588. Plusia festucae Linnaeus (857)

CARUEL : Sermiers, Villers-Allerand, Germaine (JUPIN). - VIII-IX.

4589a. Plusia putnami gracilis Lempke

Nouveau pour le département :

Beaumont-sur-Vesle (735 2465), 26-VI-1979, 4-VII-1980, 25-VII-1980
(LAMBERT).

4590. Autographa gamma Linnaeus (862)

CARUEL : Reims et partout. - V, VI, VII, VIII, IX, X, XI.

Nouvelles observations :

Beaumont-sur-Vesle (735 2465), 21-IX-1979, 19-IX-1980, 11-VIII-1983
(LAMBERT);
Beine (737 2474), 30-VIII-1972, 29-X-1972 (DEMANGE);
Belval-sous-Châtillon (712 2458), 13-VI-1980 (LAMBERT);
Cernay (730 2475), 25-VII-1985 (LAMBERT);
Châlons-sur-Marne (748 2442), 9-VIII-1963 (DENIZE);
Châlons-sur-Vesle (714 2477), 29-VIII-1983 (LAMBERT);
Champigneul-Champagne (733 2441), 26-VIII-1983 (LAMBERT);
Chenay (715 2479), 5-IX-1976 (DEMANGE); 2-VII-1985 (LAMBERT);
Cuisles (706 2460), 10-VIII-1983 (LAMBERT);
Fontaine-sur-Ay (727 2455), 21-V-1971 (LAMBERT);
Fresne (Le) (772 2434), 6-VII-1984, 1-VI-1985 (LAMBERT);
Germaine (723 2458), 9-VI-1977, 27-VII-1978 (LAMBERT);
Igny-Comblizy (703 2446), 23-IX-1972 (DEMANGE);
Ludes (Craon de) (727 2465), 28-IX-1979 (LAMBERT);
Mesnil-sur-Oger (Le) (722 2438), 15-VII-1985 (LAMBERT);
Moronvilliers (Camp de) : mont Cornillet (740 2471), 14-VII-1963
(DEMANGE);
Prouilly (710 2479), 15-VIII-1985 (DEMANGE);
Reims (724 2474), 14-VII-1961 (DEMANGE); 7-X-1975, 27-IX-1976, 13-
IX-1984 (LAMBERT);

Sept-Saulx (740 2465), 1-IX-1973 (DEMANGE); 2-IX-1977 (LAMBERT); 18-VIII-1981, 6-IX-1981, 13-IX-1981 (DEMANGE), 12-VI-1983, 5-VIII-1983, 11-VIII-1983 (LAMBERT);
Sermiers (719 2461), 4-VII-1985 (LAMBERT); 17-VIII-1985 (DEMANGE);
Sillery (731 2467), 10-X-1984 (LAMBERT);
Suippes (Camp de) (766 2471), 16-VII-1984, 27-VII-1985 (LAMBERT).

4591. Autographa pulchrina Haworth (860)

CARUEL : Nanteuil-la-Fosse (DEMAISON, Reims, 1907 : 144), Courtagnon, Germaine, Villers-Allerand. - VI.

Nouvelles observations :

Beaumont-sur-Vesle (735 2465), 4-VII-1980 (LAMBERT);
Germaine (723 2458), 5-VII-1976 (DEMANGE);
Sainte-Menehould (786 2458), 30-V-1981 (LAMBERT);
Ville-en-Selve (727 2459), 11-VI-1983 (LAMBERT).

4592. Autographa jota Linnaeus (861)

CARUEL : Rilly, Villers-Allerand. - VI.

Catocalinae

4604. Catocala sponsa Linnaeus (821)

CARUEL : Belval-sous-Châtillon (CHARLOT), Germaine, Villers-Allerand. - VIII-IX.

Nouvelle observation :

Châlons-sur-Marne (748 2442), 10-VIII-1963 (DENIZE).

4606. Catocala fraxini Linnaeus (823)

CARUEL : Germaine, Hermenonville, Reims, Rilly, Trigny (TUNIOT manuscr.), Vrilly (B.S., 1924 : xiii, JUPIN), Nogent-l'Abbesse (DEUTSCH), Belval-sous-Châtillon (CHARLOT), Châlons-sur-Vesle, Bazancourt, Villers-Allerand. - VII, VIII, IX.

Nouvelles observations :

Chenay (715 2479), 23-VIII-1973 (DEMANGE);
Sermiers (Forêt de) (719 2461), 12-X-1985 (LAMBERT);
Villers-Allerand (723 2464), VIII-1963 (DEMANGE).

4607. Catocala nupta Linnaeus (828)

CARUEL : Rilly, Villers-Allerand ... - VII-VIII.

Nouvelles observations :

Beaumont-sur-Vesle (735 2465), 19-IX-1980 (LAMBERT);
Châlons-sur-Marne (748 2442), 21-VIII-1965 (DENIZE);
Reims (724 2474), 13-IX-1963 (DEMANGE); 3-IX-1974 (LAMBERT);
Rilly-la-Montagne (724 2464), 17-VIII-1960 (DEMANGE);
Villers-Allerand (723 2464), 4-VIII-1960 (DEMANGE).

4608. Catocala elocata Esper (829)

CARUEL : Châlons-sur-Vesle, Germaine (TUNIOT manuscr.)

4609. Catocala promissa Denis & Schiffermüller (827)

CARUEL : Reims (VARLET). - VIII.

4610. Catocala electa Vieweg (826)

CARUEL : Nogent-l'Abbesse (DEUTSCH), Villers-Allerand. - VIII-IX.

Publié : Bulletin n° 13, 1953.

4618. Ephesia fulminea Scopoli (834)

CARUEL : Rilly, Villers-Allerand. - VII-VIII.

Nouvelle observation :

Villers-Allerand (723 2464), VIII-1961 (DEMANGE).

4619. Minucia lunaris Denis & Schiffermüller (835)

CARUEL : Germaine, Rilly (TUNIOT, B.S., 1878 : 67), Belval-sous-Châtillon (CHARLOT), Avenay, Trigny, Villers-Allerand. - V-VI.

4625. Callistege mi Clerck (840)

CARUEL : Rilly et partout. - V.

Nouvelles observations :

Belval-sous-Châtillon (713 2458), 7 et 13-VI-1980, 3-VI-1982 (LAMBERT);

Compertrix (747 2439), 20-V-1964 (DENIZE);

Fresne (Le) (772 2434), 1-VI-1985 (LAMBERT);

Germaine (721 2457), 9-VI-1977 (LAMBERT); 12-VI-1977 (DEMANGE);

Pompelle (La) (730 2469), 9-VI-1963, 27-V-1964 (DEMANGE);

Saint-Imoges (718 2459), 11-VI-1982, 20-VI-1984 (LAMBERT);

Sept-Saulx (741 2464), 31-V-1977, 18-VI-1977 (LAMBERT).

4626. Euclidia glyphica Linnaeus (841)

CARUEL : Montbré et partout. - V, VIII.

Nouvelles observations :

Bouy : camp militaire de Mourmelon (750 2459), 26-V-1985 (LAMBERT);

Beine-Nauroy (742 2475), 15-VI-1983 (LAMBERT);

Châlons-sur-Marne (748 2442), 14-V-1964 (DENIZE);

Chenay (716 2479), 27-VI-1984 (LAMBERT);

Courcy (722 2483), 7-VI-1973 (LAMBERT);

Fresne (Le) (772 2434), 13-VI-1984, 6-VII-1984, 1-VI-1985 (LAMBERT);

Hautvillers (716 2456), 15-V-1976 (LAMBERT);

Montbré (723 2466), 5-V-1963 (DEMANGE);

Muizon (712 2477), 19-VI-1984 (LAMBERT);

Saint-Imoges (718 2459), 21-VI-1983 (LAMBERT);

Sept-Saulx (741 2464), 27-V-1978, 12-VI-1983 (LAMBERT);

Suippes (Camp de) (766 2471), 16, 20 et 27-VII-1984 (LAMBERT).

Ophiderinae

4628. Catephia alchymista Denis & Schiffermüller (876)

PRON : Ormes (718 2472), 1961. Publié Bull. Soc. Hist. nat. de Reims.

4630. Aedia funesta Esper (878)

Nouveau pour le département :

Dizy (719 2453), 6-VI-1979 (LAMBERT);

Reims (724 2474), 29-VII-1963, 29-V-1966 (DEMANGE); 3-VI-1985 (A. FOUCAULT leg., in coll. Lambert).

4631. Tyta luctuosa Denis & Schiffermüller (879)

CARUEL : Reims et partout. - V, VI, VII, VIII.

Nouvelles observations :

Compertrix (747 2439), 29-V-1964 (DENIZE);

Montbré (723 2466), VII-1963 (DEMANGE).

4633. Lygephila pastinum Treitschke (882)

CARUEL : Rilly (TUNOT, B.S., 1878 : 132), Jonchery, Verzy (B.S., 1894 : 60), Brimont (PEILLET), Germaine, Villers-Allerand. - VI-VII.

Nouvelles observations :

Germaine (724 2458), 18-VI-1964 (DENIZE);

Merfy (717 2479), 2-VII-1985 (LAMBERT);

Prouilly (710 2477), 30-VI-1982 (LAMBERT);

Sept-Saulx (740 2465), 18-VIII-1973 (DEMANGE); 11-IX-1982 (LAMBERT);

Villers-Allerand (723 2464), 9-V-1960 (DEMANGE).

4634. Lygephila viciae Hübner (883)

Nouveau pour le département :

Sept-Saulx (740 2465), 9-VI-1973, 14-VI-1975 (DEMANGE).

4635. Lygephila craccae Denis & Schiffermüller (884)

CARUEL : Montbré, Villers-Allerand. - VIII.

Nouvelles observations :

Muizon (713 2477), 13-VII-1972 (DEMANGE);

Sept-Saulx (740 2465), 9-VI-1973, 1-VI-1974 (DEMANGE).

4642. Scoliopteryx libatrix Linnaeus (893)

CARUEL : Reims et partout. - I-II-III, VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII.

Nouvelles observations :

Beine (737 2474), 15-IV-1971 (DEMANGE);

Châlons-sur-Marne (748 2442), 30-VIII-1965 (DENIZE);

Germaine (724 2458), 6-VII-1976 (LAMBERT);

Hautvillers (716 2456), 15-V-1976 (LAMBERT);

Montbré (723 2466), 5-XI-1984, abondant dans les souterrains du Fort (LAMBERT);

Reims (724 2474), 31-VII-1963 (DEMANGE); 17-IV-1985 (LAMBERT).

4644. Laspeyria flexula Denis & Schiffermüller (890)

CARUEL : Châlons-sur-Vesle, Trigny (TUNOT manuscr.), Ludes, Villers-Allerand, Reims (VARLET). - VI, VII, VIII, IX.

Nouvelles observations :

Germaine (721 2457), 6-VII-1976 (LAMBERT);

Prouilly (710 2477), 30-VI-1982 (LAMBERT);

Sept-Saulx (740 2465), 19-VI-1973, 18-VIII-1973, 14-VI-1975 (DEMANGE), 11-IX-1982 (LAMBERT).

4645. Colobochyla salicalis Denis & Schiffermüller (891)

CARUEL : Chenay, Germaine, Ludes, Trigny, Villers-Allerand. - VI-VII.

4646. Parascotia fuliginaria Linnaeus (892)

CARUEL : Nogent-Sermiers. - VII.

4650. Phytometra viridaria Clerck (895)

CARUEL : Courcelles-Saint-Brice (TUNIOT manuscr.), Nogent-l'Abbesse (DEUTSCH), Chigny, Damery, Pargny, Trigny, Villers-Allerand, Champvoisy (DENIS). - V, VI, VII, VIII.

4651. Rivula sericealis Scopoli (889)

CARUEL : Reims et partout.

Nouvelles observations :

Beaumont-sur-Vesle (735 2465), 11-VIII-1983 (LAMBERT);

Val-de-Vesle (737 2465), 6-VII-1982 (LAMBERT).

Hypeninae

4653. Macrochilo cribrumalis Hübner (901)

CARUEL : Mâco, Muizon (B.S., 1933 : 34). - VI-VII.

Nouvelles observations :

Beaumont-sur-Vesle (735 2465), 4-VII-1980 (LAMBERT);

Val-de-Vesle (737 2465), 6-VII-1982 (LAMBERT).

4657. Pechipogo strigilata Linnaeus (897)

CARUEL : Châlons-sur-Vesle, Chenay, Courtagnon. - V-VI.

4659. Herminia tarsipennalis Treitschke (899)

CARUEL : Germaine, Rilly, Villers-Allerand. - VI.

4661. Herminia tarsicrinalis Knoch (903)

CARUEL : Bazancourt, Châlons-sur-Vesle, Chigny, Villers-Allerand, Courtagnon. - VI-VII.

Nouvelles observations :

Beaumont-sur-Vesle (735 2465), 26-VI-1979, 4-VII-1980 (LAMBERT);

Sermiers : le Cadran (720 2460), 11-VI-1982 (LAMBERT);

Val-de-Vesle (737 2465), 6-VII-1982 (LAMBERT).

4664. Herminia nemoralis Fabricius (908)

CARUEL : Châlons-sur-Vesle, Villers-Allerand, Mâco, Germaine. - VI, VII, VIII.

Nouvelles observations :

Germaine (721 2457), 29-VI-1985 (LAMBERT);

Prouilly (710 2477), 30-VI-1982 (LAMBERT);

Ville-en-Selve (727 2459), 11-VI-1983 (LAMBERT).

4665. Trisateles emortualis Denis & Schiffermüller (906)

CARUEL : Villers-Allerand. - VI-VII.

4666. Paracolax derivalis Hübner (907)

CARUEL : Villers-Allerand. - VII.

4667. Bomolocha crassalis Fabricius (912)

CARUEL : Chigny (publié Bull. n° 13, 1953). - VI-VII.

4668. Hypena rostralis Linnaeus (913)

CARUEL : Germaine, Rilly, Villers-Allerand. Avec de nombreuses variétés de dessin et de coloration. - IV, VIII-IX-X.

Nouvelle observation :

Châlons-sur-Marne (748 2442), 16-IX-1965 (DENIZE).

4669. Hypena proboscidalis Linnaeus (914)

CARUEL : Reims et partout. - VI, VII, VIII.

Nouvelles observations :

Beaumont-sur-Vesle (735 2465), 26-VI-1979, 21-IX-1979, 19-IX-1980 (LAMBERT);

Châlons-sur-Marne (748 2442), 7-VIII-1963 (DENIZE);

Chenay (715 2479), 25-VIII-1973 (DEMANGE);

Germaine (721 2457), 11-VI-1979 (LAMBERT);

Ludes (Craon de) (727 2463), 28-IX-1979 (LAMBERT);

Sept-Saulx (739 2463), 11-IX-1982 (LAMBERT).

M. D., 6, rue Lucien-Lewen, 75020 Paris

G. D., 21, avenue du Général-Leclerc,
51000 Châlons-sur-Marne

C. L., 11, cours Langlet, 51100 Reims

INFORMATION

Dans sa séance du 14 juin 1985, le Comité Scientifique du Parc Naturel Régional de la Forêt d'Orient a demandé que des mesures soient prises pour assurer la conservation d'une prairie humide de 18 hectares située sur la commune de Rouilly-Sacey (Aube), et déjà répertoriée comme "site d'intérêt régional" au Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme.

Nouv. brèves des Parcs nat. rég., juill.-sept., 1985 : 7.

NOTE SUR LASIOCAMPA QUERCUS Linné

'LEP. LASIOCAMPIDAE'

par Pierre PORCHERET

J'ai observé Lasiocampa quercus dans la vallée de la Seine, à Méry-sur-Seine (714 2390 et 715 2390) et à Saint-Oulph (713 2391), ainsi que dans la vallée de l'Aube, à Charny-le-Bachot (718 2396 et 719 2396). Il est également présent le long du ruisseau (souvent asséché) dit des Armances, à Saint-Oulph (714 2392).

Mais on le rencontre aussi dans des biotopes beaucoup plus secs, telle la forêt de la Perthe où je l'ai vu près de la route de Champfleury à Courcemain (721 2403).

La chenille est assez fréquente en mai-juin; on la remarque facilement grâce à sa taille - jusqu'à 80 mm - et à sa couleur brune et ses poils vert jaunâtre.

La période de vol s'étend de la mi-juillet au début d'août. Le ♂, brun rougeâtre, a une activité diurne. Son vol est très rapide et zigzagant, et sa capture au filet est extrêmement difficile.

J'ai assisté par hasard, le 29 juillet 1985, au prélude à un accouplement; c'était à Charny-le-Bachot, sur le bord de la route de Plancy-l'Abbaye (719 2396). Il était environ 13 h (heure solaire), le temps était frais pour la saison, nuageux et instable, un vent d'ouest assez fort soufflait. Une ondée venait de s'achever. Marchant sur l'accotement, mon attention fut attirée par un ♂ battant fébrilement des ailes au niveau des herbes sèches. À quelques centimètres, se tenait une ♀; celle-ci, plus grande que le ♂, se confondait parfaitement avec le milieu, sa couleur jaune clair lui assurant un camouflage parfait. Sans la présence du ♂, je ne l'aurais probablement pas remarquée.

9, rue Maurice-Parez, 10170 Méry-sur-Seine

Si les terrains militaires sont quelquefois au coeur des plus vives polémiques, force est de constater que leur statut particulier, les mettant à l'abri de l'exploitation agricole, forestière ou touristique, en fait de véritables réserves naturelles, où le naturaliste, et plus particulièrement l'entomologiste peut rencontrer une flore et une faune, qui semblent moins sensibles aux exercices militaires, qu'aux nouvelles méthodes d'exploitation et à l'épandage de pesticides.

C. SCHOTT

Bull. Soc. ent. Mulhouse, janv.-mars 1984.

LES HEURES DE CHASSES NOCTURNES DE JANVIER À MARS 1986

par Roger MÉTAYE

Le tableau ci-dessous indique les heures extrêmes des parties de nuit sans clair de lune. Les heures soulignées correspondent aux heures du coucher ou du lever du Soleil.

Nuit du	JANVIER		FÉVRIER		MARS	
1 au 2	<u>16 03</u>	21 46	<u>16 46</u>	00 53	<u>17 32</u>	00 06
2 au 3	<u>16 04</u>	23 03	<u>16 48</u>	02 17	<u>17 34</u>	01 31
3 au 4	<u>16 05</u>	00 21	<u>16 50</u>	03 41	<u>17 35</u>	02 51
4 au 5	<u>16 06</u>	01 42	<u>16 51</u>	05 00	<u>17 37</u>	03 59
5 au 6	<u>16 07</u>	03 07	<u>16 53</u>	06 05	<u>17 38</u>	04 52
6 au 7	<u>16 08</u>	04 34	<u>16 55</u>	06 54	<u>17 40</u>	05 30
7 au 8	<u>16 09</u>	06 00	<u>16 56</u>	07 13	<u>17 42</u>	05 53
8 au 9	<u>16 10</u>	07 16	<u>16 58</u>	07 11	<u>17 43</u>	06 19
9 au 10	<u>16 12</u>	07 44	17 26	07 09	<u>17 45</u>	06 17
10 au 11	<u>16 13</u>	07 43	18 44	07 08	<u>17 46</u>	06 15
11 au 12	17 09	<u>07 43</u>	19 58	07 06	18 51	06 13
12 au 13	18 32	<u>07 42</u>	21 10	07 04	20 02	06 10
13 au 14	19 52	<u>07 41</u>	22 19	07 03	21 12	06 08
14 au 15	21 07	<u>07 41</u>	23 29	07 01	22 22	06 06
15 au 16	22 19	<u>07 40</u>	00 33	06 59	23 32	06 04
16 au 17	23 28	<u>07 39</u>	01 47	06 57	00 41	06 02
17 au 18	00 36	<u>07 38</u>	02 55	06 56	01 46	06 00
18 au 19	01 44	<u>07 38</u>	03 53	06 54	02 45	05 58
19 au 20	02 53	<u>07 37</u>	04 54	06 52	03 34	05 56
20 au 21	04 02	<u>07 36</u>	05 39	06 50	04 13	05 54
21 au 22	05 09	<u>07 35</u>	06 15	06 48	04 43	05 52
22 au 23	06 10	<u>07 34</u>	06 42	06 46	05 07	05 49
23 au 24	07 02	<u>07 33</u>			05 26	05 47
24 au 25					05 43	05 45
25 au 26			<u>17 26</u>	18 36		
26 au 27	<u>16 37</u>	17 00	<u>17 27</u>	19 56	<u>18 11</u>	18 54
27 au 28	<u>16 38</u>	18 17	<u>17 29</u>	21 17	<u>18 12</u>	20 19
*28 au 29	<u>16 40</u>	19 35	<u>17 31</u>	22 40	<u>18 14</u>	21 47
29 au 30	<u>16 41</u>	20 53			<u>18 15</u>	23 15
30 au 31	<u>16 43</u>	22 11			<u>18 17</u>	00 40
31 au 1	<u>16 45</u>	23 30			<u>18 18</u>	01 54

* Ou : 28 au ler, pour le mois de février.

Remarques : Les heures sont données en Temps Universel et valables pour Paris. En fonction du lieu, effectuer la correction (Cf. Bull. d'Ent. champen., 3 (6), 1985 : 202).

Pour être à l'heure légale, les heures indiquées devront être augmentées d'une heure, suivant l'heure officielle, jusqu'au 30 mars inclus.

307, rue du Fbg-Croncels, 10000 Troyes

POUR UNE UTILISATION PRATIQUE DES CARTES
TOPOGRAPHIQUES DE L'I.G.N. - 1. AUBE

par Roger MÉTAYE

Le mode de découpage en feuilles des cartes topographiques de l'IGN s'effectue selon les méridiens et les parallèles du système grades-Paris, sauf pour la carte à 1/100 000 (série verte) dont le découpage est irrégulier.

Pour les feuilles à 1/50 000 (ancienne série et série orange), la périodicité du découpage est de 4 dgr en longitude et 2 dgr en latitude.

Pour les feuilles à 1/25 000, la périodicité dans l'ancienne série est de 2 dgr en longitude et 1 dgr en latitude; dans la nouvelle série (série bleue), elle est de 2 dgr x 2 dgr, ce qui conduit à des feuilles de grand format.

Carte à 1/100 000 (série verte). - Précédemment nommée " Carte touristique ", elle a, depuis peu, pris l'appellation de " Carte topographique ". Le département de l'Aube est en grande partie couvert par la feuille n° 22; toutefois, il faut compléter, à l'ouest et au sud, respectivement par les feuilles n° 21 et 28.

Cette carte de grand format est encombrante et d'utilisation peu aisée. Le découpage de celle-ci, effectué selon un mode identique à celui de la carte à 1/50 000 (fig. 1), permet d'obtenir des cartes de 4 dgr x 2 dgr, mais de dimensions telles qu'il est possible de les monter sur feuilles de format A4. Ce découpage se fait de préférence sur des feuilles non pliées; les méridiens et les parallèles sont ensuite tracés de décigrade en décigrade, ce qui détermine ainsi 8 mailles de 1 dgr x 1 dgr que l'on peut numéroté de 1 à 8 (fig. 2). Enfin, selon l'utilisateur, les axes myriamétriques du système Lambert II étendu ou UTM sont tracés.




Fig. 1. - Découpage de la
carte à 1/50 000.

Ces documents permettent ainsi de réaliser des copies que l'on peut emporter sur le terrain, de préférence à l'original, car elles servent à y porter diverses indications telles que lieux de récolte, itinéraire à suivre ou suivi, et, par l'emploi de symboles appropriés, à repérer les biotopes... Ces copies, après utilisation, de même que les originaux, sont classées dans l'ordre numérique, et pour un même numéro de carte, dans l'ordre

chronologique. Par ailleurs, il est très pratique d'accompagner toute donnée, du numéro de la carte et de la maille. Par ex. :

Arsonval (2917.8), 3-VII-1985...

Les recherches ultérieures en sont d'autant facilitées, et le passage de ce numéro aux coordonnées de la maille ne présente aucune

difficulté (Cf. tableau ci-dessous).

Coordonnées, en grades-Paris, des mailles de 1 dgr x 1 dgr

N° de la maille	N° de la carte					
	2615	2715	2815	2915	3015	LAT.
1	1,0	1,4	1,8	2,2	2,6	54,1
2	1,1	1,5	1,9	2,3	2,7	54,1
3	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	54,1
4	1,3	1,7	2,1	2,5	2,9	54,1
5	1,0	1,4	1,8	2,2	2,6	54,0
6	1,1	1,5	1,9	2,3	2,7	54,0
7	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	54,0
8	1,3	1,7	2,1	2,5	2,9	54,0
	2616	2716	2816	2916	3016	LAT.
1	1,0	1,4	1,8	2,2	2,6	53,9
2	1,1	1,5	1,9	2,3	2,7	53,9
3	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	53,9
4	1,3	1,7	2,1	2,5	2,9	53,9
5	1,0	1,4	1,8	2,2	2,6	53,8
6	1,1	1,5	1,9	2,3	2,7	53,8
7	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	53,8
8	1,3	1,7	2,1	2,5	2,9	53,8
	2617	2717	2817	2917	3017	LAT.
1	1,0	1,4	1,8	2,2	2,6	53,7
2	1,1	1,5	1,9	2,3	2,7	53,7
3	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	53,7
4	1,3	1,7	2,1	2,5	2,9	53,7
5	1,0	1,4	1,8	2,2	2,6	53,6
6	1,1	1,5	1,9	2,3	2,7	53,6
7	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	53,6
8	1,3	1,7	2,1	2,5	2,9	53,6
	2618	2718	2818	2918	3018	LAT.
1	1,0	1,4	1,8	2,2	2,6	53,5
2	1,1	1,5	1,9	2,3	2,7	53,5
3	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	53,5
4	1,3	1,7	2,1	2,5	2,9	53,5
5	1,0	1,4	1,8	2,2	2,6	53,4
6	1,1	1,5	1,9	2,3	2,7	53,4
7	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	53,4
8	1,3	1,7	2,1	2,5	2,9	53,4
	2619	2719	2819	2919	3019	LAT.
1	1,0	1,4	1,8	2,2	2,6	53,3
2	1,1	1,5	1,9	2,3	2,7	53,3
3	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	53,3
4	1,3	1,7	2,1	2,5	2,9	53,3
5	1,0	1,4	1,8	2,2	2,6	53,2
6	1,1	1,5	1,9	2,3	2,7	53,2
7	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	53,2
8	1,3	1,7	2,1	2,5	2,9	53,2

Remarques :

- Pour le découpage, commencer par les méridiens qui sont des droites, alors que les parallèles sont des courbes à grand rayon, mais qui peuvent être confondues avec des droites pour des arcs de 4 dgr.




Fig. 2. - Montage sur feuille A4.




Fig. 3. - Juxtaposition.

- Au montage, ne pas faire de collage en plein, mais fixer la carte seulement par deux pastilles d'adhésif double-face ou deux points de colle placés à la partie supérieure de la carte, de manière à pouvoir la glisser sous une carte voisine afin de faciliter la lecture de certains détails à l'endroit du raccord (fig. 3).

- Pour le tracé des méridiens et des parallèles, la remarque est la même que pour le découpage. Commencer par le tracé des méridiens - le quart de AB et A'B' - puis les parallèles - la moitié de AA' - soit 100 mm.

- Pour le tracé des axes myriamétriques dans le système choisi par l'utilisateur (Lambert II étendu ou UTM), se reporter à la carte correspondante à 1/50 000; mesurer les distances par rapport aux coins de cartes et diviser par 2. Dans une cartographie nationale, la maille de 1 dgr x 1 dgr ou de 10 km x 10 km est amplement suffisante. Mais, si cela est nécessaire, quelques grilles sur feuilles d'acétate serviront à déterminer la maille de 1 cgr ou la maille kilométrique.

Carte à 1/50 000 (ancienne série et série orange). - Pour couvrir le département de l'Aube, 17 cartes sont nécessaires (cf. fig. 1), mais l'une d'elles, portant le n° 2815, est interdite à la vente.




Fig. 4. - Carte à 1/50 000.




Fig. 5. - Montage au format A4.

Chaque carte peut être découpée en quatre parties de 2 dgr x 1 dgr (fig. 4) qu'il est également possible de monter sur feuilles de format A4 (fig. 5).

Attention, le découpage entraîne la suppression des amorces chiffrées qu'il faudra conserver après avoir pris la précaution d'inscrire, au verso, le numéro de la carte correspondante.

Carte à 1/25 000 (ancienne série et série bleue). - Le découpage de cette carte, que ce soit dans l'ancienne série ou dans la série bleue, permet d'obtenir des feuilles de 1 dgr x 1 dgr dont les dimensions sont telles qu'une feuille de format A3 est alors nécessaire (fig. 6 et 7).




Fig. 6. - Ancienne série.




Fig. 7. - Série bleue.

Le tirage des copies sur format A4 peut se faire en deux temps, par demi-rotation de l'original.

307, rue du Fbg-Croncels, 10000 Troyes

MARTINIA - Bulletin de Liaison des Odonatologues de France

MARTINIA est le bulletin de liaison des entomologistes, des biologistes, des naturalistes, ... s'intéressant ou travaillant sur les Odonates de France. Le principal objectif de ce bulletin est de faciliter la diffusion des informations concernant ce groupe d'insectes. Dans cet esprit, il comportera par exemple : -les annonces des congrès, des symposiums, des conférences et des expositions; -l'analyse des ouvrages récents parus sur le sujet; -les références et un résumé sommaire des dernières publications traitant des Odonates de France; -des articles, des notes ou des appels consacrés à l'organisation d'inventaires, d'études particulières...; -des considérations générales concernant la protection des Odonates et de leurs biotopes; -des échanges de vue, etc.

Pour ne pas perdre de trop nombreuses informations biologiques, éthologiques, faunistiques ... concernant les Libellules de notre pays, MARTINIA publiera des articles qui trouvent difficilement leur place dans les revues existantes, du fait de leur brièveté.

Le bulletin de liaison MARTINIA est donc avant tout un organe de diffusion et d'échanges destiné à favoriser et à promouvoir l'étude des Odonates de France.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, S'ADRESSER À :

Jean-Louis DOMMANGET, 7, rue Lamartine, F-78390 BOIS D'ARCY

TABLE DES MATIÈRES

Tome 3

- 1 ANTESSANTY (G. d'). - Le marais de Villechétif (Aube), 217.
- 2 CHAMPART (Mlle F.). - Faux serpents, fausses chenilles 'Lep. Sphingidae, Hym. Cimbicidae', 107.
- 3 - Une tentative d'élevage 'Lep. Sphingidae', 144.
- 4 CHAMPART (J.). - Souvenirs d'un lépidoptériste aubois, 68.
- 5 DEMANGE (M.). - Contribution à l'étude des Lépidoptères de la Marne. Données complémentaires à la Liste Caruel-Lambert. 1. Hesperiidae, Papilionidae et Pieridae, 53.
- 6 - Idem. 2. Nymphalidae, 91, 'Satyrinae', 127.
- 7 - Idem. 3. Lycaenidae, 162.
- 8 DEMANGE (M.), DENIZE (G.) et LAMBERT (C.). - Lépidoptères Noctuidae du département de la Marne. Les données du Fichier Caruel et observations complémentaires, 137, 174, 189, 239, 271.

DENIZE (G.). - Voir 8.
- 9 DHEURLE (C.). - Notaphus obliquus Sturm, 1825, en nombre dans la Marne 'Col. Trechidae', 122.
- Voir aussi 28.
- 10 DUTREIX (C.) et ESSAYAN (R.). - Contribution à la cartographie des Rhopalocères champenois 'Lep.', 19.

ESSAYAN (R.). - Voir 10.
- 11 LAMBERT (C.). - Lépidoptères " Rhopalocères " du département de la Marne. Données anciennes et première actualisation (suite et fin) 'Lycaenidae s.l.', 9.
- 12 - Une Géométride migratrice nouvelle pour la Marne 'Lep. Geometridae', 27.
- 13 - Les dégâts occasionnés par Leucoma salicis L. aux environs de Reims (Marne) 'Lep. Lymantriidae', 102.
- 14 - Aperçu de la faune lépidoptérique du Camp de Suippes (Marne), en juillet 1984, 167.
- Voir aussi 8.
- 15 LAMBERT (C.) et MÉTAYE (R.). - Malformations alaires lépidoptériques, 198.
- 16 LEBLANC (P.). - Note de capture : Gyrinus suffriani Scriba dans l'Aube 'Col. Gyrinidae', 7.
- 17 - Iconographie d'Hydrocanthares champenois (suite) 'Col. Haliplidae', 8, 40.
- 18 - Idem (suite) 'Col. Gyrinidae', 84.
- 19 - Idem (suite) 'Col. Noteridae', 116.
- 20 - Idem (suite) 'Col. Hygrobiidae', 158.
- 21 - Idem (suite) 'Col. Dytiscidae', 188, 220, 264.
- 22 - Répartition et écologie des Gyrinidae champenois 'Col.', 73.
- 23 - Corrections et additions au Catalogue des Coléoptères de la Haute-Marne, de Camille Le François, édition revue et augmentée par Abel Bultel - Les Hydrocanthares 'Col. Haliplidae, Dytiscidae, Hygrobiidae, Noteridae et Gyrinidae', 123, 149.

- 24 - Capture d'Hydrocanthares peu fréquents dans l'Aube 'Col. Dytiscidae et Gyrinidae', 148.
- 25 - Sur quelques Cerambycides de l'Aube (2e note) 'Col. Cerambycidae', 87.
- 26 - Idem (3e note) 'Col. Cerambycidae', 261.
- 27 - Notice concernant les entomologistes travaillant sur les Hydroadephaga 'Col.', 157.
 - Voir aussi 72.
- 28 LEBLANC (P.), MENU (H.) et DHEURLE (C.). - Contribution à la connaissance des Coléoptères Carabiques de l'Aube et de la Marne (suite). 3. Conchifera Jeannel 'Col. Caraboidea', 41.
- 29 - Idem (suite). 3. Conchifera Jeannel (2e partie) 'Col. Caraboidea', 117.
- 30 - Idem (suite). 3. Conchifera Jeannel (3e partie) 'Col. Caraboidea', 181.
- 31 - Idem (suite). 3. Conchifera Jeannel (4e partie) 'Col. Caraboidea', 253.
- 32 LEBLANC (P.) et SCHOTT (L.). - Contribution à la connaissance des Hydrophiles de l'Aube (suite) 'Col. Hydrophilidae s.l.', 37.
 - MENU (H.). - Voir 28.
- 33 MÉTAYE (R.). - Contribution à la cartographie des Lépidoptères Rhopalocères du département de l'Aube, 230.
- 34 - Quelques formes intéressantes de Rhopalocères aubois 'Lep. Hesperidae, Pieridae et Satyridae', 52.
- 35 - Répartition géographique de quelques Piérides dans le département de l'Aube 'Lep. Pieridae', 99.
- 36 - Répartition géographique de quelques Nymphalides dans le département de l'Aube 'Lep. Nymphalidae', 133, 159, 199, 227.
- 37 - Répartition géographique de quelques Satyrines dans le département de l'Aube 'Lep. Nymphalidae Satyrinae', 267.
- 38 - Sur la répartition géographique de la morphe leucomelas Esper de Melanargia galathea Linné dans l'Aube 'Lep. Satyridae', 98.
- 39 - Répartition géographique et phénologie de Lysandra coridon Poda et de sa morphe syngrapha Keferstein dans le département de l'Aube 'Lep. Lycaenidae', 65.
- 40 - Mellicta aurelia Nickerl dans l'Aube 'Lep. Nymphalidae', 103.
- 41 - Liste préliminaire des Pyalidae et Thyrididae de l'Aube 'Lep. Pyraloidea', 204.
- 42 - Liste préliminaire des Sphingidae de l'Aube 'Lep.', 62.
- 43 - Données cartographiques et écologiques pour servir à l'étude des Lépidoptères Hétérocères de l'Aube. 1. Noctuidae - Corrigenda et addenda, 29.
- 44 - Une chasse de nuit à Bouy-Luxembourg (Aube) 'Lep. Heterocera', 104.
- 45 - Résultat d'une chasse nocturne effectuée dans la commune de Marolles-sous-Lignières (Aube) 'Lep. Heterocera', 235.
- 46 - Note de chasse 'Lep. Rhopalocera', 30.
- 47 - Note d'élevage 'Lep. Tischeriidae', 25.
- 48 - Coléoptères capturés de nuit dans l'Aube, 147.
- 49 - Idem (2e note), 263.
- 50 - Les fichiers entomologiques, 31.

- 51 - Grille et table de conversion Lambert II étendu - UTM pour le département de l'Aube, 179.
- 52 - Pour une utilisation pratique des cartes topographiques de l'IGN. - l. Aube, 281.
- 53 - Les heures de chasses nocturnes en juillet, août et septembre 1985 'Lep. Heterocera', 202.
- 54 - Les heures de chasses nocturnes en octobre, novembre et décembre 1985 'Lep. Heterocera', 238.
- 55 - Les heures de chasses nocturnes de janvier à mars 1986, 280.
- 56 - Sélection d'articles récents, 251.
- 57 - Idem 'Col.', 115.
- 58 - Idem 'Lep.', 16, 61.
- 59 - Présentation d'ouvrage, 252.
- Voir aussi 15.
- 60 MÉTIVIER (G.). - Nouvelles captures de Lépidoptères Geometridae à Nogent-sur-Seine (Aube) (4e note), 26.
- 61 - Nouvelles stations auboises pour Lycaena dispar Haworth 'Lep. Lycaenidae', 90.
- 62 PILLON (O.). - Contribution à la connaissance d'un biotope au bois. Les tourbières à Sphaignes 'Col.', 1.
- 63 - Compte rendu de chasse 'Coleoptera', 223.
- 64 PORCHERET (P.). - Sur la présence de Lycaena dispar Haworth à Méry-sur-Seine (Aube) et aux environs 'Lep. Lycaenidae', 17.
- 65 - Pseudophilotes baton Bergsträsser retrouvé dans le département de l'Aube 'Lep. Lycaenidae', 28.
- 66 - Observations effectuées en bordure de l'ancien aérodrome de Marigny, dans la Marne 'Lep. Rhopalocera', 131.
- 67 - De la photo à l'entomologie 'Lep. Nymphalidae', 136.
- 68 - Observations sur Cynthia cardui Linné et Lycaena dispar Haworth 'Lep. Nymphalidae et Lycaenidae', 270.
- 69 - Note sur Lasiocampa quercus Linné 'Lep. Lasiocampidae', 279.
- 70 - Notes sur Ephemera danica Müller 'Ephem. Ephemeridae', 225.
- 71 SCHOTT (L.). - Une sortie intéressante dans le sud-ouest du canton de Chaource (Aube) 'Col.', 145.
- Voir aussi 32.
- 72 SCHOTT (L.) et LEBLANC (P.). - Contribution à la connaissance des Hydrophiles de l'Aube (suite et fin) 'Col. Hydrophilidae', 109.

Nouvelles publications, 108, 284.

Informations, 36, 216, 278.

Extraits d'articles, 6, 18, 39, 51, 72, 121, 173, 178, 187, 279.

Errata, 157, 250, 262.

INDEX SYSTÉMATIQUE

Les nombres correspondent aux numéros de référence de la Table des Matières.

COLEOPTERA

- Aube 1
- Aphodiidae Aube 49
- Byrrhidae Aube 71
- Carabidae Aube 49, 71
- Cerambycidae Aube 25, 26
- Dytiscidae Aube 21, 24, 48, 49, 62, 63, 71; Marne 21; Hte-Marne 21, 23
- Elophoridae Aube 63
- Endomychidae Aube 71
- Geotrupidae Aube 71
- Gyrinidae Aube 16, 18, 22, 24; Marne 18, 22; Hte-Marne 18, 22, 23
- Haliplidae Aube 17, 62, 63; Marne 17; Hte-Marne 17, 23
- Harpalidae Aube 28, 29, 71; Marne 28, 29
- Helophoridae Aube 72
- Hydrophilidae Aube 32, 63, 71, 72
- Hygrobiidae Aube 20; Marne 20, Hte-Marne 20, 23
- Limnebiidae Aube 72
- Melolonthidae Aube 48, 49
- Nebriidae Aube 71
- Nitidulidae Aube 71
- Noteridae Aube 19; Marne 19; Hte-Marne 19, 23
- Pterostichidae Aube 30, 31, 48, 71; Marne 30, 31
- Silphidae Aube 48, 49
- Spercheidae Aube 72
- Sphaeridiidae Aube 72
- Tenebrionidae Aube 71
- Trechidae Marne 9
- Arctiidae Aube 44, 45; Marne 14
- Crambidae Aube 45
- Drepanidae Aube 45
- Geometridae Aube 15, 44, 45, 60; Marne 12, 14
- Hesperiidae Aube 10, 33, 34; Marne 5, 14, 66; Hte-Marne 10
- Lasiocampidae Aube 44, 45, 69; Marne 14
- Limacodidae Aube 45
- Lycaenidae Aube 10, 33, 39, 46, 61, 64, 65, 68; Marne 7, 11, 14, 15, 66; Hte-Marne 10
- Lymantriidae Aube 44, 45; Marne 13
- Noctuidae Aube 15, 43, 44, 45, Marne 8, 14
- Notodontidae Aube 44, 45; Marne 15
- Nymphalidae Aube 10, 33, 36, 40, 46, 64, 65, 67, 68; Marne 6, 14, 66, 67; Hte-Marne 10
- Papilionidae Aube 10, 33; Marne 5, 14
- Pieridae Aube 10, 33, 34, 35, 46, 65; Marne 5, 14, 66; Hte-Marne 10
- Pyrilidae Aube 41, 44
- Riodininae Marne 7
- Satyrinae Aube 10, 33, 34, 37, 38, 46, 65; Marne 6, 14, 15, 66; Hte-Marne 10
- Sesiidae Marne 14
- Sphingidae Aube 2, 3, 42, 44, 45; Marne 14
- Thyatiridae Aube 44
- Thyrididae Aube 41
- Tischeriidae Aube 47
- Tortricidae Aube 44
- Yponomeutidae Aube 44
- Zygaenidae Marne 14, 15

EPHEMEROPTERA

- Ephemeridae Aube 70; Marne 70

HYMENOPTERA

- Cimbicidae Aube 2

LEPIDOPTERA

- Aube 1, 4

VARIA

- Aube 1

GROUPE ENTOMOLOGIQUE CHAMPENOIS (G.E.C.)
 (Loi 1901)

Président d'Honneur : M. Robert GALLEY, Maire de Troyes
 Vice-Président honoraire : M. Gérard MÉTIVIER

CONSEIL D'ADMINISTRATION 1985

Président M. Pascal LEBLANC
 Vice-Président M. Olivier PILLON
 Secrétaire-Trésorier Mme Nadine LEBLANC
 Bibliothécaire et
 Directeur du Bulletin ... M. Roger MÉTAYE
 Membre M. Pierre VIETTE

Le " GROUPE ENTOMOLOGIQUE CHAMPENOIS " a pour but l'étude de l'entomofaune champenoise : inventaires, répartition, biologie et écologie. De plus, il contribue à l'étude et à l'enrichissement des collections du Musée d'Histoire naturelle de Troyes.

Les membres du G.E.C. se livrent à des recherches individuelles ou collectives portant essentiellement sur l'entomofaune des départements champenois : Aube, Marne et Haute-Marne. Les résultats de leurs travaux sont publiés dans un bulletin trimestriel dont les dates de publication correspondent à celles des réunions.

Les réunions ont lieu le 3e samedi des mois de mars, juin, septembre et décembre, à partir de 15 heures, à Troyes, en un lieu dont l'adresse est précisée sur les convocations.

Pour adhérer au Groupe entomologique champenois, ainsi que pour tout renseignement, s'adresser au Président du G.E.C. :
 Pascal LEBLANC - Musée d'Histoire naturelle - 26, rue Chrestien-de-Troyes - 10000 Troyes. - Téléphone : 25.73.49.49 (Poste 382).

Le Bulletin est servi aux membres du G.E.C. Il est également adressé aux diverses sociétés et organismes suivants (L'astérisque signale les échanges) :

Ardennes - *La Maison des CPN (Boult-aux-Bois).
Aube - *Association des Amis du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient (Piney) - *Bibliothèque municipale de Troyes - *Groupe d'Étude d'Histoire naturelle 'Gentiana' (Troyes) - Musée d'Histoire naturelle de Troyes - *Société académique de l'Aube (Troyes).
Côte-d'Or - Université de Dijon : Laboratoire d'Écologie.
Creuse - Musée de Guéret.
Eure - *Association entomologique d'Évreux 'AEE'.
Gironde - *Association naturaliste de Guyenne (Port-Sainte-Foy) - *Société linnéenne de Bordeaux.
Haute-Marne - *Société de Sciences naturelles et d'Archéologie de la Haute-Marne (Chaumont) - *Union régionale Champagne-Ardenne pour la Nature et l'Environnement 'URCANE' (Chaumont).

Meurthe-et-Moselle - *Association lorraine des Amis des Sciences de la Terre 'ALAST' (Nancy).

Nord - *Société entomologique du Nord de la France (Villeneuve-d'Ascq).

Oise - *Société Sciences nat (Venette).

Paris - *Alexanor - *Bibliothèque centrale du Muséum national d'Histoire naturelle - Bibliothèque du Laboratoire d'Entomologie du Muséum - *L'Entomologiste - *Société de Biogéographie - *Société entomologique de France.

Haut-Rhin - *Société entomologique de Mulhouse.

Rhône - *Société linnéenne de Lyon.

Saône-et-Loire - *Société d'Histoire naturelle et des Amis du Muséum d'Autun.

Seine-Maritime - *Centre de Documentation sur le Milieu (Rouen) - *Société d'Étude des Sciences naturelles et du Musée d'Elbeuf.

Seine-et-Marne - *Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (Fontainebleau).

Yvelines - *Office pour l'Information éco-entomologique 'OPIE' (Versailles).

ALLEMAGNE - *Deutsche Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen 'Atalanta' (Marktleuthen) - *Entomofauna (München).

BELGIQUE - *Faculté des Sciences agronomiques de l'État (Gembloux) - *Linneana Belgica (Bruxelles).

GRANDE-BRETAGNE - *The Balfour-Browne Club (Prestwick) - General Library, British Museum (N.H.) (London) - *Zoological Society of London.

PAYS-BAS - Bibliotheek van de Nederlandse Entomologische Vereniging (Amsterdam).

SUISSE - *Société vaudoise d'Entomologie (Lausanne).

Les demandes d'échange sont acceptées. Pour tous renseignements se rapportant au Bulletin, s'adresser au Directeur de la Publication :

Roger MÉTAYE - 307, rue du Fbg-Croncels - 10000 Troyes

ABONNEMENT 1986

(4 fascicules)

France et Étranger ... 40 FF (net à nous)

Les années anciennes, au tarif de l'année en cours + frais de port

Les chèques doivent être libellés au nom du " Groupe entomologique champenois " et être adressés impersonnellement au siège du G.E.C.

Les abonnés peuvent, au même titre que les membres du G.E.C., publier dans le Bulletin toutes observations ou études relatives à l'entomofaune champenoise.

Prix : 12 F