

### Table des Auteurs du Tome 53

|   |     |
|---|-----|
| AELLEN (V.) & THORENS (P.). — <i>Modicogryllus frontalis</i> (Filher, 1844), un nouveau Grillon pour la faune française découvert dans le Var ( <i>Orth. Gryllidae</i> ) .....  | 241 |
| AGUILAR (J. d'). — Notes de Bibliographie entomologique. 7. — La Zoologie agricole (1854-1856) d'E. Blanchard.....  | 181 |
| BENREKAA (A.) & DOUMANDJI (S.). — Comparaison des régimes alimentaires de la mante religieuse <i>Mantis religiosa</i> Linné 1758 et de la mante bioculée <i>Sphodromantis viridis</i> Forskal 1775 dans la banlieue d'Alger ( <i>Dict. Mantidae</i> ) ..... | 253 |
| BINON (M.), RIVIÈRE (M.) † & SECCHI (F.). — <i>Saperda perforata</i> (Pallas). Sa répartition en France ( <i>Col. Cerambycidae</i> ).....   | 271 |
| BOURNEUF (F.). — Sur la capture de quatre espèces de Cétoines dans la Sarthe <i>Col. Cetoniidae</i> .....   | 29  |
| BOUYON (H.). — Coléoptères d'une décharge rurale en Ile-de-France.....  | 197 |
| BRUSTEL (H.). — Deux nouvelles localités françaises pour <i>Paratillus carus</i> Newman, 1840 ( <i>Col. Cleridae</i> ) .....  | 159 |
| CHAVANON (G.) & ZITOUNI (N.). — Quelques Coléoptères Caraboidea nouveaux ou intéressants de l'est du Maroc .....  | 81  |
| CHEVIN (H.). — Rassemblement de <i>Sitaris muralis</i> Förster <i>Col. Meloidae</i> ).....  | 32  |
| COULON (J.). — Capture récente d' <i>Amara morio</i> ssp. <i>nivium</i> Tschitscherine en Savoie ( <i>Col. Carabidae</i> ) .....  | 185 |
| COULON (J.). — <i>Amara proxima</i> Putzeys dans le sud-est de la France. Appel à témoins ! ( <i>Col. Carabidae</i> ) .....   | 257 |
| CREN (M.). — Voir Reisdorf (P).   |     |
| DEFAUT (B.). — Localités orthoptériques intéressantes en France continentale.....   | 1   |
| DEGALLIER (N.) & MEUNIER (J.-Y.). — <i>Acritus komai</i> Lewis, espèce nouvelle pour la faune de La Réunion <i>Col. Histeridae</i> ) .....  | 22  |
| DOUMANDJI (S.). — Voir Benrekaa (A).  |     |
| DUSSAIX (C.). — Elevage de <i>Mallota cimbiciformis</i> Fallèn, 1817 ( <i>Dipt. Syrphidae</i> ) en France (Sarthe) .....  | 99  |
| EHRET (J. M.). — Notes sur quelques charançons paléarctiques <i>Col. Curcul. Apioninae</i> )....  | 129 |
| GIORDAN (J. C.). — Description d'un <i>Duvalius</i> nouveau de la Haute Roya, Hameau de Granille, Commune de Tende, Alpes-Maritimes ( <i>Col. Carab. Trechinae</i> ) .....  | 105 |
| GIORDAN (J. C.). — L'Harmas de Sérignan .....   | 281 |
| HÉBRARD (J. P.). — Voir Ponel (P).  |     |
| INGLEBERT (H.). — Faune des Coléoptères de Paris « intra muros ». — Nouvelles données concernant les <i>Cerambycidae</i> .....  | 177 |
| KEITH (D.). — Confirmation de la présence de <i>Arhopalus fesus</i> Mulsant dans le Bas-Rhin ( <i>Col. Cerambycidae</i> ).....  | 31  |
| KNUTELSKI (S.) & PETRYSAK (B.). — Nouvelles données sur la répartition en Europe de <i>Rhopalation longirostre</i> Olivier 1807 ( <i>Col. Apionidae</i> ) .....   | 51  |
| KNUTELSKI (S.) & ROYAUD (A.). — <i>Liparus dirus</i> Herbst <i>Col. urculionidae</i> ) et <i>Clonopsis gallica</i> Charpentier ( <i>Phasm. Bacillidae</i> ), deux espèces intéressantes pour l'entomofaune des Pyrénées-Atlantiques (France).....           | 97  |
| LAFORGUE (A.). — La bête qui monte ( <i>Col. Carabidae</i> ) .....  | 32  |
| LAMBELET (J.). — Coléoptères nouveaux ou rares pour le Gard .....   | 203 |
| LE GOFF (G.). — Note sur la nidification dans la Férule d'Apoïdes <i>Anthoporidae</i> et <i>Megachilidae</i> du Roussillon <i>Hym. Apoidea</i> ). Première partie .....   | 209 |
| LE GOFF (G.). — Note sur la nidification dans la Férule d'Apoïdes <i>Anthrophoridae</i> et <i>Megachilidae</i> du Roussillon ( <i>Hym. Apoidea</i> ). Deuxième partie .....   | 259 |

|   |     |
|---|-----|
| LÓPEZ-COLÓN (J. I.). — Étude de la série typique et désignation du lectotype d' <i>Hoplia ramburi</i> Heyden 1870 ( <i>Col. Scarab. Hopliinae</i> ).....  | 35  |
| LÓPEZ-COLÓN (J. I.). — Désignation du lectotype d' <i>Hoplia chlorophana</i> Erichson 1848 ( <i>Col. Scarab. Hopliinae</i> ).....   | 36  |
| LÓPEZ-COLÓN (J. I.). — Étude de la série typique et désignation du lectotype de <i>Serica ariasi</i> Brenske, 1897 ( <i>Col. Scarab. Melolonthinae</i> ).....   | 37  |
| LÓPEZ-COLÓN (J. I.). Étude de la série typique et désignation du lectotype de <i>Serica segurana</i> Branske, 1897 <i>Col. Scarab. Melolonthinae</i> ).....   | 39  |
| LÓPEZ-COLÓN (J. I.). — Étude du type de <i>Triodonta lusitanica</i> Branske, 1894 ( <i>Col. Scarab. Melolonth. Sericini</i> ).....  | 135 |
| LÓPEZ-COLÓN (J. I.). — Étude des séries typiques et désignation des lectotypes d' <i>Hymenoplia angusta</i> Heyden, 1870 ? <i>Hymenoplia estrellana</i> Heyden, 1870 et <i>Hymenoplia ramburi</i> Heyden, 1875 ( <i>Col. Scarab. Melolonthinae</i> )..... | 277 |
| LÓPEZ-COLÓN (J. I.). — Erratum .....  | 279 |
| LUPOLI (R.). — Notes sur quelques punaises peu connues rencontrées sur les Crucifères ( <i>Heteropt. Pentatomidae Eurydemini et Podopinae</i> ).....  | 87  |
| MARQUET (J.). — Natura 2000 en Val-de-Claise. Espoir et réalité sur l'avenir de la biodiversité entomologique en Sud Touraine et ailleurs.....  | 247 |
| MEUNIER (J. Y.). — Voir Degallier (N.).   |     |
| MINEAU (A.). — Sur la présence en Ile-de-France de deux Buprestes rares ( <i>Col. Buprestidae</i> ).....  | 31  |
| PAULIAN (R.). — <i>In Memoriam</i> . Hervé Hauret (1911-1994).....  | 49  |
| PERRIN (H.). — Récoltes accidentelles de <i>Curculionidae</i> tropicaux en France métropolitaine ( <i>Col.</i> ).....   | 155 |
| PETRYSAK (B.). — Voir Knutelski (S.).   |     |
| PLUOT-SIGWALT (D.). — Les glandes céphaliques des Coléoptères adultes .....   | 161 |
| PONEL (R.) & HEBRARD (J. P.). — Une localité nouvelle d' <i>Abemus chloropterus</i> Panzer, 1796 en Basse-Provence ( <i>Col. Staphylinidae</i> ).....   | 137 |
| PUPIER (R.). — Sur la présence en France de <i>Paracelia simplex</i> Dejean, 1828 ( <i>Col. Carabidae</i> ).....  | 187 |
| REISDORF (P.) & CREN (M.). — Les Carabes du massif forestier de Rambouillet ( <i>Col. Carabidae</i> ).....  | 55  |
| ROYAUD (A.). — Voir Knutelski (S.).   |     |
| SARTHOU (J. P.). — De l'emploi du tube à aspiration pour la capture à vue de Diptères Syrphides adultes.....  | 23  |
| SECQ (M.). — Le genre <i>Abraeus</i> Leach ( <i>Col. Histeridae</i> ).....  | 149 |
| SECQ (M. & B.). — Les <i>Saprinus</i> Erichson de la faune de France ( <i>Col. Histeridae</i> ). Première partie .....  | 9   |
| SECQ (M. & B.). — Les <i>Saprinus</i> Erichson de la faune de France ( <i>Col. Histeridae</i> ). Deuxième partie.....   | 65  |
| SECCHI (F.). — Longicornes nouveaux dans la forêt d'Orléans ( <i>Col. Cerambycidae</i> )....  | 160 |
| SSYMANK (A.). — Quelques notes faunistiques et biologiques sur les mouches syrphides ( <i>Dipt. Syrphidae</i> ) en Périgord.....  | 225 |
| TAGLIAFERRI (F.). — Une méthode de conservation temporaire des Coléoptères : le liquide Pavesi .....  | 193 |
| THORENS (P.). — Voir Aellen (V.).....   | 241 |
| VIETTE (P.). — <i>Banisia clathrula</i> (Guenée, 1877), <i>Lepidoptera Thyrididae</i> des îles Mascareignes.....  | 273 |
| VINCENT (R.). — <i>Rhopalocerus rondanii</i> Villa est-il toujours un mythe ? ( <i>Col. Colydiidae</i> ).....   | 145 |
| YVINEC (J. H.). — <i>Porthmidius austriacus</i> Schrank, 1781 en forêt de Compiègne ( <i>Col. Elateridae</i> ).....   | 33  |
| YVINEC (J. H.). — Infestation par les insectes d'un grenier carbonisé de la fin du 11 <sup>e</sup> siècle A. D. à Amiens (Somme).....   | 113 |
| ZITOUNI (N.). — Voir Chavanon (G.).   |     |

### Formes nouvelles pour la Science

|  |     |
|--|-----|
| <i>Duvalius P'huilieri</i> n. sp., GIORDAN, Col. Trechidae .....               | 105 |
| <i>Oxystoma (Eutrichapion) voisini</i> n. sp., EHRET, Col. Curculionidae ..... | 130 |
| <i>Postabraeus</i> subgen. nov., SECQ, Col. Histeridae .....                   | 151 |

### Formes nouvelles pour la France & les D.T.O.M.-T.O.M.

|   |     |
|---|-----|
| <i>Acritus komai</i> Lewis, La Réunion, DEGALLIER & MEUNIER, Col. Histeridae .....  | 22  |
| <i>Modicogryllus frontalis</i> Fieber, Var, AELLEN & THORENS, Orth. Gryllidae ..... | 241 |
| <i>Paracelia simplex</i> Dejean, France Sud-Est, PUIPIER, Col. Carabidae .....      | 187 |

### Lectotypes désignés

|   |     |
|---|-----|
| <i>Hoplia ramburi</i> Heyden, LÓPEZ-COLÓN, Col. Scarab. Hopliinae .....             | 35  |
| <i>Hoplia chlorophana</i> Erichson, LÓPEZ-COLÓN, Col. Scarab. Hopliinae .....       | 36  |
| <i>Hymenoplia angusta</i> Heyden, LÓPEZ-COLÓN, Col. Scarab. Melolonthinae .....     | 277 |
| <i>Hymenoplia estrellana</i> Heyden, LÓPEZ-COLÓN, Col. Scarab. Melolonthinae .....  | 277 |
| <i>Hymenoplia ramburi</i> Heyden, LÓPEZ-COLÓN, Col. Scarab. Melolonthinae .....     | 278 |
| <i>Serica ariasi</i> Brenske, LÓPEZ-COLÓN, Col. Scarab. Melolonthinae .....         | 37  |
| <i>Serica segurana</i> Brenske, LÓPEZ-COLÓN, Col. Scarab. Melolonthinae .....       | 39  |
| <i>Triodontia lusitanica</i> Brenske, LÓPEZ-COLÓN, Col. Scarab. Melolonthinae ..... | 135 |

---

**La Rédaction vous souhaite une heureuse fin d'année,  
vous adresse ses meilleurs vœux pour 1998...  
et rappelle aux retardataires  
de se mettre en règle avec la trésorerie.**