


# BULLETIN D'ENTOMOLOGIE CHAMPENOISE

Publication trimestrielle



INVENTAIRES  
CARTOGRAPHIE  
BIOLOGIE - ÉCOLOGIE

GRUPE ENTOMOLOGIQUE CHAMPENOIS  
Musée d'Histoire naturelle  
26, rue Chrestien-de-Troyes  
10000 TROYES

# BULLETIN D'ENTOMOLOGIE CHAMPENOISE

Directeur : Roger MÉTAYE

---

## SOMMAIRE

Sur la répartition de quelques familles de Coléoptères dans l'Aube (suite et fin) par Olivier PILLON .....	217
Iconographie d'Hydrocanthares champenois (suite) 'Col. Haliplidae par Pascal LEBLANC .....	220
Contribution à la connaissance des Coléoptères Carabiques de l'Aube et de la Marne. 2. Groupe Scrobifera 'Col. Scaritidae' par Charles DHEURLE, Pascal LEBLANC et Henri MENU .....	221
Des noms français .....	222
Une localité entomologique intéressante : Châlons-sur-Vesle dans la Marne 'Col. Caraboidea' par Charles DHEURLE .....	223
Des noms latins .....	224
Lépidoptères "Rhopalocères" du département de la Marne. Données anciennes et première actualisation 'Lep. Hesperidae, Papilionidae et Pieridae' par Claude LAMBERT .....	225
Données cartographiques et écologiques pour servir à l'étude des Lépidoptères Hétérocères de l'Aube. 1. Noctuidae (suite) par Roger MÉTAYE .....	235
Annulation .....	248
Liste préliminaire des Lymantriidae de l'Aube 'Lep. Noctuoidea' par Roger MÉTAYE .....	249
Errata .....	250
Présentation d'ouvrage par Roger MÉTAYE .....	251

---

# BULLETIN D'ENTOMOLOGIE CHAMPENOISE

---

## SUR LA RÉPARTITION DE QUELQUES FAMILLES DE COLÉOPTÈRES DANS L'AUBE (suite et fin) (1)

par Olivier PILLON

### D - LEXIQUE

Afin de rendre plus polyvalent ce dictionnaire, nous proposons de définir, d'une part, les termes utilisés dans la partie consacrée à la systématique des Hydrocanthares de l'Aube (mots précédés d'un astérisque), d'autre part, quelques termes faisant partie du vocabulaire de base de tout ouvrage de détermination.

- aciculaire. - Terminé en pointe très fine.  
aciculé. - Couvert de petits traits, comme gravés à la pointe d'une épingle.  
\*alutacé. - Couvert d'un pointillé très fin (visible seulement à la loupe binoculaire).  
\*angle pronoto-élytral. - Angle formé par le thorax et l'élytre, à l'épaule.  
\*antenne. - Organe allongé et mobile fixé sur la tête.  
apical. - Placé au sommet.  
apophyse. - Saillie détachée ou prolongement d'un organe.  
aréolé. - Divisé en cellules.  
calus. - Saillie ou bosse légère.  
canaliculé. - Creusé d'un ou plusieurs sillons larges.  
canthus. - Partie antérieure du front prolongée sur l'oeil dont elle entame ou divise la surface.  
carène. - Saillie ordinairement tranchante.  
caténiforme. - En forme de chaînon.  
chéliforme. - En forme de pince.  
claviforme. - En forme de massue.  
clypéiforme. - En forme de bouclier.  
concolore. - D'une même couleur.  
conné. - Soudé.  
cordiforme. - En forme de coeur.  
costiforme. - En forme de côte.  
coxal. - Qui dépend des hanches.  
crétacé. - Couleur de craie.  
cupules. - Organes circulaires, propres au dessous des tarse des mâles et susceptibles d'adhérer aux surfaces lisses.  
cuspidé. - En pointe aiguë.  
cyathiforme. - En forme de coupe.  
disque. - Région centrale d'un organe.  
écusson. - Pièce médiane enclavée entre la base du thorax et les deux élytres.  
\*élytre. - Aile supérieure modifiée servant d'étui à l'aile inférieure.

---

1. Cf. Bull. d'Ent. champen., 2 (6), 1983 : 181-188.

- éperon. - Pointe mobile articulée sur le tibia.
- \*épipleur. - Bord infléchi ou repli latéral de l'élytre.
- épistome. - Portion antérieure du dessus de la tête.
- falciforme. - En forme de fer de faux.
- fascie. - Bande colorée.
- fasciculé. - Présentant des touffes de poils en faisceaux.
- fovolé. - Marqué d'une ou de plusieurs impressions arrondies.
- fusifforme. - En forme de fuseau.
- gémisé. - Accouplé deux à deux.
- généculé. - Coudé brusquement.
- gibbeux. - Très bossu.
- \*glabre. - Sans poils.
- hispidé. - Garni de poils courts et raides.
- huméral. - Qui dépend de l'épaule.
- inermé. - Sans pointe ni épine.
- labial. - Qui dépend de la lèvre inférieure.
- labre. - Lèvre supérieure.
- laciné. - Divisé en lanière.
- lunule. - Tache en croissant.
- mésosternum. - Face inférieure du 2e segment thoracique sur laquelle sont insérées les pattes intermédiaires.
- \*métacoxa. - Saillie séparant les hanches des pattes intermédiaires (Fourches métacoxales : division bifide des métacoxas).
- \*métasternum. - Face inférieure du 3e segment thoracique sur laquelle sont insérées les pattes intermédiaires (Aile métasternale : portion latérale du métasternum refoulée par l'extension des hanches postérieures et réduite à une bande).
- moniliforme. - En forme de chapelet.
- mucroné. - Pourvu d'un prolongement pointu.
- mutique. - Sans pointe ni épine.
- oblitéré. - Effacé en partie.
- obsolete. - Presque effacé ou très peu marqué.
- ombiliqué. - Percé au centre.
- onychium. - Article des tarsi qui porte les ongles.
- pectiné. - En forme de peigne.
- pollineux. - Ayant l'apparence du pollen.
- \*pronotum. - Face dorsale du prothorax.
- prosternum. - Face inférieure du prothorax où sont insérées les pattes antérieures.
- prothorax. - Corselet.
- \*pubescent. - Garni de poils.
- pulvérulent. - Couvert de substances analogues à la farine.
- pygidium. - Dernière plaque dorsale de l'abdomen.
- pyriforme. - En forme de poire.
- ramiforme. - En forme de rame.
- reniforme. - En forme de rein.
- réticulé. - Couvert d'un réseau.
- scutellaire. - Qui dépend de l'écusson.
- scutiforme. - En forme d'écusson.
- sécouriforme. - En forme de hache.
- serriforme. - En forme de lame de scie.
- sétigère. - Qui porte une ou plusieurs soies.
- spinigère. - Qui porte une ou plusieurs épines.
- squaméux. - Couvert d'écailles.
- subulé. - Terminé en pointe aiguë et fine.

- sulciforme. - En forme de sillon.  
\*suture. - Point de contact de deux pièces (Suture élytrale : sillon médian formé par les deux élytres).  
\*tarse. - Partie terminale des pattes.  
testacé. - Couleur de terre cuite (état des téguments dépigmentés).  
tronqué. - Coupé brusquement.  
vermiculé. - Couvert de linéoles sinueuses.  
versicolore. - De couleurs variées.  
vertex. - Partie supérieure de la tête, en arrière des yeux.  
villeux. - Couvert de longs poils touffus.

#### F - DISCUSSION ET POST-FACE

Bien que le département de l'Aube semble quelque peu délaissé par les entomologistes, sa situation géographique en fait un carrefour d'insectes d'exigences très différentes. Nous y rencontrons bon nombre d'espèces qui semblent y être en limite de leur zone de répartition.

Aussi, par l'intermédiaire de notre catalogue, nous souhaitons avoir fait germer un désir de connaissance de notre hydro-faune départementale.

Au-delà d'une liste d'espèces et de localités, ce catalogue doit être perçu comme une contribution à l'étude de la biologie de chaque Hydrocanthare, et, plus globalement, à l'étude de chaque éco-système. Bien souvent, nos jeunes collègues Auboisiens, "mordus de bestioles", rencontrent des difficultés de détermination. Faute de disponibilité de notre part, et d'existence d'une collection de référence consultable par tous, l'emploi des ouvrages de détermination devient vite rébarbatif.

Ainsi, des renseignements restent couchés sur du coton cardé ou bien en alcool, et le feu sacré s'éteint.

La rédaction des tableaux dichotomiques simplifiés vise principalement à donner une idée du nom de l'insecte épinglé sous la loupe des entomologistes débutants. Ils devront, par la suite, confirmer ou infirmer leur détermination en utilisant les descriptions données dans les ouvrages reconnus. Des critères comme la taille ou la couleur, bien que relativement stables pour les insectes récoltés sur une faible superficie comme celle du département de l'Aube, ne peuvent pas être seuls retenus. Ainsi, ces clefs de détermination devront être perçues seulement comme indicatives ou utilisées comme "pense-bête", et éviter de ce fait une perte de temps lors de nouvelles déterminations.

Quant à la nomenclature, elle semble être en constante évolution. Il est des plus probable que celle utilisée dans cette série d'articles soit déjà dépassée. Nous comptons sur votre indulgence et sur vos critiques.

Dans ces dernières lignes, je tiens à remercier tout particulièrement M. Roger MÉTAYE sans qui cette succession d'articles n'aurait pu voir le jour.

28, rue Paul-Bert, 10300 Sainte-Savine

ICONOGRAPHIE D'HYDROCANTHARES CHAMPENOIS (suite)

'COL. HALIPLIDAE'

par Pascal LEBLANC

Haliplus (Neohaliplus) lineaticollis Marsham (fig. 7)

Description. - Lg. 2,5-5 mm. Ovale allongé, jaunâtre avec la tête brune ou noire. Pronotum avec une tache longitudinale sur le disque. Une tache commune aux deux élytres entourée de 4 taches plus petites. Pattes longues.

Variations. - Outre la forme générale qui peut être plus ou moins trapue, la longueur du corps varie beaucoup, la variété pici Régimbart (2,3 mm) constituant une forme extrême.

La coloration est aussi soumise à des fluctuations; le tête peut s'éclaircir légèrement, le pronotum devenir concolore : ab. nitidicollis Müller (fig. 7a) ou les taches élytrales disparaître : ab. pallidus Sahlberg (fig. 7b). À l'inverse, les taches élytrales peuvent s'élargir et plus ou moins fusionner entre elles : ab. suffusus Wollaston (fig. 7c).

Observations. - La tête foncée et les longues stries arquées ne permettent pas de confondre cette espèce avec une autre. Il a cependant été décrit une variété directus Goeze dont les linéoles basales seraient droites. Je n'ai jamais observé cette forme.

Répartition. - Aube, Marne et Hte-Marne. Commun dans les eaux courantes.

Haliplus (Haliplinus) ruficollis De Geer (fig. 8)

Description. - Lg. 2,5-2,8 mm. Corps court, ovoïde, épaules marquées lui donnant un aspect presque rond. Six taches noires (trois sur chaque élytre) sont seules visibles sur le terrain. En réalité, elles sont accompagnées de lignes noires.

Variations. - Les taches peuvent être plus ou moins marquées. Une forme extrême mélanisante a été décrite sous le nom d'ab. confluens Fiori. Les femelles ont le dessus des élytres alutacé, mais celui-ci peut se réduire et ne subsister qu'à l'apex. On nomme cette variété femelle multipunctata Wehncke (fig. 8a).

Répartition. - Aube, Marne et Hte-Marne.

Haliplus (Haliplinus) heydeni Wehncke (fig. 9)


Description. - Lg. 2,2-2,5 mm. Corps encore plus court que le précédent. L'aspect presque rond est par conséquent plus prononcé; la coloration ne diffère pas du précédent.

Variations. - On rencontre des exemplaires à taches réduites, d'autres à taches plus prononcées comme chez tous les Haliplus. Il est possible que l'ab. confluens Fiori ait aussi qualifié certains exemplaires mélanisants de cette espèce.


Observation. - La distinction entre cette espèce et la précédente peut être difficile sur le terrain.

Répartition. - Aube (LEBLANC et PILLON leg.), Marne (DHEURLE leg.). Cette espèce n'est pas signalée de la Hte-Marne, sans doute par confusion avec la précédente. Elle doit y exister, mais n'y a pas encore été capturée, à ma connaissance.


Musée d'Histoire naturelle  
26, rue Chrestien-de-Troyes, 10000 Troyes



7. *Haliplus lineaticollis* (x15)



8. *Haliplus ruficollis* (x15)



9. *Haliplus heydeni* (x15)

LEBLANC del.

CONTRIBUTION À LA CONNAISSANCE DES COLÉOPTÈRES  
CARABIQUES DE L'AUBE ET DE LA MARNE (suite) (1)

2. GROUPE SCROBIFERA  
'COL. SCARITIDAE'

par Charles DHEURLE, Pascal LEBLANC et Henri MENU

Dans un article précédent (Bull. d'Ent. champen., 2 (2), 1982 : 43-53), DHEURLE et LEBLANC ont mentionné 6 espèces auboises dont 4 furent reprises récemment. Nous n'ajouterons aucune indication nouvelle.

Pour la Marne, LAJOYE fait mention de 3 espèces dans son catalogue en 1878, et de 6 espèces en 1896. BETTINGER signale en plus des 2 Clivina, 9 espèces de Dyschirius dont 3 proviennent de l'Aisne et n'entrent donc pas dans le cadre de notre travail. Le fichier Caruel reprend les 6 Dyschirius marnais ainsi que les 2 Clivina.

Tableau des espèces marnaises

Espèces	Catalogue Lajoie 1878	Catalogue Lajoie 1896	Catalogue Bettinger 1900-1944	Fichier Caruel 1945-1955	Données récentes 1970-1982
SCROBIFERA					
<u>Scaritidae</u>					
C. fossor	x	x	x	x	x
- collaris		x	x	x	x
D. angustatus			x	x	
- globulus	x	x	x	x	x
- intermedius			x	x	
- aeneus		x	x	x	
- nitidus	x	x	x	x	
- politus		x	x	x	

Commentaires et remarques sur ces espèces

Que ce soit dans l'Aube ou dans la Marne, les deux Clivina (une seule pour JEANNEL, 1941-42 : 257) se rencontrent couramment.

Les Dyschirius, probablement du fait de leur habitat particulier et des difficultés de détermination, n'ont pas été recherchés valablement depuis les travaux de BETTINGER. Il conviendrait de pallier rapidement à ce manque d'observation.

Dyschirius angustatus Ahrens. - Seul HAREZ a dû rencontrer cette espèce dans la Marne : "au bord d'un ruisseau dans le bois de Germaine"; la commune n'est pas indiquée. À son sujet, BETTINGER précise "très rare", mais lui-même ainsi que CARUEL ne font état d'aucun apport nouveau.

Dyschirius globulus Herbst. - BETTINGER signale pour la Marne la variété tournieri Putz. (Wez, Thuisy, le 12-03-1933), qui n'est mentionnée que du Jura, par JEANNEL (1941-42 : 271). Il considère ce Dyschirius comme le plus souvent rencontré dans la Marne.

1. Cf. Bull. d'Ent. champen., 2 (5), 1983 : 153-158.

Dyschirius intermedius Putzeys. - Espèce indiquée comme très rare par BETTINGER, et non mentionnée dans le Catalogue Lajoie. Elle fut rencontrée dans 4 stations dispersées dans la Marne : forêt de Trois-Fontaines, Prouilly, St-Eulien, Sézanne.

Dyschirius aeneus Dejean. - Cette espèce est mentionnée sous le nom d'aeneus Putzeys (Bull. d'Ent. champen., 2 (2), 1982 : 51) par référence au Catalogue Bonadona (1971 : 53); il doit y avoir dans ce dernier catalogue une confusion entre aeneus Dejean et apicalis Putzeys; les stations de ce dernier s'appliqueraient à apicalis et non à aeneus.

Cette espèce est mentionnée par LAJOYE; BETTINGER en reprend les indications et en ajoute d'autres : Germaine (HAREZ), Condé-sur-Marne, Hautvillers, Vauciennes. CARUEL maintient celles-ci sans addition nouvelle. Elle semble plus commune que la précédente.

Dyschirius nitidus de Geer. - Espèce signalée d'Ay (LAJOYE), puis de Mareuil-sur-Ay (HAREZ in CARUEL); BETTINGER aurait aussi capturé cette espèce, sans toutefois donner aucune station nouvelle.

Dyschirius politus Dejean. - Comme la précédente, cette espèce est signalée d'Ay, par LAJOYE et HAREZ. Elle existe aussi dans quelques autres localités du nord-ouest de la Marne : Condé-sur-Marne, Pargny. BETTINGER la considère comme rare.

C. D., 5, allée Yves-Gandon, 51100 Reims  
P. L., 26, rue Chrestien-de-Troyes, 10000 Troyes  
H. M., rue des Grands-Clos, Cauroy-lès-Hermonville,  
51220 Hermonville

#### DES NOMS FRANCAIS

Localités. - L'orthographe officielle des noms composés d'agglomération et de départements comporte des traits d'union, que ces noms soient écrits en entier ou en abrégé : Bucey-en-Othe, Haute-Marne, H.-M.

Personnes. - Le nom propre d'une personne non précédé de M. ou Mme désigne l'auteur d'un article, une personne décédée, ou constitue une forme familière qu'on ne se permet qu'avec un ami, ou un collègue que l'on connaît bien. Dans les autres cas, il est correct d'adjoindre M. ou Mme. Dans certains cas, on ajoute, par déférence, le titre de la personne : Dr, Professeur ...

Il est en outre préférable d'indiquer le ou les prénoms, ou leurs initiales, mais il n'est pas nécessaire de répéter cette indication si la personne est citée plusieurs fois.

UNE LOCALITÉ ENTOMOLOGIQUE INTÉRESSANTE  
CHÂLONS-SUR-VESLE DANS LA MARNE  
'COL. CARABOIDEA'

par Charles DHEURLE

Située à une dizaine de kilomètres de Reims, Châlons-sur-Vesle est une petite bourgade bien connue des Rémois pour ses "montagnes" de sable dont les versants font la joie des enfants.

Au point de vue géologique, Châlons-sur-Vesle repose sur une assise de type sables thanétiens très riches en éléments fossiles.

La faune des Coléoptères que l'on y rencontre ne manque pas d'intérêt, puisque bon nombre d'espèces ne se capturent que dans ce biotope sableux et parfois bien loin de leur aire classique de répartition.

Je ne cite ici que les espèces les plus intéressantes, toutes capturées dans la maille 716 2476 (Lambert II étendu).

NEBRIIDAE

Nebria salina Fairmaire. - Deux exemplaires sous des pierres en compagnie de Nebria brevicollis.

CICINDELIDAE

Cicindela hybrida Linné. - Très commune dès le mois de mai dans les sentiers sableux.

TRECHIDAE

Peryphus (Periphanes) dalmatinus latinus Netolitzky. - 25 juill. 1981. Commun.

HARPALIDAE

Ophonus (Metophonus) punctatulus Duftschmid. - Dix exemplaires, le 10 août 1981; deux exemplaires, le 15 mai 1983.

Les Harpales cités ci-dessous constituent en fait l'originalité de ces sables thanétiens; on les trouve toujours dès le début du printemps sous les pierres et abris divers, très souvent tapis dans de petites logettes de sable.

Harpalus affinis Schrank. - Très commun.

Harpalus distinguendus Duftschmid. - Assez commun.

Harpalus smaragdinus Duftschmid. - Trois exemplaires, le 15 mai 1983.

Harpalus rubripes Duftschmid. - Commun.

Harpalus atratus Latreille. - Trois exemplaires, le 10 août 1981; deux exemplaires, en avril 1982.

Harpalus luteicornis Duftschmid. - Un exemplaire, le 27 février 1983, en tamisant le sable au pied d'une plante basse.

Harpalus latus Linné. - Deux exemplaires, le 10 août 1981.

Harpalus autumnalis Duftschmid. - Sporadique. Semble plus commun en 1983; deux exemplaires le 9 avril 1983 et le 10 mai 1983.

Harpalus serripes Quensel. - Commun.

Harpalus tardus Panzer. - Commun.

Harpalus anxius Duftschmid. - Commun.

Harpalus servus Duftschmid. - Assez commun, mais très localisé.

Harpalus frolichi Sturm. - Très rare; un exemplaire, le 15 mai 1983.

Harpalus (Actephilus) vernalis Fabricius. - Assez commun, mais très localisé.

#### PTEROSTICHIDAE

Percosia (Celia) complanata fusca Dejean. - Deux exemplaires, le 25 mai 1981.

Percosia (Celia) bifrons Gyllenhal. - Plus commune que la précédente.

Bradytus fulvus De Geer. - Assez rare, 25 mai 1982 et 10 mai 1983. On le trouve en compagnie de Bradytus apricarius et de B. consularis.

#### CONCLUSION

Toutes ces espèces stationnées dans une zone très limitée de la maille kilométrique 716 2476 semblent malheureusement condamnées dans de brefs délais.

En effet, aux assauts intempestifs des amateurs de moto-cross, viennent s'ajouter les décharges sauvages qui jonchent le sol de part en part, et le piétinement des plantes basses par les promeneurs de plus en plus nombreux.

En résumé, pas de pitié pour nos chères bestioles ! Lors d'une récente interview, une Champenoise participant au rallye de l'Atlas dévoilait à un journal local qu'elle s'entraînait régulièrement avec sa Range-Rover (4-4) dans les sables de Châlons-sur-Vesle !

5, allée Yves-Gandon, 51100 Reims

#### DES NOMS LATINS

Les noms de taxa supérieurs à l'espèce : sous-genres, genres ... s'écrivent avec une initiale majuscule, mais les noms d'espèces, sous-espèces, formes, toujours avec une minuscule.

L'indication du sous-genre se place entre les noms de genre et d'espèce et entre parenthèses : Lycaena (Heodes) tityrus.

Le nom d'une sous-espèce se place immédiatement après le nom d'espèce, sans aucun mot ou signe interposé : Mellicta athalia celadussa.

Les signes diacritiques : accents divers, tréma, cédille ... sont prohibés dans les noms latins taxinomiques : Euchloe, huebneri, frolichi.

LÉPIDOPTÈRES "RHOPALOCÈRES" DU DÉPARTEMENT DE LA MARNE  
Données anciennes et première actualisation  
'HESPERIIDAE, PAPILIONIDAE et PIERIDAE'

par Claude LAMBERT

I. INTRODUCTION. - Depuis un siècle, la faune des Lépidoptères de la Marne a été relativement bien étudiée; historiquement, on peut distinguer deux époques :

- la plus ancienne (1875-1914, environ) correspond aux observations de plusieurs naturalistes de la "Société d'Histoire naturelle de Reims" dont BELLEVOYE, DELSUC, DEMAISON, TUNIOT.

- Plus récemment (1925-1955, environ), la nouvelle "Société d'Étude des Sciences naturelles de Reims", animée par Marcel CARUEL et sa "Section entomologique" a ajouté de très nombreuses espèces aux listes antérieures. Grâce à un travail méthodique de récoltes et d'identifications (éventuellement par des spécialistes pour les cas difficiles) cet auteur a pu réaliser un "fichier départemental" qui reste l'ouvrage de référence. Outre les observations de M. CARUEL, on y retrouve celles des collaborateurs suivants : CHARLOT, DENIS, DEUTSCH, GUYOT, MENU, PIERRA et VARLET.




Fig. 1. - Carte des localités citées.

Après la disparition de M. CARUEL, plusieurs entomologistes locaux, ou extérieurs au département, ont continué à effectuer des observations; bien peu en ont publié les résultats (à l'exception de M. G. DENIZE, de Châlons-sur-Marne, qui a écrit plusieurs articles dans diverses revues entomologiques).

Mes observations personnelles portent sur environ 85 sorties sur le terrain, essentiellement entre 1976 et 1982. C'est évidemment trop peu pour prétendre en tirer des conclusions catégoriques, d'autant plus que ces sorties n'ont pas été régulièrement réparties dans l'espace et dans le temps. En particulier, la moitié sud du département a été complètement délaissée, à l'image des observateurs antérieurs, qui habitaient presque tous les environs de Reims. La carte des localités citées (fig. 1) est, à cet égard, éloquent. Compte tenu de ces lacunes, je ne publierai pas encore de cartes de répartition, préférant attendre les additions que devrait susciter ce premier article.

Liste des localités citées  
Coordonnées en LAMBERT II étendu

Avenay .....	725	2453	Fleury-la-Rivière .....	712	2456
Avize .....	722	2442	Florent-en-Argonne ....	791	2463
Barbonne-Fayel .....	700	2407	Fontaine-en-Dormois ...	773	2473
Baslieux-sous-Châtillon	706	2459	Germaine .....	723	2458
Bazancourt .....	733	2486	Grauves .....	719	2442
Beaumont-sur-Vesle ....	735	2465	Hautvillers .....	717	2455
Beine-Nauroy .....	736	2474	Isles-sur-Suippes .....	733	2486
Belval-en-Argonne .....	795	2442	Islettes (Les) .....	793	2460
Belval-sous-Châtillon .	711	2459	Jonchery-sur-Vesle ....	707	2477
Berru .....	732	2476	Louvois .....	729	2457
Bétheniville .....	748	2479	Ludes .....	727	2463
Bezannes .....	720	2470	Mont Aimé .....	721	2430
Boult-sur-Suippe .....	731	2487	Montbré .....	724	2467
Brimont .....	722	2483	Montchenot .....	722	2464
Cernay .....	729	2475	Montmort .....	708	2437
Châlons-sur-Marne .....	748	2442	Moronvilliers .....	745	2473
Châlons-sur-Vesle .....	715	2478	Muizon .....	713	2476
Chambrecy .....	708	2465	Nanteuil-la-Forêt .....	715	2460
Chamery .....	718	2464	= Nanteuil-la-Fosse		
Champillon .....	720	2455	Neuvillette (La) .....	721	2478
Champvoisy .....	695	2459	Nogent-l'Abbesse .....	732	2474
Chaumuzy .....	711	2465	Pierry .....	717	2448
Chavot .....	716	2446	Pompelle (La) .....	730	2470
Chenay .....	716	2479	Pontfaverger .....	744	2479
Chigny-les-Roses .....	725	2463	Prosnes .....	742	2467
Cormicy .....	713	2487	Prouilly .....	710	2479
Courcelles .....	720	2476	Reims .....	72	247
Courcy .....	721	2481	Rilly .....	724	2464
Courtagnon .....	717	2461	Rosnay .....	711	2474
Cuisles .....	705	2460	Sacy .....	717	2467
Écueil .....	717	2466	Saint-Imoges .....	719	2458
Épernay .....	718	2450	Saint-Martin-d'Ablois .	712	2446
Époye .....	738	2478	Saint-Masmes .....	739	2481
Fismes .....	698	2479	Sainte-Menehould .....	787	2457

Sapicourt .....	709 2475	Trigny .....	713 2479
Sarry .....	751 2437	Verzenay .....	732 2463
Sept-Saulx .....	739 2463	Verzy .....	733 2462
Sermiers .....	720 2463	Ville-Dommange .....	716 2468
Sézanne .....	702 2414	Ville-en-Selve .....	727 2459
Sillery .....	731 2467	Villers-aux-Noeuds ....	721 2467
Suippes .....	760 2461	Warmeriville .....	736 2485
Trépail .....	734 2458	Witry-lès-Reims .....	729 2478

II. DONNÉES. - La nomenclature est celle de P. LERAUT (1980).

- L'abréviation "B.S." concerne le Bulletin de la Société d'Étude des Sciences naturelles de Reims.

- Les indications de M. CARUEL sont celles du "fichier départemental" et d'autres notes, non publiées, que m'a cédées sa veuve, à Villers-Allerand. Outre les localités de capture, elles contiennent des observations sur la fréquence, les biotopes et les périodes de vol des espèces citées.

- Mes observations personnelles contiennent les lieux précis de capture (coordonnées et localité la plus proche), la date, et des indications sommaires sur la fréquence et l'habitat.

#### HESPERIIDAE

2888. Carterocephalus palaemon Pallas

CARUEL. - Partout dans les bois feuillus : Berru (B.S., 1929 : 8) - Chenay - Germaine - Saint-Imoges - Courtagnon - Villers-Allerand - Ludes - Rilly (B.S., 1931 : 14).

Époque : IV-V-VI.

LAMBERT :

Verzy (731 2460), 22-V-1973. Quelques ex. - Allées forestières.

- , 6-V-1976. Un exemplaire - Chemin forestier.

Hautvillers (716 2455), 15-V-1976. Quelques ex. - Chemin forestier.

Sept-Saulx (740 2466), 27-V-1976. Un ex. - Friche (sur craie).

Le Cadran 'Germaine' (720 2460), 9-VI-1978. Un ex. - Chemin forest.

- , 21-VI-1978. Un exemplaire - Chemin forestier.

Beaumont-sur-Vesle (734 2466), 8-VI-1979. Plusieurs ex. frottés - Marais.

Belval-sous-Châtillon (713 2459), 13-VI-1980. Quelques ex. - Forêt.

- , 3-VI-1982. Assez commun.

Les Islettes (793 2460), 30-V-1981. Quelques ex. - Forêt d'Argonne.

Belval-en-Argonne (791 2442), 16-V-1982. Un exemplaire - Forêt.

Prouilly (710 2477), 19-V-1982. ♂ et ♀ assez communs - Marais de la Vesle.

Courtagnon (718 2461), 26-V-1982. Quelques ex. - Chemin forestier.

2891. Thymelicus sylvestris Poda

CARUEL. - Courcy et partout.

Époque : VI-VII-VIII.

LAMBERT :

Germaine (722 2457), 27-VII-1978. Très commun - Chemins forestiers.

2892. Thymelicus lineolus Ochsenheimer

CARUEL (PICARD det.). - Localisé : La Neuville - Reims - Villers-Allerand.

Époque : VI-VII-VIII.

2893. Thymelicus acteon Rottemburg

DEMAISON. - Berru.

CARUEL. - Localisé mais très commun dans ses places de vol : Montbré - La Neuville - Sacy - Villers-Allerand.

Époque : VII.

2894. Hesperia comma Linné

DEMAISON. - Berru.

TUNIOT. - Germaine - Rilly.

CARUEL. - Très localisé, et aussi bien dans des endroits secs que des terrains marécageux : Montbré - Sacy - Sapicourt - Sept-Saulx - Trigny (marais) - Villers-Allerand.

Époque : VIII-IX.

LAMBERT :

Sept-Saulx (741 2464), 2-IX-1977. Quelques ex. - Pelouses calcaires.

- , 14-VIII-1978. Quelques ex.; très frais. - Pelouses calcaires.

- , 4-IX-1978. ♂ et ♀ communs, mais frottés.

- , 23-VIII-1979. ♂ et ♀ assez communs et frais.

- , 29-VIII-1979. Plusieurs exemplaires.

- , 4-IX-1982. Plusieurs exemplaires.

2895. Ochlodes venatus Bremer & Grey

CARUEL. - Berru (B.S., 1929 : 8) et partout; très commun.

Époque : V-VI-VII.

LAMBERT :

Sept-Saulx (739 2466), 18-VI-1977. Plusieurs exemplaires - Friches.

- , 4-VII-1977. Idem.

- , 4-VII-1980. Quelques exemplaires - Friches.

Le Cadran 'Germaine' (718 2460), 9-VI-1978. Quelques ♂ - Forêt.

- , 10-VII-1978. Une ♀.

- , 22-VI-1979. Quelques exemplaires.

Germaine (722 2459), 25-VII-1980. Quelques exemplaires - Forêt.

- (721 2458), 9-VI-1982. Une ♀ - Route forestière.

Belval-sous-Châtillon (713 2459), 13-VI-1980. Quelques ex. - Forêt.

Trigny (711 2479), 24-VII-1980. Un exemplaire - Coteau calcaire.

Champillon (720 2456), 9-VI-1982. Quelques exemplaires - Forêt.

Saint-Imoges (719 2459), 11-VI-1982. Commun - Route forestière.

- , 19-VI-1982. Quelques exemplaires - Clairières.

2897. Erynnis tages Linné

CARUEL. - Villers-Allerand et partout.

Époque : IV-V-VI (VII-VIII : rare).

LAMBERT :

Sept-Saulx (740 2466), 28-V-1975. Commun - Pelouses sur craie.

- , 6-V-1976. Commun - Pelouses sur craie.

- , 13-V-1977. Idem.

Sept-Saulx (739 2466), 31-V-1977. Très commun.  
- , 18-VI-1977. Plusieurs exemplaires frottés.  
- , 6-V-1978. Un exemplaire.  
- , 27-V-1978. Très commun.  
- , 2-VI-1978. Très commun.  
- (741 2464), 17-VI-1979. Plusieurs exemplaires frottés.  
Camp de Suippes (76 246), 4-VI-1979. Très commun - Friches sur craie.  
Belval-sous-Châtillon (713 2459), 3-VI-1982. Une ♀ - Clairière humide de forêt.

2898. Carcharodus alceae Esper

TUNIOT. - Germaine - Rilly (B.S., 1878 : 64).

CARUEL. - Terrains secs : Belval-sous-Châtillon - Montbré - La Neuville - Villers-Allerand.

Époque : V-VII-VIII en deux générations.

LAMBERT :

Germaine (724 2457), 1-VI-1979. Un exemplaire - Forêt.

2902. Spialia sertorius Hoffmannsegg

TUNIOT. - Cernay (B.S., 1878 : 64).

CARUEL. - Localisé sur des terrains secs, mais très commun dans ses places de vol : Berru (B.S., 1929 : 8) - Beine - Boulton - La Pomme - Fort de Montbré - Sacy - Villers-Allerand.

Époque : V-VI-VII-VIII en deux générations.

LAMBERT :

Sept-Saulx (741 2464), 31-V-1977. Plusieurs ex. - Pelouses sur craie.

- , 11-VI-1977. Idem.

Camp de Suippes (76 246), 4-VI-1979. Un exemplaire.

2904. Pyrgus malvae Linné

CARUEL. - Villers-Allerand et partout.

Époque : V.

LAMBERT :

Sept-Saulx (741 2464), 31-V-1977. Commun - Pelouses sur craie.

- , 27-V-1978. Un exemplaire.

- , 2-VI-1978. Un exemplaire.

- , 12-V-1979. Quelques exemplaires.

Belval-en-Argonne (791 2442), 16-V-1982. Quelques ex. - Chemins forestiers.

2906. Pyrgus armoricanus Ch. Oberthür

CARUEL (PICARD det.). - Bazancourt - Boulton - Courcy - Courtagnon - Montbré - La Neuville - Sarry.

Époque : V-VIII en deux générations.

2907. Pyrgus alveus Hübner

TUNIOT. - Rilly (B.S., 1878 : 64).

CARUEL. - "Cette espèce, depuis 1878, a été fractionnée en plusieurs autres, et il n'est pas possible de savoir à laquelle ou auxquelles s'appliquent les captures de TUNIOT; le vrai alveus Hb. est une espèce surtout montagnarde : sa présence dans la Marne est possible, mais douteuse."

2910. Pyrgus serratulae Rambur  
CARUEL (PICARD det.). - Bazancourt - Boulton - La Pompelle.  
Époque : VI.

LAMBERT :  
Sept-Saulx (739 2466), 18-VI-1977. Quelques ex. - Pelouses sur craie.

2914. Pyrgus fritillarius Poda  
DELSUC (PICARD det.). - Pierry (deux exemplaires).

#### PAPILIONIDAE

2924. Papilio machaon Linné  
CARUEL. - Villers-Allerand et partout.  
Époque : IV-V et VII-VIII en deux générations.  
(Exceptionnellement trois en 1947 : V, VII, VIII-IX).

LAMBERT :  
Sept-Saulx (739 2466), 6-V-1976. Un ex. - Pelouses sur craie.  
- , 10-VII-1976. Un exemplaire - Pelouses sur craie.  
- , 2-IX-1977. Un exemplaire très frotté.  
- (741 2464), 2-VI-1978. Un exemplaire frotté.  
Le Cadran 'Germaine' (722 2461), 8-V-1976. Un exemplaire - Forêt.  
Prouilly (710 2477), 19-V-1982. Deux ex. - Marais de la Vesle.  
Cernay (730 2475), 19-VII-1982. ♂ et ♀ assez communs - Butte témoin.  
- , 28-VII-1982. Quelques exemplaires.

2928. Iphiclidides podalirius Scopoli  
TUNIOT. - Châlons-sur-Vesle - Germaine - Rilly (B.S., 1876 : 62) -  
Ludes - Avize - Grauves (B.S., 1907 : xlii) - Berru (B.S., 1923 : ix).  
CARUEL. - Partout.  
Époque : IV-V et VII-VIII en deux générations.

LAMBERT :  
Sept-Saulx (739 2466), 30-VII-1976. Un ex. - Pelouses sur craie.  
- (741 2464), 2-VI-1978. Deux exemplaires.  
Camp de Suippes (76 246), 4-VI-1979. Commun - Friches sur craie.  
- (772 2473), 31-V-1981. Deux exemplaires.

#### PIERIDAE

2929. Leptidea sinapis Linné  
CARUEL. - Villers-Allerand et partout.  
Époque : IV-V et VII-VIII en deux générations.

LAMBERT :  
Verzy (732 2462), 18-V-1973. Un exemplaire - Forêt.  
- (731 2459), 27-V-1978. Quelques exemplaires - Forêt.  
Sillery (732 2467), 28-V-1975. Trois ex. - Au bord du canal.  
Sept-Saulx (740 2467), 28-V-1975. Plusieurs ex. - Pelouses sur craie.  
- (739 2466), 20-IV-1976. Commun - Pelouses sur craie.  
- (741 2464), 10-VII-1976. Commun - Pelouses sur craie.  
- , 2-IX-1977. Un exemplaire - Pelouses sur craie.  
- , 6-V-1978. Commun - Pelouses.  
- , 27-V-1978. Commun - Pelouses sur craie.

- Sept-Saulx (741 2464), 2-VI-1978. Commun - Pelouses sur craie.  
- , 25-VII-1978. Quelques ♂ frais.  
- , 14-VIII-1978. ♂ et ♀ communs.  
- , 4-IX-1978. Quelques exemplaires.  
- , 12-V-1979. Quelques ♂.  
- , 23-VIII-1979. Commun - Pelouses sur craie.  
Germaine (721 2460), 13-VIII-1975. Un ex. - Route forestière.  
- (722 2457), 9-VI-1977. Un exemplaire - Forêt.  
- (724 2457), 1-VI-1979. Quelques ♂ et ♀ - Forêt.  
Villers-Allerand (723 2466), 29-IV-1976. Commun - Friche sur craie.  
Beaumont-sur-Vesle (734 2466), 13-V-1979. Quelques ♂ - Marais.  
Camp de Suippes (76 246), 4-VI-1979. Commun - Friches sur craie.  
- (772 2473), 31-V-1981. Un ♂ - Friches sur craie.  
Belval-sous-Châtillon (713 2459), 13-VI-1980. Plusieurs ex. - Forêt.  
- , 3-VI-1982. Quelques exemplaires - Forêt.  
Belval-en-Argonne (791 2442), 16-V-1982. Très commun - Forêt.

2933. Colias hyale Linné

CARUEL. - Villers-Allerand et partout sur les trèfles et les luzernes.  
Époque : V-VI et VIII-IX-X en deux générations au moins.

2934. Colias australis Verity

CARUEL (Avec Colias hyale L.). - "Variété alfacariensis Rep. : partout sur les friches sèches : Courcy - La Pompelle - ... Certains auteurs en font une espèce distincte."

LAMBERT :

- Sept-Saulx (739 2466), 30-VII-1976. Très commun, ♂ surtout - Pelouses sur craie.  
- (741 2464), 31-V-1977. Commun.  
- , 11-VI-1977. Idem.  
- , 18-VI-1977. Idem.  
- , 2-IX-1977. Idem.  
- , 27-V-1978. Quelques ♂.  
- , 2-VI-1978. ♂ communs.  
- , 5-VII-1978. Une ♀.  
- , 25-VII-1978. ♂ communs, souvent frottés.  
- , 14-VIII-1978. ♂ communs - Pelouses.  
- , 4-IX-1978. ♂ souvent frottés et ♀ souvent fraîches.  
- , 23-IX-1978. Plusieurs ♂ et ♀.  
- , 17-VI-1979. Quelques ♂ et ♀.  
- , 18-VI-1979. Idem.  
- , 23-VIII-1979. ♂ et ♀ communs.  
- , 4-VII-1980. Quelques ♂.  
- , 4-IX-1982. Quelques exemplaires.  
Camp de Suippes (76 246), 4-VI-1979. Commun - Friches sur craie.  
- (772 2473), 31-V-1981. ♂ et ♀ communs - Friches sur craie.  
Beine-Nauroy (742 2474), 28-VII-1982. ♂ et ♀ communs - Pelouses sur craie.  
- , 4-IX-1982. Quelques exemplaires.

2935. Colias crocea Geoffroy

CARUEL. - Villers-Allerand et partout.  
Époque : V-VI puis VII-VIII-IX-X-XI en deux générations au moins.

LAMBERT :

Sept-Saulx (742 2465), 4-IX-1978. Trois ♂ frais - Luzernes sur craie.  
- , 23-IX-1978. Idem.

2938. Gonepteryx rhamni Linné

CARUEL. - Villers-Allerand et partout.

Époque : Toute l'année; éclosion en VII-VIII.

LAMBERT :

Reims (72 247), 21-III-1974. Un exemplaire en ville.

- , 6-IV-1975. Un ♂ en ville.

Le Cadran 'Germaine' (721 2460), 23-IV-1975. Commun - Forêt.

- , 29-II-1976. Un ♂ - Forêt.

Verzy (731 2459), 22-V-1975. ♂ communs et frottés - Forêt.

Germaine (722 2459), 13-VIII-1975. Commun - Forêt.

- (722 2457), 6-VII-1976. Commun - Forêt.

- (724 2456), 11-IX-1977. Commun - Forêt.

- (722 2459), 27-VII-1978. ♂ et ♀ frais.

- , 25-VII-1980. Un ♂ - Forêt.

Sept-Saulx (739 2466), 29-II-1976. Un ♂ - Bois.

- , 6-III-1977. Plusieurs exemplaires - Pelouses sur craie.

- (741 2464), 8-IV-1978. Un ♂ - Pelouses sur craie.

- , 2-VI-1978. ♀ frottées.

- , 25-VII-1978. ♂ et ♀ communs et frais.

- , 14-VIII-1978. Quelques ♂ et ♀ - Pelouses.

- , 23-IX-1978. ♂ communs.

- , 14-IV-1979. Quelques ex. dont une ♀ en train de pondre - Pelouses.

- , 12-V-1979. Quelques ♂.

- , 23-VIII-1979. Quelques ♀.

- , 4-IX-1982. Quelques ex. - Pelouses sur craie.

Villers-Allerand (723 2466), 7-III-1977. Plusieurs ex. - Friches sur craie.

Belval-sous-Châtillon (713 2459), 13-VI-1980. Quelques ex. - Forêt.

- , 3-VI-1982. Quelques ♂ très frottés - Forêt.

Belval-en-Argonne (791 2442), 16-V-1982. ♂ et ♀ communs et frottés - Forêt.

Prouilly (710 2477), 19-V-1982. ♂ et ♀ communs et frottés - Marais de la Vesle.

Cernay (730 2475), 19-VII-1982. Quelques ♂ très frais - Bois.

Beine-Nauroy (741 2476), 4-IX-1982. Quelques ex. - Pelouses sur craie.

2939. Aporia crataegi Linné

CARUEL. - Villers-Allerand et partout.

Époque : V-VI.

LAMBERT :

Sept-Saulx (741 2464), 11-VI-1977. Commun - Pelouses sur craie.

- , 18-VI-1977. Assez commun.

- , 4-VII-1977. Plusieurs exemplaires.

- , 5-VII-1978. Commun - Pelouses sur craie.

- , 17-VI-1979. ♂ et ♀ très communs.

- , 18-VI-1979. Idem.

- , 26-VI-1979. Commun (♀ surtout).

Le Cadran 'Germaine' (719 2460), 9-VI-1978. Quelques ex. - Forêt.

2941. Pieris brassicae Linné

CARUEL. - Villers-Allerand et partout, mais peu fréquent ou abondant suivant les années.

Époque : IV-V-VI-VII-VIII en deux générations, parfois une troisième génération en X.

LAMBERT :

Beaumont-sur-Vesle (734 2466), 8-VI-1979. Plusieurs ex. - Marais.

Sept-Saulx (741 2464), 23-VIII-1979. Plusieurs ex. - Pelouses sur craie.

2942. Pieris rapae Linné

CARUEL. - Villers-Allerand et partout.

Époque : IV-V-VI puis VII-VIII en deux générations; parfois une troisième génération en IX-X.

LAMBERT :

Germaine (722 2459), 13-VIII-1975. Commun - Chemin forestier.

Villers-Allerand (723 2466), 29-IV-1976. Commun - Friche sur craie.

Sept-Saulx (741 2464), 2-IX-1977. Commun et frais - Pelouses sur craie.

- , 11-VII-1978. ♂ et ♀ très frais.
- , 25-VII-1978. Commun.
- , 14-VIII-1978. Idem.
- , 4-IX-1978. ♂ et ♀ communs et frais.
- , 23-IX-1978. Commun.
- , 23-VIII-1979. Commun.
- , 4-IX-1982. Quelques exemplaires - Pelouses sur craie.

Belval-en-Argonne (791 2442), 16-V-1982. Commun - Forêt.

Cernay (730 2475), 19-VII-1982. Assez commun - Bois.

Beine-Nauroy (742 2474), 4-IX-1982. Quelques ex. - Pelouses sur craie.

2945. Pieris napi Linné

CARUEL. - Villers-Allerand et partout.

Époque : III-IV-V et VI-VII en deux générations; parfois une troisième génération en IX-X.

LAMBERT :

Germaine (722 2459), 17-V-1975. Quelques exemplaires - Forêt.

- , 13-VIII-1975. Commun - Forêt.
- , 25-VII-1980. Quelques exemplaires - Forêt.

Verzy (732 2458), 22-V-1975. Quelques exemplaires - Forêt.

- (731 2459), 27-V-1978. Quelques exemplaires - Forêt.

Villers-Allerand (723 2466), 29-IV-1976. Commun - Friches sur craie.

Le Cadran 'Germaine' (720 2460), 14-VII-1978. Quelques ex. - Forêt.

Sept-Saulx (741 2464), 14-VIII-1978. Quelques ex. - Pelouses sur craie.

- , 14-IV-1979. Un exemplaire frais.
- , 12-V-1979. Quelques ♂.
- , 23-VIII-1979. Commun - Pelouses sur craie.
- , 4-IX-1982. Quelques exemplaires - Pelouses sur craie.

Beaumont-sur-Vesle (734 2466), 12-V-1979. Quelques ♂ et ♀ - Marais.

- , 13-V-1979. Idem.

Muizon (711 2476), 24-VII-1980. Quelques ex. frais - Marais.  
Trigny (712 2477), 24-VII-1980. Quelques ex. frais - Marais.  
Belval-en-Argonne (791 2442), 16-V-1982. Commun - Forêt.  
Prouilly (711 2477), 19-V-1982. ♂ et ♀ communs - Marais de la Vesle.  
Belval-sous-Châtillon (713 2459), 3-VI-1982. Quelques ex. - Forêt.  
Beine-Nauroy (742 2474), 4-IX-1982. Quelques ex. - Pelouses sur craie.

2946. Pontia daplidice Linné

CARUEL. - Montbré - La Neuville - La Pompelle. Partout sur les terrains secs.

Époque : IV-V; VI-VII; VIII-IX-X en trois générations, parfois quatre. Très commun.

2948. Anthocharis cardamines Linné

CARUEL. Villers-Allerand et partout.

Époque : IV-V-VI.

LAMBERT :

Germaine (722 2459), 17-V-1975. Quelques exemplaires - Forêt.

- (724 2457), 1-VI-1979. Plusieurs ♂ - Forêt.

- (721 2458), 9-VI-1982. Un ♂ - Forêt.

Verzy (732 2458), 22-V-1975. Quelques exemplaires - Forêt.

Sillery (732 2467), 28-V-1975. Un ♂ - Au bord du canal.

Sept-Saulx (740 2467), 20-IV-1976. Un ♂ - Au bord d'un ruisseau.

Beaumont-sur-Vesle (734 2466), 12-V-1979. Plusieurs ♂ - Marais.

- , 13-V-1979. Plusieurs ♂ - Marais.

Camp de Suippes (76 246), 4-VI-1979. Commun - Friches sur craie.

- (772 2473), 31-V-1981. Deux exemplaires - Friche sur craie.

Belval-sous-Châtillon (713 2459), 13-VI-1980. Quelques ex. - Forêt.

Belval-en-Argonne (791 2442), 16-V-1982. ♂ communs - Forêt.

Prouilly (711 2477), 19-V-1982. ♂ et ♀ communs - Marais de la Vesle.

2950. Euchloe ausonia Hübner

SIMON. - Entre Avenay et Bouzy (Bull. de la Soc. entomol. de France, 1845 : xxxi).

BELLEVOYE. - De Cormicy à Bouffignereux (B.S., 1906 : xv).

CARUEL. - Plaines crayeuses des environs de Reims et de Châlons-sur-Marne - Fort de Montbré - Chenay - Écueil.

"Cette espèce est ici presque à sa limite nord : il est curieux qu'elle y soit extrêmement commune alors qu'elle semble très rare ou même inexistante aux environs de Paris."

Époque : Deux générations : IV (parfois fin III) et début VI (parfois fin V).

CHARLOT. - Rosnay - Treslon.

(À suivre)

11, cours Langlet, 51100 Reims

DONNÉES CARTOGRAPHIQUES ET ÉCOLOGIQUES POUR SERVIR  
À L'ÉTUDE DES LÉPIDOPTÈRES HÉTÉROCÈRES DE L'AUBE  
1. NOCTUIDAE (suite) (1)

par Roger MÉTAYE

L'astérisque signale les communes du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient.

Acronictinae

4333. Colocasia coryli Linné (carte 51).

FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 239, pl. 25, fig. 44-45, ♂♂.

En coll. 18 ♂♂, 1 ♀. - AIX-en-Othe, bois des Gros Buissons (707 2358), 240 m, 13 mai 1982, 5 ♂♂ (lum. 1-3). - ARRELLES, forêt de Fiel (745 2342), 230 m, 17 mai 1982, 8 ♂♂ (lum. 1-2). - BAGNEUX-la-Fosse, bois d'Ormont (747 2333), 290 m, 19 juill. 1982, 1 ♀ (lum. 3). - CHAMPIGNOL-lez-Mondeville, bois de Moriémont (770 2351), 290 m, 14 août 1982, 1 ♂ (lum. 3). - la Rothière\*, bois de la Rothière (769 2372), 150 m, 5 juill. 1982, 2 ♂♂ (lum. 3). - VULAINES, bois Char-moy (696 2362), 140 m, 15 juill. 1982, 2 ♂♂ (lum. 3).  
Troyes, forêt de Larivour (JOURDHEUILLE, 1883 : 58).

4341. Acronicta megacephala Denis & Schiffermüller (carte 52).

FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 242, pl. 26, fig. 1, ♀, 2-3, ♂♂.

En coll. 7 ♂♂, 2 ♀♀. - AMANCE\*, forêt d'Orient (757 2366), 180 m, 29 juill. 1978, 1 ♂ (lum.). - CHAUFFOUR-lès-Bailly\*, bois de Bailly (745 2355), 165 m, 20 mai 1982, 2 ♂♂ (lum. 3), 1 ♀ (lum. 2). - DROUPT-Ste-Marie, canal de la Hte Seine (716 2387), 80 m, 14 juin 1982, 1 ♂ (lum. 3). - FERREUX-QUINCEY, Parc de Pont (693 2387), 110 m, 19 août 1982, 1 ♂ (lum. 4). - LAINES-aux-Bois, les Grands Bois (720 2358), 260 m, 26 août 1981, 1 ♀ (lum.). - St-BENOÎT-sur-Seine, le Crot Gauthier (728 2378), 175 m, 24 mai 1982, 1 ♂ (lum. 3). - VILLADIN, bois de Villadin (700 2368), 255 m, 9 août 1982, 1 ♂ (lum. 3).

Tout le département (JOURDHEUILLE, 1883 : 58).

4345. Acronicta psi Linné (carte 53).

FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 245, pl. 26, fig. 11-12, ♂♂.

En coll. 1 ♂. - VILLADIN, bois de Villadin (700 2368), 255 m, 9 août 1982, 1 ♂ (lum. 3).

Tout le département (JOURDHEUILLE, 1883 : 59).

4347. Acronicta leporina Linné (carte 54).

FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 243, pl. 26, fig. 5-6, ♂♂.

En coll. 1 ♀. - VILLACERF, route de Chapelle-Vallon (724 2381), 170 m, 29 juill. 1982, 1 ♀ (lum. 3).

Forêt de Larivour (JOURDHEUILLE, 1883 : 58), Ruvigny (VIETTE, 1946 : 198).

---

1. Cf. Bull. d'Ent. champen., 2 (6), 1983 : 195-208.

4348. Acronicta strigosa Denis & Schiffermüller (carte 55).  
FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 246, pl. 26, fig. 13, ♂.

En coll. 1 ♂. - ESSOYES, bois de Seu (764 2337), 310 m, 17 juin 1982, 1 ♂ (lum. 2).

Lusigny : forêt de Larivour, Troyes (JOURDHEUILLE, 1889 : 134).

4350. Acronicta auricoma Denis & Schiffermüller (carte 56).  
FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 247, pl. 26, fig. 15-16, ♂♂.

En coll. 2 ♂♂. - AIX-en-Othe, bois des Gros Buissons (707 2358), 240 m, 13 mai 1982, 1 ♂ (lum. 1). - BAGNEUX-la-Fosse, bois d'Ormont (747 2333), 290 m, 19 juill. 1982, 1 ♂ (lum. 2).

Lusigny (JOURDHEUILLE, 1883 : 59).

4352. Acronicta rumicis Linné (carte 57).

FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 248, pl. 26, fig. 23-24, ♂♂.

En coll. 1 ♂, 4 ♀♀. - BAGNEUX-la-Fosse, bois d'Ormont (747 2333), 290 m, 19 juill. 1982, 1 ♂ (lum. 1), 2 ♀♀ (lum. 2-3). - VULAINES, bois Charmoy (696 2362), 140 m, 15 juill. 1982, 2 ♀♀ (lum. 2).

Dans tout le département (JOURDHEUILLE, 1883 : 59).

4353. Craniophora ligustri Denis & Schiffermüller (carte 58).

FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 249, pl. 26, fig. 18-20, ♂♂.

En coll. 8 ♂♂, 6 ♀♀. - AVANT-lès-Ramerupt, Champ Carré (745 2384), 110 m, 31 mai 1982, 2 ♀♀ (lum. 1). - BAGNEUX-la-Fosse, bois d'Ormont (747 2333), 290 m, 19 juill. 1982, 1 ♂ (lum. 1). - BLIGNY, forêt de Bossican (767 2355), 250 m, 5 août 1982, 1 ♂ (lum. 2), 1 ♀ (lum. 3). - ERVY-le-Châtel, bois du Parc (716 2338), 140 m, 2 août 1982, 1 ♂ (lum. 1), 2 ♀♀ (lum. 1-2). - FERREUX-QUINCEY, Parc de Pont (693 2387), 110 m, 19 août 1982, 1 ♂ (lum. 3). - JAVERNANT, les Brosses (722 2352), 280 m, 31 août 1981, 1 ♀ (lum.). - TROYES, les Chartreux (729 2365), 115 m, 22 juill. 1982, 1 ♂ (lum. 0). - VILLADIN, bois de Villadin (700 2368), 255 m, 9 août 1982, 2 ♂♂ (lum. 2-3). - VILLECHÉTIF, bois de Belley (734 2368), 110 m, 3 juin 1982, 1 ♂ (lum. 1).

Arcis, Fouchy, Troyes, Villechétif (JOURDHEUILLE, 1883 : 59).

#### Amphipyridae

4369. Amphipyra pyramidea Linné (carte 59).

FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 108, pl. 12, fig. 3, ♂.

En coll. 9 ♂♂, 3 ♀♀. - BLIGNY, forêt de Bossican (767 2355), 250 m, 5 août 1982, 1 ♂ (lum. 2). - CHAMPIGNOL-lez-Mondeville, bois de Moriémont (770 2351), 290 m, 14 août 1982, 2 ♀♀ (lum. 3). - FERREUX-QUINCEY, Parc de Pont (693 2387), 110 m, 19 août 1982, 4 ♂♂ (lum. 3-4). - JAVERNANT, les Brosses (722 2352), 280 m, 31 août 1981, 1 ♂ (lum.). - LAINES-aux-Bois, les Grands Bois (720 2358), 260 m, 26 août 1981, 2 ♂♂ (lum.). - RUMILLY-lès-Vaudes, forêt de Rumilly (739 2345), 160 m, 7 sept. 1981, 1 ♂ (lum.). - VILLACERF, route de Chapelle-Vallon (724 2381), 170 m, 29 juill. 1982, 1 ♀ (lum. 1).

Lusigny, Ramerupt, Ricey (JOURDHEUILLE, 1883 : 77).

4371. Amphipyra perflua Fabricius (carte 60).

FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 108, pl. 12, fig. 7, ♂.

En coll. 2 ♂♂. - BAGNEUX-la-Fosse, bois d'Ormont (747 2333), 290 m, 19 juill. 1982, 1 ♂ (lum. 2). - DIENVILLE\*, forêt d'Orient (758 2371), 160 m, 8 juill. 1982, 1 ♂ (lum. 2).

Espèce nouvelle pour l'Aube.

4373. Amphipyra tragopoginis Clerck (carte 61).

FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 109, pl. 12, fig. 6, ♀.

En coll. 1 ♂. - ARCONVILLE, bois de la Vigne (780 2351), 220 m, 13 sept. 1982, 1 ♂ (lum. 2).

Les Riceys, Lusigny, environ de Troyes (JOURDHEUILLE, 1883 : 76).

4385. Euplexia lucipara Linné (carte 62).

FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 113, pl. 12, fig. 14, ♂.

En coll. 1 ♂. - DIENVILLE\*, forêt d'Orient (758 2371), 160 m, 8 juill. 1982, 1 ♂ (lum. 2).

Bar-sur-Seine, Ervy, Lusigny (JOURDHEUILLE, 1883 : 72).

4386. Phlogophora meticulosa Linné (carte 63).

FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 114, pl. 12, fig. 16, ♀.

En coll. 2 ♂♂, 11 ♀♀. - AUXON, bois de Cosdon (719 2343), 135 m, 10 sept. 1979, 1 ♀ (au repos). - CHARMONT-sous-Barbuise, Château (735 2380), 130 m, 4 sept. 1981, 2 ♀♀ (lum.). - CHAUFFOUR-lès-Bailly\*, bois de Bailly (745 2354), 165 m, 10 sept. 1981, 1 ♀ (lum.). - LUSIGNY-sur-Barse\*, Bas Bois (742 2367), 115 m, 14 sept. 1981, 1 ♀ (lum. 1). - MACEY, bois du Suchet (716 2366), 235 m, 21 sept. 1981, obs. (lum. 1). - ROUILLY-SACEY\*, bois du Chardonneret (745 2373), 115 m, 17 sept. 1981, obs. (lum. 1). - RUMILLY-lès-Vaudes, forêt de Rumilly (739 2345), 160 m, 7 sept. 1981, obs. (lum. 1). - St-BENOÎT-sur-Seine, le Crot Gauthier (728 2378), 175 m, 24 mai 1982, 1 ♀ (lum. 3). - TROYES, les Chartreux (729 2365), 115 m, 18 oct. 1980, 1 ♀ (au repos); 5 sept. 1981, 1 ♀ (lum.). - VALLANT-St-Georges, canal de la Hte Seine (716 2387), 85 m, 28 sept. 1981, 1 ♂ (lum. 2). - VILLECHÉTIF, bois de Belley (734 2368), 110 m, 28 août 1981, 1 ♂ (lum.), 3 ♀♀ (lum.). - VILLELOUP, la Gaudine (714 2371), 210 m, 7 juin 1982, obs. (lum. 2-3).

Dans tout le département (JOURDHEUILLE, 1883 : 72).

4392. Ipimorpha retusa Linné (carte 64).

FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 117, pl. 12, fig. 22, ♂.

En coll. 1 ♂. - VILLADIN, bois de Villadin (700 2368), 255 m, 9 août 1982, 1 ♂ (lum. 1).

Ervy, Lusigny, Riceys (JOURDHEUILLE, 1883 : 79).

4397. Cosmia affinis Linné (carte 65).

FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 120, pl. 13, fig. 18-20, ♂♂.

En coll. 1 ♀. - FRALIGNES, route de Magnant (752 2353), 225 m, 9 sept. 1982, 1 ♀ (lum. 2).

Lusigny (JOURDHEUILLE, 1883 : 79).

4399. Cosmia trapezina Linné (carte 66).

FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 121, pl. 13, fig. 9-11, 13, 15, ♂♂, 12, 14, ♀♀.

En coll. 3 ♂♂, 6 ♀♀. - BLIGNY, forêt de Bossican (767 2355), 250 m, 5 août 1982, 1 ♂ (lum. 1). - CHESLEY, les Fariets (736 2332), 240 m, 12 juill. 1982, 1 ♂ (lum. 2). - ERVY-le-Châtel, bois du Parc (716 2338), 140 m, 2 août 1982, 1 ♀ (lum. 3). - FERREUX-QUINCEY, Parc de Pont (693 2387), 110 m, 19 août 1982, 1 ♀ (lum. 3). - JAVERNANT, les Brosses (722 2352), 280 m, 31 août 1981, 2 ♀♀ (lum.). - LAINES-aux-Bois, les Grands Bois (720 2358), 260 m, 26 août 1981, 2 ♀♀ (lum.). - St-ANDRÉ-les-Vergers, les Gayettes (728 2366), 105 m, 1er juill. 1982, 1 ♂ (lum.).

Dans tous les bois (JOURDHEUILLE, 1883 : 79).

4400. Cosmia pyralina Denis & Schiffermüller (carte 67).

FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 121, pl. 13, fig. 16, ♂.

En coll. 1 ♂. - VULAINES, bois Charmoy (696 2362), 140 m, 15 juill. 1982, 1 ♂ (lum. 2).

Espèce nouvelle pour l'Aube.

4403. Actinotia polyodon Clerck (carte 68).

FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 123, pl. 15, fig. 3, ♀.

En coll. 1 ♀. - AVANT-lès-Ramerupt, Champ Carré (745 2384), 110 m, 31 mai 1982, 1 ♀ (lum. 2).

Ervy, Lusigny, les Riceys (JOURDHEUILLE, 1883 : 72).

4406. Apamea monoglypha Hufbagel (carte 69).

FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 124, pl. 13, fig. 24-27, ♂♂.

En coll. 3 ♂♂. - ARCONVILLE, bois de la Vigne (780 2351), 220 m, 13 sept. 1982, 2 ♂♂ (lum. 3). - BAGNEUX-la-Fosse, bois d'Ormont (747 2333), 290 m, 19 juill. 1982, 1 ♂ (lum. 1).

Les Riceys (JOURDHEUILLE, 1883 : 70).

4411. Apamea epomidion Haworth (carte 70).

FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 126 (charactera), pl. 13, fig. 33, ♂.

En coll. 1 ♀. - ESSOYES, bois de Seu (764 2337), 310 m, 17 juin 1982, 1 ♀ (lum. 3).

Fouchy (JOURDHEUILLE, 1883 : 71 (hepatica)).

4429. Oligia strigilis Linné (carte 71).

FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 132, pl. 15, fig. 6, 8, ♂♂, 7, ♀.

En coll. 1 ♂. - BAGNEUX-la-Fosse, bois d'Ormont (747 2333), 290 m, 19 juill. 1982, obs. (lum. 1). - ESSOYES, bois de Seu (764 2337), 310 m, 17 juin 1982, 1 ♂ (lum. 2).

Lusigny, les Riceys, environs de Troyes (JOURDHEUILLE, 1883 : 71).

4431. Oligia latruncula Denis & Schiffermüller (carte 72).

FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 134, pl. 15, fig. 12, 13, ♂♂, 14, ♀.

En coll. 1 ♂. - AMANCE\*, forêt du Temple (755 2367), 155 m, 11 juin 1979, 1 ♂ (de jour).

Lusigny, les Riceys, environs de Troyes (JOURDHEUILLE, 1883 : 71).

4433. Mesoligia furuncula Denis & Schiffermüller (carte 73).

FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 134, pl. 15, fig. 18-21, ♂♂.

En coll. 2 ♂♂, 1 ♀. - FERREUX-QUINCEY, Parc de Pont (693 2387), 110 m, 19 août 1982, 1 ♂ (lum. 4). - TROYES, les Chartreux (729 2365), 115 m, 22 août 1981, 1 ♂ (lum.). - VILLACERF, route de Chapelle-Vallon (724 2381), 170 m, 29 juill. 1982, 1 ♀ (lum. 1).

Lusigny (JOURDHEUILLE, 1883 : 71).

4435. Mesapamea secalis Linné (carte 74).

FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 135, pl. 15, fig. 25-26, ♀♀, 27-29, ♂♂.

En coll. 2 ♀♀. - CHESLEY, les Fariets (736 2332), 240 m, 12 juill. 1982, 1 ♀ (lum. 2). - ERVY-le-Châtel, bois du Parc (716 2338), 140 m, 2 août 1982, 1 ♀ (lum. 1).

Lusigny, les Riceys (JOURDHEUILLE, 1883 : 71 (didyma)).

4443. Photedes pygmina Haworth (carte 75).

FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 138, pl. 15, fig. 36-37, ♂♂.

En coll. 1 ♂. - RUMILLY-lès-Vaudes, forêt de Rumilly (739 2345), 160 m, 7 sept. 1981, 1 ♂ (lum.).

Espèce nouvelle pour l'Aube.

4445. Eremobia ochroleuca Denis & Schiffermüller (carte 76).

FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 139, pl. 15, fig. 40, ♀.

En coll. 3 ♀♀. - PRUGNY, Haut des Forges (720 2363), 210 m, 15 août 1980, 1 ♀ (de jour). - St-MARDS-en-Othe, la Vente St Martin (710 2353), 215 m, 18 août 1980, 1 ♀ (de jour). - VILLACERF, route de Chapelle-Vallon (724 2381), 170 m, 29 juill. 1982, 1 ♀ (lum. 3).

Les Grandes-Chapelles (JOURDHEUILLE, 1883 : 70).

4456. Hydraecia micacea Esper (carte 77).

FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 145, pl. 16, fig. 25, ♂.

En coll. 1 ♂. - ALLIBAUDIÈRES, le Moulin (730 2398), 95 m, 14 oct. 1982, 1 ♂ (lum. 5).

Ervy (JOURDHEUILLE, 1883 : 73); Ruvigny (VIETTE, 1946 : 198).

4459. Gortyna flavago Denis & Schiffermüller (carte 78).

FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 146, pl. 16, fig. 24, ♂.

En coll. 1 ♂, 1 ♀. - AUXON, Chamblin (720 2341), 120 m, 5 oct. 1981, 1 ♂ (lum. 4). - VALLANT-St-Georges, canal de la Hte Seine (716 2387), 85 m, 28 sept. 1981, 1 ♀ (lum. 4).

Bar-sur-Seine, les Riceys, Verrières (JOURDHEUILLE, 1883 : 73).

4472. Rhizedra lutosa Hübner (carte 79).

FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 153, pl. 17, fig. 13, ♂.

En coll. 1 ♀. - ROUILLY-SACEY\*, bois du Chardonneret (745 2373), 115 m, 17 sept. 1981, 1 ♀ (lum.).  
Espèce nouvelle pour l'Aube.

4481. Hoplodrina alsines Brahm (carte 80).

FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 156, pl. 17, fig. 21, ♂.

En coll. 12 ♂♂, 6 ♀♀. - CORMOST, forêt d'Aumont (732 2350), 140 m, 25 mars 1982, 4 ♂♂ (lum. 2). - LAINES-aux-Bois, les Grands Bois (720 2358), 265 m, 15 mars 1982, 8 ♂♂ (lum. 2-3). - LUSIGNY-sur-Barse\*, Bas Bois (742 2367), 115 m, 1er avr. 1982, 4 ♀♀ (lum. 2-3). - la ROTHIERE\*, bois de la Rothière (769 2372), 150 m, 5 juill. 1982, 1 ♀ (lum. 1). - VAUCHASSIS, la Réserve de Vauchassis (716 2359), 240 m, 5 avr. 1982, 1 ♀ (lum. 4).

Lusigny, Ricey (JOURDHEUILLE, 1883 : 76).

4486. Hoplodrina ambigua Denis & Schiffermüller (carte 81).

FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 157, pl. 17, fig. 23, ♂.

En coll. 3 ♂♂, 7 ♀♀. - CHARMONT-sous-Barbuise, Château (735 2380), 130 m, 4 sept. 1981, 1 ♂ (lum.), 1 ♀ (lum.). - LAINES-aux-Bois, les Grands Bois (720 2358), 260 m, 26 août 1981, 1 ♂ (lum.), 2 ♀♀ (lum.). - MACEY, bois du Suchet (716 2366), 235 m, 21 sept. 1981, 1 ♀ (lum.). - TROYES, les Chartreux (729 2365), 115 m, 22 août 1981, 2 ♀♀ (lum.); 23 août 1981, 1 ♂ (lum.). - VILLELOUP, la Gaudine (714 2371), 185 m, 24 sept. 1981, 1 ♀ (lum.).

Ervy, Lusigny, Troyes (JOURDHEUILLE, 1883 : 76).

4520. Panemeria tenebrata Scopoli (carte 82).

FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 230, pl. 25, fig. 6, ♀.

En coll. 1 ♂, 2 ♀♀. - BUCEY-en-Othe, bois de Bucey (713 2362), 225 m, 2 juin 1980, 1 ♂ (de jour). - St-POUANGE, la Coloterie (727 2360), 120 m, 16 mai 1980, 1 ♀ (de jour). - VENDEUVRE-sur-Barse\*, forêt d'Orient (757 2366), 175 m, 26 mai 1980, 1 ♀ (de jour).

Forêt de Larivour, d'Aumont, de Bailly ... (JOURDHEUILLE, 1883 : 87).

#### Heliothinae

4531. Axylia putris Linné (carte 83).

FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 231, pl. 25, fig. 16, ♂.

En coll. 6 ♂♂. - AVANT-lès-Ramerupt, Champ Carré (745 2384), 110 m, 31 mai 1982, 1 ♂ (lum. 2). - FERREUX-QUINCEY, Parc de Pont (693 2387), 110 m, 19 août 1982, 2 ♂♂ (lum. 4). - TROYES, les Chartreux (729 2365), 115 m, 22 août 1981, 2 ♂♂ (lum.); 30 mai 1982, 1 ♂ (lum. 2).

Lusigny, environs de Troyes (JOURDHEUILLE, 1883 : 63); Brienne-le-Château (VIETTE, 1946 : 197).

#### Acontiinae

4551. Lithacodia pygarga Hufnagel (carte 84).

FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 254, pl. 27, fig. 2, ♂.

En coll. 6 ♂♂, 7 ♀♀. - CHARMONT-sous-Barbuise, Champ de Tir (734 2376), 195 m, 21 juin 1982, 1 ♀ (lum. 2). - DROUPT-Ste-Marie, canal de la Hte Seine (716 2387), 80 m, 14 juin 1982, 2 ♂♂ (lum. 2-3). - ESSOYES, bois de Seu (764 2337), 310 m, 17 juin 1982, 3 ♀♀ (lum. 1-2). - MAGNY-FOUCHARD\*, bois de Magny-Fouchard (762 2362), 210 m, 28 juin 1982, 1 ♂ (lum. 2), 1 ♀ (lum. 1). - SOULIGNY, Montaigu (721 2357), 180 m, 1er juill. 1982, 2 ♀♀ (lum. 1 et 3). - VENDEUVRE-sur-Barse\*, Maison de Chasse des 106 (756 2366), 175 m, 27 mai 1982, 2 ♂♂ (lum. 1-2). - VULAINES, bois Charmoy (696 2362), 140 m, 15 juill. 1982, 1 ♂ (lum. 2).

Dans tout le département (JOURDHEUILLE, 1883 : 89).

4552. Lithacodia deceptor Scopoli (carte 85).

FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 254, pl. 27, fig. 1, ♂.

En coll. 1 ♂, 1 ♀. - ESSOYES, bois de Seu (764 2337), 310 m, 17 juin 1982, 1 ♀ (lum. 1). - VILLELOUP, la Gaudine (714 2371), 210 m, 7 juin 1982, 1 ♂ (lum. 1).

Bars-sur-Seine, Clairvaux, Ricey (JOURDHEUILLE, 1883 : 88).

4557. Emmelia trabealis Scopoli (carte 86).

FORSTER-WOHLFAHRT, IV, 1980 : 256, pl. 27, fig. 6, ♂.


En coll. 1 ♂. - CHESLEY, les Fariets (736 2332), 240 m, 12 juill. 1982, 1 ♂ (lum. 2).

Ervy, Lusigny, environs de Troyes (JOURDHEUILLE, 1883 : 89).

CARTES DE RÉPARTITION

Grille LAMBERT II étendu - \*5 km

Abréviations : Form. = Formation      pér. = période  
 Alt. = Altitude      ind. = indéterminée  
 Act. = Activité




51. Colocasia coryli

Form. : eIV, ø, c1, j6, j5

Alt. : 140-290 m

Act. : nocturne (pér. 1-3)

F, M, A, M, J, J, A, S, O, N,




52. Acronicta megacephala

Form. : a2, a11, ø, c8, c7


Alt. : 80-260 m

Act. : nocturne (pér. 2-4)

F, M, A, M, J, J, A, S, O, N,







59. Amphipyra pyramidea


Form. :  $\varnothing$ , c8, c7, cIII, j5

Alt. : 110-290 m

Act. : nocturne (pér. 1-4)

F, M, A, M, J, J, A, S, O, N,

●●●●●



60. Amphipyra perflua


Form. : a11, j5

Alt. : 160-290 m

Act. : nocturne (pér. 2)

F, M, A, M, J, J, A, S, O, N,

●●



61. Amphipyra tragopoginis


Form. : j3

Alt. : 220 m

Act. : nocturne (pér. 2)

F, M, A, M, J, J, A, S, O, N,

●



62. Euplexia lucipara


Form. : a11

Alt. : 160 m

Act. : nocturne (pér. 2)

F, M, A, M, J, J, A, S, O, N,

●



63. Phlogophora meticulosa


Form. : A, a2, a1, a11,  $\varnothing$ , c7,

Alt. : 85-235 m c3, cIII

Act. : nocturne (pér. 1-3)

F, M, A, M, J, J, A, S, O, N,

● ●●●● ●



64. Ipimorpha retusa


Form. : c8

Alt. : 255 m

Act. : nocturne (pér. 1)

F, M, A, M, J, J, A, S, O, N,

●




65. Cosmia affinis

Form. : cII

Alt. : 225 m

Act. : nocturne (pér. 2)

F, M, A, M, J, J, A, S, O, N,




66. Cosmia trapezina

Form. : A, p, e, c8, j6, j5

Alt. : 105-280 m

Act. : nocturne (pér. 1-3)

F, M, A, M, J, J, A, S, O, N,




67. Cosmia pyralina

Form. : e

Alt. : 140 m

Act. : nocturne (pér. 2)

F, M, A, M, J, J, A, S, O, N,




68. Actinotia polyodon

Form. : a1

Alt. : 110 m

Act. : nocturne (pér. 2)

F, M, A, M, J, J, A, S, O, N,




69. Apamea monoglypha

Form. : j5, j3

Alt. : 220-290 m

Act. : nocturne (pér. 1 et 3)

F, M, A, M, J, J, A, S, O, N,



70. Apamea epomidion


Form. : j4

Alt. : 310 m

Act. : nocturne (pér. 3)

F, M, A, M, J, J, A, S, O, N,






71. Oligia strigilis

Form. : j5, j4

Alt. : 290-310 m

Act. : nocturne (pér. 1-2)

F, M, A, M, J, J, A, S, O, N,




72. Oligia latruncula

Form. : a11

Alt. : 155 m

Act. : diurne ?

F, M, A, M, J, J, A, S, O, N,




73. Mesoligia furuncula

Form. : A, c8, c7

Alt. : 110-170 m

Act. : nocturne (pér. 1 et 4)

F, M, A, M, J, J, A, S, O, N,




74. Mesapamea secalis

Form. : p, j6

Alt. : 140-240 m

Act. : nocturne (pér. 1-2)

F, M, A, M, J, J, A, S, O, N,




75. Photedes pygmina

Form. : cIII

Alt. : 160 m

Act. : nocturne (pér. ind.)

F, M, A, M, J, J, A, S, O, N,



76. Eremobia ochroleuca


Form. : A, c7, c6

Alt. : 170-215 m

Act. : diurne et noct. (pér. 3)

F, M, A, M, J, J, A, S, O, N,






77. Hydraecia micacea

Form. : a1

Alt. : 95 m

Act. : nocturne (pér. 5)

, F, M, A, M, J, J, A, S, O, N,




78. Gortyna flavago

Form. : a2

Alt. : 85-120 m

Act. : nocturne (pér. 4)

, F, M, A, M, J, J, A, S, O, N,




79. Rhizedra lutosa

Form. : c3

Alt. : 115 m

Act. : nocturne (pér. ind.)

, F, M, A, M, J, J, A, S, O, N,




80. Hoplodrina alsines

Form. : a11, d, c1

Alt. : 115-265 m

Act. : nocturne (pér. 1-4)

, F, M, A, M, J, J, A, S, O, N,




81. Hoplodrina ambigua

Form. : A, a1, d, c7

Alt. : 115-260 m

Act. : nocturne (pér. ind.)

, F, M, A, M, J, J, A, S, O, N,




82. Panemeria tenebrata

Form. : A, a2, a11

Alt. : 120-225 m

Act. : diurne

, F, M, A, M, J, J, A, S, O, N,




83. Axylia putris

Form. : A, a1, c8

Alt. : 110-115 m

Act. : nocturne (pér. 2 et 4)

F, M, A, M, J, J, A, S, O, N,




84. Lithacodia pygarga

Form. : a2, a11, e, c6, cIV, j4

Alt. : 80-310 m

Act. : nocturne (pér. 1-3)

F, M, A, M, J, J, A, S, O, N,




85. Lithacodia deceptoria

Form. : c7, j4

Alt. : 210-310 m

Act. : nocturne (pér. 1)

F, M, A, M, J, J, A, S, O, N,



86. Emmelia trabealis

Form. : j6

Alt. : 240 m

Act. : nocturne (pér. 2)

F, M, A, M, J, J, A, S, O, N,



INDEX DES LOCALITÉS CITÉES

Communes	Lambert II étendu	UTM	Topog. fille	Géo. fille	Form. géol.
Aix-en-Othe .....	707 2358	EP54	2718	82	eIV
Allibaudières .....	730 2398	EP88	2816	67	a1a
Amance* .....	755 2367	FP04	2917	82	a11
- .....	757 2366	FP04	2917	82	a11
Arconville .....	780 2351	FP33	3018	83	j3b
Arrelles .....	745 2342	EP92	2818	82	j6
Auxon .....	719 2343	EP72	2718	82	a11
- .....	720 2341	EP72	2718	82	a2
Avant-lès-Ramerupt .....	745 2384	EP96	2816	67	a1a
Bagneux-la-Fosse .....	747 2333	EP91	2819	97	j5
Bligny .....	767 2355	FP13	2918	83	j5b
Bucey-en-Othe .....	713 2362	EP64	2717	82	A

Communes	Lambert II étendu	UTM	Topog. file	Géo. file	Form. géol.
Champignol-lez-Mondeville ..	770 2351	FP23	2918	83	j5b
Charmont-sous-Barbuise .....	734 2376	EP85	2817	82	c6
-	735 2380	EP86	2817	67	a1a
Chauffour-lès-Bailly* .....	745 2354	EP93	2818	82	a11
-	745 2355	EP93	2818	82	a11
Chesley .....	736 2332	EP81	2819	97	j6
Cormost .....	732 2350	EP83	2818	82	a11
Dienville* .....	758 2371	FP05	2917	82	a11
Droupt-Ste-Marie .....	716 2387	EP67	2716	67	a2
Ervy-le-Châtel .....	716 2338	EP62	2719	97	p
Essoyes .....	764 2337	FP12	2919	98	j4
Ferreux-Quincey .....	693 2387	EP46	2716	66	c8b
Fralignes .....	752 2353	FP03	2918	82	cII
Javernant .....	722 2352	EP73	2818	82	é
Laines-aux-Bois .....	720 2358	EP74	2818	82	é
Lusigny-sur-Barse* .....	742 2367	EP94	2817	82	a11
Macey .....	716 2366	EP64	2717	82	é
Magny-Fouchard* .....	762 2362	FP14	2917	83	cIV
Prugny .....	720 2363	EP74	2717	82	c6
Rothièrre (la)* .....	769 2372	FP25	2917	83	c1a
Rouilly-Sacey* .....	745 2373	EP95	2817	82	c3
Rumilly-lès-Vaudes .....	739 2345	EP82	2818	82	cIII
St-André-les-Vergers .....	728 2366	EP74	2817	82	A
St-Benoît-sur-Seine .....	728 2378	EP76	2817	82	c7
St-Mards-en-Othe .....	710 2353	EP63	2718	82	A
St-Pouange .....	727 2360	EP74	2818	82	a2
Souigny .....	721 2357	EP74	2818	82	c6
Troyes .....	729 2365	EP84	2817	82	A
Vallant-St-Georges .....	716 2387	EP67	2716	67	a2
Vauchassis .....	716 2359	EP64	2718	82	é
Vendeuvre-sur-Barse* .....	756 2366	FP04	2917	82	a11
-	757 2366	FP04	2917	82	a11
Villacérf .....	724 2381	EP76	2816	67	c7
Villadin .....	700 2368	EP55	2717	82	c8
Villechétif .....	734 2368	EP85	2817	82	c3
Villeloup .....	714 2371	EP65	2717	82	c7
Vulaines .....	696 2362	EP44	2717	82	é

\*Commune du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient.

(À suivre)

307, rue du Fbg-Croncels, 10000 Troyes

ANNULATION

Bulletin d'Entomologie champenoise, 2 (6), 1983 : 195-208.

Le texte se rapportant à Mamestra persicariae (p. 195) et la carte 19 (p. 202) avec sa légende, ainsi que la fig. 19 (pl. 12) sont à annuler.




Fig. 51 à 68. Noctuidae Acronictinae et Amphipyrinae. - 51, *Colocasia coryli*, ♂. - 52, *Acronicta megacephala*, ♂. - 53, *A. psi*, ♂. - 54, *A. leporina*, ♀. - 55, *A. strigosa*, ♂. - 56, *A. auricoma*, ♂. - 57, *A. rumicis*, ♀. - 58, *Craniophora ligustri*, ♀. - 59, *Amphipyra pyramidea*, ♀. - 60, *A. perflua*, ♂. - 61, *A. tragopoginis*, ♂. - 62, *Euplexia lucipara*, ♂. - 63, *Phlogophora meticulosa*, ♀. - 64, *Ipiomorpha retusa*, ♂. - 65, *Cosmia affinis*, ♀. - 66, *C. trapezina*, ♂. - 67, *C. pyralina*, ♂. - 68, *Actinotia polyodon*, ♀. - Tous coll. R. Métaye.

R. MÉTAYE phot.




Fig. 69 à 86. Noctuidae Amphipyrinae, Heliothinae et Acontiinae. - 69, *Apamea monoglypha*, ♂. - 70, *A. epomidion*, ♀. - 71, *Oligia strigilis*, ♂. - 72, *O. latruncula*, ♂. - 73, *Mesoligia furuncula*, ♀. - 74, *Mesapamea secalis*, ♀. - 75, *Photedes pygmina*, ♂. - 76, *Eremobia ochroleuca*, ♀. - 77, *Hydraecia micacea*, ♂. - 78, *Gortyna flavago*, ♂. - 79, *Rhizedra lutosa*, ♀. - 80, *Hoplodrina alsines*, ♂. - 81, *H. ambigua*, ♀. - 82, *Panemeria tenebrata*, ♀. - 83, *Axylia putris*, ♂. - 84, *Lithacodia pygarga*, ♂. - 85, *L. deceptor*, ♀. - 86, *Emmelia trabealis*, ♂. - Tous coll. R. Métaye.

R. MÉTAYE phot.

LISTE PRÉLIMINAIRE DES LYMANTRIIDAE DE L'AUBE  
'LEP. NOCTUOIDEA'  
par Roger MÉTAYE

Dans son catalogue, JOURDHEUILLE (1883 : 47-48) a cité en tout 10 espèces de Lymantriidae. Aucune autre mention n'a été faite dans son Supplément (1889) ni par ailleurs après cette date, du moins à ma connaissance. Ce total de 10 espèces est donc resté inchangé depuis 1883. Cela représente 62,5 % de la faune française, ce qui permet de dire que les Lymantriidae sont assez bien représentés dans le département de l'Aube.

Toutes ces espèces sont citées dans HERBULOT (1971) et, pour neuf d'entre elles, une figure en est donnée (pl. XI). L'espèce qui manque (Lymantria dispar) figurait sur la couverture de la première édition, alors que dans l'édition actuelle (1971) de ce tome consacré aux Hétérocères, elle a fait place à un groupe de Lycènes !

Les espèces sont énumérées ci-après suivant l'ordre systématique adopté par LERAUT (1980), chacune d'elles étant précédée du numéro d'ordre donné par cet auteur.

Les références se rapportent aux catalogues suivants :

- Catalogue Jourdheuille (1883) et son Supplément (1889);
- Catalogue Lhomme, vol. I (1923-1935).

L'iconographie ne se rapporte qu'à un seul guide :

- Atlas des Lépidoptères de France, vol. II, par C. HERBULOT (1971).

Remarque. - Les numéros d'espèces figurant dans le Catalogue Jourdheuille correspondent à ceux du Catalogue Staudinger (1871).

LYMANTRIIDAE

- 3855 Orgyia recens Hübner. - Jourdheuille, p. 47, n° 878 (gonostigma). - Lhomme, p. 347, n° 923 (gonostigma). - Herbulot, II, p. 91 (gonostigma), pl. XI, fig. 312, ♂, ♀.
- 3856 Orgyia antiqua Linnaeus. - Jourdheuille, p. 47, n° 879. - Lhomme, p. 348, n° 924. - Herbulot, II, p. 92, pl. XI, fig. 313, ♂, ♀.
- 3862 Dicallomera fascelina Linnaeus. - Jourdheuille, p. 47, n° 890. - Lhomme, p. 345, n° 920. - Herbulot, II, p. 91, pl. XI, fig. 310, ♂.
- 3863 Elkneria pudibunda Linnaeus. - Jourdheuille, p. 47, n° 892. - Lhomme, p. 346, n° 921. - Herbulot, II, p. 91, pl. XI, fig. 311, ♂.
- 3864 Euproctis chrysorrhoea Linnaeus. - Jourdheuille, p. 48, n° 899. - Lhomme, p. 351, n° 935 (phaeorrhoea). - Herbulot, II, p. 94 (phaeorrhoea), pl. XI, fig. 320, ♂.
- 3865 Euproctis similis Fuessly. - Jourdheuille, p. 48, n° 900. - Lhomme, p. 350, n° 934. - Herbulot, II, p. 94 (chrysorrhoea), pl. XI, fig. 319, ♂.

- 3866 Leucoma salicis Linnaeus. - Jourdheuille, p. 47, n° 895. - Lhomme, p. 349, n° 929. - Herbulot, II, p. 92, pl. XI, fig. 316, ♂.
- 3867 Arctornis l-nigrum O.F. Müller. - Jourdheuille, p. 47, n° 894. - Lhomme, p. 349, n° 928. - Herbulot, II, p. 92, pl. XI, fig. 315, ♂.
- 3868 Lymantria monacha Linnaeus. - Jourdheuille, p. 48, n° 901. - Lhomme, p. 349, n° 931. - Herbulot, II, p. 93, pl. XI, fig. 317, ♂.
- 3870 Lymantria dispar Linnaeus. - Jourdheuille, p. 48, n° 902. - Lhomme, p. 349, n° 930. - Herbulot, II, p. 93.

#### RÉFÉRENCES

- HERBULOT (C.), 1971. - Atlas des Lépidoptères de France. Vol. II. Hétérocères (4e édition). - Boubée, Paris.
- JOURDHEUILLE (C.), 1883. - Catalogue des Lépidoptères du département de l'Aube. - Mém. de la Soc. acad. de l'Aube, 47, 1883 : 1-229.
- LERAUT (P.), 1980. - Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse. - Alexanor et Société entomologique de France, Paris.
- LHOMME (L.), 1923-1935. - Catalogue des Lépidoptères de France et de Belgique. Vol. I, Macrolépidoptères. - Lhomme, Douelle.
- STAUDINGER (O.) & WOCKE (M.), 1871. - Catalogue ou énumération méthodique des Lépidoptères qui habitent le territoire de la faune européenne. - Dresde.

#### INDEX DES NOMS CITÉS

Les nombres correspondent aux numéros de la Liste Leraut.

antiqua 3856	Euproctis 3864	monacha 3868
Arctornis 3867	fascelina 3862	Orgyia 3855
chrysorrhaea 3865	gonostigma 3855	phaeorrhaea 3864
chrysorrhoea 3864		pudibunda 3863
Dicallomera 3862	l-nigrum 3867	recens 3855
dispar 3870	Leucoma 3866	salicis 3866
Elkneria 3863	Lymantria 3868	similis 3865
	LYMANTRIIDAE 3855	

307, rue du Fbg-Croncels, 10000 Troyes

#### ERRATA

Dans le bulletin précédent (2 (6), 1983 : 194), une inversion s'est produite dans la composition de la planche 11 : 5a doit être lu à la place de 5b et inversement. De même pour 6a et 6b.

## PRÉSENTATION D'OUVRAGE

par Roger MÉTAYE

Le Multiguide Nature des Papillons d'Europe, par Ivo NOVÁK, František SEVERA et, pour l'édition française, Gérard Chr. LUQUET. - 352 p., 33 fig., 128 pl. coul., 13,5 x 20 cm. - Édition BORDAS, Paris, 1983. - ISBN 2-04-012875-1. - Prix : 75 F.

Ce modeste ouvrage comprend une introduction de 72 pages, suivie de 128 planches en couleurs, et, in fine, un glossaire et deux index (noms vernaculaires et noms scientifiques)..

L'introduction débute par un aperçu sur l'évolution des papillons, puis les auteurs traitent de la classification et expliquent très clairement les fondements de la nomenclature scientifique. Ensuite, divers chapitres portent sur : le cycle biologique et les moeurs des papillons, les variations et le polymorphisme, la répartition des papillons sur le globe. Enfin, dans l'important chapitre "Collectionner les Papillons", le matériel et les diverses techniques de capture et d'élevage sont présentés; la préparation et l'arrangement de la collection ainsi que la manière de rédiger une étiquette de provenance sont expliqués.

Cette longue initiation, largement illustrée par d'excellentes figures au trait, se termine par une remarquable clé de détermination des familles, établie par Joël MINET.

Mais l'oeuvre la plus importante est sans conteste la partie iconographique où 915 espèces de Lépidoptères, soit près du cinquième de la faune européenne, sont représentées en couleurs. Cette partie comprend 134 espèces de "Rhopalocères", en 25 planches, et 781 espèces d'"Hétérocères", en 103 planches.

Les auteurs ont accordé davantage d'importance aux espèces les plus voyantes ou les plus intéressantes. Aussi, l'ouvrage débute-t-il par les "Papillons de jour" qui sont de loin les plus attirants. Cependant, dans les petits groupes mal connus et les familles de "Microlépidoptères", un nombre suffisamment élevé d'espèces a été retenu pour que ce guide offre une vue d'ensemble de l'ordre, car il cite sans exception les familles les plus importantes. Il est à noter que sur les 103 planches d'"Hétérocères", 29 d'entre elles, regroupant 264 espèces, sont consacrées aux "Microlépidoptères".

La plupart des espèces sont légèrement agrandies, les plus petites l'ont été davantage pour permettre un meilleur examen des détails de leur ornementation.

En ce qui concerne les chenilles et les chrysalides, les plus belles ou les plus caractéristiques dans chacune des familles envisagées ont été figurées.

Au total, plus de 1500 dessins d'une remarquable fidélité.

Le texte qui accompagne les figures est toujours en regard de l'illustration; il apporte d'utiles renseignements sur chaque espèce : envergure, répartition, périodes d'apparition, plantes-hôtes ...

En conclusion, un ouvrage dont la présentation et le fini ne manqueront pas de séduire tous les amateurs de Papillons.

Gérard Chr. LUQUET, traducteur et adaptateur de l'édition française, a attiré notre attention sur les points suivants :

1. Le texte a été entièrement remanié, en particulier au niveau de la classification générale (Catégories taxinomiques supérieures), et du chapitre traitant de la nomenclature. Les autres chapitres de l'introduction ont été eux aussi assez profondément remaniés. Clef intégralement refaite (J. MINET).

2. Texte faisant face aux planches :

a - La nomenclature a été profondément remaniée, et modernisée, pour suivre les tous derniers travaux parus, y compris jusqu'au début de 1983.

b - La systématique a également été remaniée selon les conceptions les plus récentes; elle est naturellement en accord avec la systématique présentée par J. MINET dans l'introduction.

c - Divers renseignements qui ne figuraient pas dans l'édition allemande ont été introduits dans le texte français, par exemple :

- données biologiques récentes - cf. p. 122, plantes nourricières de Pseudophilotes baton, n° 1, ou, p. 334, n° 3, Micropterix calthella.

- données chorologiques récentes - cf. p. 324, n° 4, Apotomis inundana (répartition).

- données relatives à la protection : toutes les espèces protégées en Suisse, en Belgique, au Luxembourg et en France sont désignées comme telles. Corrélativement, des données concernant l'extension ou la restriction de l'aire de répartition de nombreuses espèces ont été introduites dans l'édition française.

d - Selon le voeu de l'éditeur, le maximum de noms vernaculaires a été donné (sources : voir introduction).

e - Un glossaire (qui n'existait pas dans l'édition allemande) a été ajouté.

f - L'index a été entièrement refait. Il a été présenté sous forme de deux index séparés :

- noms vernaculaires

- noms scientifiques. Tous les taxa ont été cités à leur place dans l'ordre alphabétique, quel que soit leur rang hiérarchique. Dans l'édition allemande, les noms d'espèces sont réunis sous le nom de genre, ce qui rend l'index inutilisable lorsqu'une espèce a changé de genre.

Signalons enfin un certain de nombre de coquilles :

p. 13. Il manque la note (1) "Classification selon E. Schmidt Nielsen".

p. 73, ligne 1, lire Ethmiidae (et non Ethmüdae)

p. 96, n° 4, 5e ligne, présentent quelquefois un habitus ...

p. 106, n° 5, le Mercure (et non Marcure)

p. 276, n° 6, le Schoenobius- ... (et non Sxhoenobius)

p. 302, n° 6, L'Hypsolophe

p. 326, n° 2, le Cossus- ... (et non Cassus)

p. 334, n° 4, sparmannella (et non sparmannela)

GROUPE ENTOMOLOGIQUE CHAMPENOIS (G.E.C.)  
(loi 1901)

Président d'Honneur  
M. Robert GALLEY, Maire de Troyes

---

CONSEIL D'ADMINISTRATION 1983

Président ..... M. Pascal LEBLANC  
Vice Président ..... M. Gérard MÉTIVIER  
Secrétaire ..... Mme Nadine LEBLANC  
Trésorier ..... M. Laurent SCHOTT  
Directeur du Bulletin et  
Bibliothécaire ..... M. Roger MÉTAYE  
Membres ..... MM. Olivier PILLON et Pierre VIETTE

---

Le "GROUPE ENTOMOLOGIQUE CHAMPENOIS" a pour but l'étude de la faune entomologique de la Champagne : inventaires, répartition, biologie et écologie. De plus, il contribue à l'étude et à l'enrichissement des collections du Musée d'Histoire naturelle de Troyes.

Les membres du G.E.C. se livrent à des recherches individuelles ou collectives portant essentiellement sur la faune entomologique des départements champenois : Aube, Marne et Haute-Marne. Les résultats de leurs travaux sont publiés dans un Bulletin trimestriel dont les dates de publication correspondent à celles des réunions.

Les réunions ont lieu le 3e samedi des mois de mars, juin, septembre et décembre, à partir de 15 heures, dans l'une des salles de réunions de l'Hôtel de Ville de Troyes (Escalier F, 3e étage).

Pour être membre du G.E.C., il est indispensable d'être domicilié dans l'un des trois départements de la Champagne. Pour tous renseignements, s'adresser au Président du G.E.C. :

Pascal LEBLANC - Musée d'Histoire naturelle - 26, rue Chrestien-de-Troyes - 10000 Troyes. - Téléphone : (25) 43.49.49 (poste 382).

Le Bulletin est servi aux membres du G.E.C. Il est également adressé aux diverses sociétés et organismes suivants :

Aube

Association des Amis du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient  
Bibliothèque municipale de Troyes  
Groupe d'Étude d'Histoire naturelle - Gentiana  
Musée d'Histoire naturelle de Troyes  
Société académique de l'Aube

Côte d'Or

Société entomologique de Dijon

Eure

Association entomologique d'Évreux

Gironde

Société linnéenne de Bordeaux

Haute-Marne

Société de Sciences naturelles et d'Archéologie de la Haute-Marne

Meurthe-et-Moselle

Association lorraine des Amis des Sciences de la Terre (ALAST)

Paris

Alexanor

Bibliothèque centrale du Muséum national d'Histoire naturelle

Bibliothèque du Laboratoire d'Entomologie du Muséum

Société de Biogéographie

Société entomologique de France

Haut-Rhin

Société entomologique de Mulhouse

Saône-et-Loire

Société d'Histoire naturelle et des Amis du Muséum d'Autun

Seine-Maritime

Centre de Documentation sur le Milieu

Société d'Étude des Sciences naturelles et du Musée d'Elbeuf

Yonne

Association des Naturalistes de la Vallée du Loing

Les demandes d'échange sont acceptées. Pour tous renseignements se rapportant au Bulletin, s'adresser au Directeur de la Publication :

Roger MÉTAYE - 307, rue du Fbg-Croncels - 10000 Troyes

---

ABONNEMENT 1983

(4 fascicules)

France ..... 30 F                   Étranger ..... 35 F  
Un fascicule séparé ..... 10 F

Les chèques doivent être libellés au nom du "Groupe entomologique champenois" et être adressés au Trésorier :

Laurent SCHOTT - 15, rue Lucien-Morel-Payen - 10000 Troyes

\*  
\*\*

Les abonnés peuvent, au même titre que les membres du G.E.C., publier dans le Bulletin toutes observations ou études relatives à la faune entomologique champenoise.